This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`


1817
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR

94
23
.F77
1692

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
2.	4.	6.	8.	10.	12.	14.	16.	18.
3.	6	9	12.	15.	18.	21.	24.	27.
4.	46	12	16	20.	24.	28.	32.	36.
5.	10	15	20	25.	30.	35.	40.	45.
6.	12	146	24	30	36	42.	48.	54.
7.	14	21	28	35	42	49.	56	63.
8.	16	24	32	40	46	56	64	72.
9.	146	27	36	45	54	63	72.	81.

25

BIBLIOTECA RICCARDI
in Modena
S. III F. 1ª N. 32.

TRATTATO ARITMETICO

DI GIVSEPPE MARIA FIGATELLI

Nel quale con somma brevità, e chiarezza si contiene quanto di bello, e di buono si troua sparso per gli Autori, e quanto si possa desiderare, per sapere maneggiare il numero non solo nelle quantità rationali, e per le Regole Mercantesche, mà nelle quantità irrationali ancora, pertinenti alla scienza maggiore del numero.

DIVISA IN FIVE PARTI.

Opera utilissima non solo à Mercanti, e à chi desidera d'imparare: mà à Maestri ancora; poiche leggendo questo Libro, di giorno in giorno possono in prestezza imparare, ò mettere à memoria quello, che vogliono ad altri insegnare.

In questa Quarta Impressione aggiontoui l'Algebra.

IN BOLOGNA, M.DC.XCII.

Per il Longhi, *Con licenza de' Superiori.*

QA
33
F47
M92

Lib. Com
Magliano
2-2-24-28
16615

AL LETTORE.

Auendo creato il Sommo Iddio tutte le cose sotto la legge d' vna prescritta quantità: di qui è, che li Filosofi entrati à discutere essa quantità dissero, che, Quantitas est secundum quam aliquid dicitur quantum, *Ouero, che,* Quantitas est accidens intrinsecum ipsius substantiæ corporeæ, à qua nullatenus separari potest. *E ben che questa quantità (quanto alla diffinitione) sia vnica: nondimeno da essa (quasi da radice) ne insorgono due rami, sopra de' quali, (come base fondamentale) s' appoggiano le due principali scienze frà le Matematiche discipline: poiche secondo li medesimi Filosofi ogni quantità, ò ch'ella è continua, ò discreta: La quantità continua,* est cuius partes in eodem subiecto continentur: *nè altro considera, che la grandezza delle cose, in quanto che sono denominate dalla sola Vnità: mà la quantità discreta* est cuius partes simul esse non possunt in eodem subiecto: *e questa consiste nella moltitudine delle cose, considerate in quanto sono più d' vna. La quantità discreta hà termine nel suo infimo essere; perche cominciando dall' vno, (Il men del quale è il niente) col crescere, s'auanza in infinito: ma la quantità continua hà termini nel suo maggior essere: e nel decrescere si rende infinita: poiche ciascuna cosa corporea si può diuidere in due parti; in trè; in quattro; e così in infinito.* Saltem speculatiuè. *Et ecco, che da questo accidente, e distintione di*

quantita ne ſaltano in piedi l'Aritmetica, e la Geometria. Scienze tanto honoreuoli, e tanto neceſſarie à gl' intereſſi, & à negotij humani. L'Aritmetica deriua, & hà per oggetto la quantità diſcreta: ma la Geometria dipende dalla quantità continua. E però non è marauiglia; ſe queſte due Scienze, come buone ſorelle, e deriuanti da vn medeſimo principio, (qual è la quantità in genere) caminino molto d'accordo; e s'aiutino l'vna all' altra: poiche in certi particolari, per farſi bene intendere l'Aritmetica, fà ricorſo alle demoſtrationi Geometriche: e la Geometria mai ſi ſcoſta dall'Aritmetica: perche eſſa è quella che denomina le di lei parti, e proportioni: e con le ſue operationi dà la quantità delle linee, ſuperficie, e de' corpi: delle diſtanze, altezze, e profondità. E per ciò meritatamente da tutti li Sapienti all'Aritmetica ſi dà il primo luogo frà le ſcienze Matematiche.

Di quanta eccellenza ſia queſta ſcienza, chiaramente da queſto ſi può comprendere, ch'ella s'intromette, & hà parte in tutte le Scienze, & in tutte le Arti, & in tutti li negotij, &c. Anzi è tanto conaturalizata nell' huomo, che per ciò ſi chiama rationale, & è differente dalle beſtie, (Al dire di Platone) perche l' huomo sà far conto, e le beſtie nò. Nè mi marauiglio: perche ſe l'huomo (à differenza delle beſtie) ſi diffiniſſe Animal rationale. E queſto adietiuo Rationale, deriuando dal verbo Ratiocinor, che ſtà per far conti. Adunque ben diſſe Platone, &c.

Quanto poi ſia ſtata ſtimata da noſtri Antichi l'Aritmetica, lo dichiarano li groſſi Volumi da eſſi compoſti. L'eſprimono le molte Regole inuentate, che tanto facili-

tano

tano non ſolo li negotij mercanteſchi, e commercij humani: mà che anco dilettano oltramodo l'intelletto noſtro: quale Delectatur veritate. *Mà in queſti noſtri tempi, ne' quali per lo più la giouentù, ò marciſſe nell' ozio, ò paſſa gli anni in fraſcherie mondane, à pena ſi troua chi di eſſa n' habbia ſentore, ò almen poco. E da queſto ſaperne poco, ne viene anco il curarſene poco: poiche eſſendo l'huomo ſtato creato da Dio capace d'apprendere, e di ſapere: quanto più sà, tanto maggior ſete gli viene di ſapere: e quanto più difficile è la coſa da capirſi; tanto maggior diletto apporta la di lei cognitione all' intelletto. E certo, la ſcienza del numero è tanto guſtoſa per sè ſteſſa, à chi la poſſiede bene; che, ſe non per altro, per queſto ſolamente doueria eſſer da gli huomini praticata, e ſtimata.*

Mà perche può eſſere, che molti, (benche d'acuto ingegno) non ſi diano à queſti Studj d'Aritmetica, ò per non hauere commodità di comprarſi Volumi groſſi; ò perche ſi perdino d'animo; nè penſino di poter cauare dal molto dire (che per lo piu confonde la mente) la ſoſtanza della coſa preteſa, ò pure perche s' infaſtidiſcono dal ſolo ricordarſi, che per apprendere tal ſcienza, biſogna voltar tante carte, &c. *Mi ſon indotto (pregato da molti amici) à laſciar ſtampare vn Riſtretto d'Aritmetica, che manuſcritto laſciò alla Caſa Lorenzo Figatelli (mio Cugino carnale) quando ſi fece Religioſo. Di queſto Riſtretto mi ſon ſeruito aſſai per imparar queſta ſcienza in quei primi Anni appunto, che l'huomo comincia ad eſſer ragioneuole in fatti. Fatto poi grande: più volte ſon ſtato fauorito dal Padre della viua voce sì in queſto particola-*

re d'Aritmetica, come d'altre Scienze Matematiche, delle quali vniuersalmente assai se ne diletta.

Confesso la verità, che mai hebbi intentione di far stampare questo Libretto: poiche, quasi piccol Stella, paragonato al lucidissimo Sole di tanti dottissimi, & eruditissimi Autori, che hanno scritto di tal materia, non può se non affatto restar oscurato; sottoposto à quel tramonto dalli Astronomi detto Eliaco. Et è, quando, che al nascer del Sole spariscono le Stelle: mà come tesoro, (à me sommamente grato) volontieri lo conseruauo appresso di me: hauendo in esso le materie in pronto con vn ordine, chiarezza, e modo di dire non ordinario. Tuttauia perche in questo Libretto stà compilato quanto di bello, e di buono si possa desiderare: spettante non solo all'Arte negotiatoria, e Mercantesca: ma anche pertinenti alla Scienza maggiore del numero: che consiste nel sapere maneggiare le quantità irrationali, ò sorde, che si chiamino, anco volontieri per vtilita commune lo lascio dare in luce da cbi gratis *lo stampa: acciò dalla breuità allettata la fiacchezza humana, scuota da sè la pigritia, e si muoua ad intraprendere vn poco di fatica, per imparare vna scienza tanto nobile, dileteuole, vtile, e degna.*

Vero è, che in questo mio Ristretto non pretendo d'insegnare li primi erudimenti, quali senza la voce d'vn Maestro è quasi impossibile l'imparar li da sè: & in questi ci vorria longo parlare. Nè meno mi son curato di moltiplicar Quesiti: mà per ciascuna Regola mi contento di quei soli, che alla pratica possono occorrere, e seruire; poiche inteси bene i loro fondamenti; ogn'vno da sè può farsi strada, & accommodarsi li quesiti nelle mani.

Suppo-

Suppoſto adunque, ch' vno ſia vn poco diſgroſſato, & habbia qualche talento, ſtudiando queſto Libro, preſtiſſimo ſi può far eccellente in materia del numero. Ben è vero, che, nel ſtudiarlo, non biſogna dar vna beccata in quà, & vna beccata in là; che queſto è il vero modo per non imparar mai; mà da principio al fine il legga, e rilegga; perche ſe bene da principio l' intelletto s' intoppaſſe in qualche difficoltà, col proſeguire auanti acquiſtarà maggior lume; e da sè con vn poco di tempo la verità cercata entra (mentre ſi dorme) nella mente.

Vn altro Libretto mi trouo hauere compoſto dall' iſteſſo parente, intitolato Memoriale Geometrico, nel quale (non oſtante che non ſia nè anche la metà di queſto) ſi contiene quanto ſi può deſiderare, per ſapere miſurare ogni data quantità continua, lineale, ſuperficiale, e corporea. Per traſmutar corpi. Diuidere ſuperficie. Sapere le Altezze, diſtanze, &c. con altre gallantariole: e di ragione douerìa eſſer vnito con queſto: mà per le molte figure, che porta l'operetta: e per eſſere io molto impiegato al preſente in altro, per hora non può laſciarſi vedere: con tutto che ſia più vtile al publico, e più deſiderato di queſto d'Aritmetica. In tanto ſi degni il Lettore di gradire queſte mie poche fatiche: e ſe di guſto, ò d'vtile le riuſciranno, ne dia gloria al Sommo Iddio; quale eſſendo fonte d'eterna ſapienza (quaſi per tanti riuoli) ſi degna di participarla al Mondo per mezo della mente de gli huomini; ne' quali habitando per gratia, in eſſi ſta illuminandoli, ammaeſtrandoli, inſegnandoli, &c. E perche in queſta prefatione s' è parlato di quantità continua, e diſcreta; procuri ogni vno di renderſi continuo, e

mantenendo in sè tutte le sue parti, osservi fedelmente quanto hà promesso à Dio nel Sacro Battesimo; si renda anco discreto nell'acquisto di quelle virtù, che rendendo l'huomo felice in questo Mondo, Beato lo consegnano all'eternità. Che à tutti lo concedi. Qui est benedictus Deus in sæcula, *VALE.*

PARTE PRIMA

Nella quale si tratta della quantità rationale per tutte le Regole Mercantesche.

CHE COSA SIA ARITMETICA, Dell'Vnità. Del Numero. E sua diuisione.

CAP. I.

Che cosa sia Aritmetica.

L'Aritmetica (prima scienza frà le Mathematiche discipline) è vna scienza di quantità discreta, cioè numerabile secondo sè: poiche il tutto consiste in numerare, raccogliere, radoppiare, sottraere, e diuidere, &c. Alcuni la chiamano scienza del Creatore, e delle Creature: *Omnia in mensura, & numero, & pondere posuisti. Sap.* 11. 21.

L'Aritmetica altra è teorica, ò speculatiua, che con la mente considera le cause, le qualità, le quantità, e le proprietà de' numeri, & altra è pratica, che consiste nell'atto del calcolare.

Dell' Vnità.

L'Vnità è quella, dalla quale ciascuna cosa materiale è detta vna, ò vno. Anzi quest'Vnità è tanto famigliare alla natura, che anco l'vsa nella moltitudine. Laonde si dice vna dozzina; Vn trentesimo; Vn cento, na-

naro, &c. Vna quantità. Vn esercito, &c. Anzi l'Vnità istessa diuisa, ritiene il nome d'Vnità; che perciò si dice vn mezo, vn terzo, vn quinto, e così in infinito.

Questa Vnità è diuersamente intesa dal Naturale, di quello l'intende il Matematico: perche il Naturale considera le cose tanto secondo l'essere, quanto secondo la ragione, congionte con qualche materia sensibile: Laonde con l'Vnità sempre nomina la materia, come suo material soggetto: dicendo, vna Botte di Vino, vn Moggio di Terra, &c. Mà il Matematico, se bene le considera (come il Naturale) congionte, e secondo l'essere di tal materia sensibile; ad ogni modo le considera poi, e le piglia, come astratte da tal materia sensibile, secondo la ragione: e questa Vnità Matematica è quasi simile al punto Geometrico indiuisibile.

Del Numero.

IL Numero non è altro, che vna moltitudine, composta di molte Vnità: circa il quale milita parimente la distintione, ò differenza, detta dell'Vnità; cioè naturale, e Matematica. Per esempio 25; è vinticinque volte vno, &c. Vi sono trè sorti di numeri, e non più. Il primo è detto numero numerante. Questo è l'Anima nostra, che col cuore, con la bocca, e con la lingua numera le cose. Il secondo si chiama numero numerato; & è la cosa numerata, e però si chiama numero naturale. Et il terzo si chiama numero numerabile, il qual consiste nell'vso, e nell'atto del numerare le cose di quantità discreta; cominciando da vno, e procedendo in infinito. Dal che ne nascono cinque generationi di numeri; cioè Numero semplice, Decine, Centinaia, Milliaia, e Millioni. E così col mezo delle Milliaia, e delli Millioni si procede in infinito.

Di-

IL Numero si diuide in trè spetie. Tutti li numeri, che sono manco di dieci, si chiamano digiti, ouero numeri semplici. Tutti li dieci precisi, e precisamente composti di dieci, come 10. 20. 30, &c. 100. &c. 1000. 20000. &c. si chiamano Articoli. Tutti gli altri numeri poi, che si trouano frà due Articoli prossimi, si chiamano numeri composti, ouero misti, perche sono composti d'vn digito, e d'vn Articolo, come sono 11. 12. 13. &c. 21. 25. &c. 109. e cosi successiuamente in infinito.

SPETIE, E MANEGGIO Dell'Algorismo.

CAP. II.

L'Aritmetica pratica compendiosamente fù data in luce da vn Filosofo detto Algo: e per questo fù chiamata Algorismo, ouero Algoritmo. Le spetie del quale sono sette, e si chiamano anco Atti, ouero Passioni del numero, cioè, Numerare, Sommare, Sottrare, Moltiplicare, Partire, Progressioni, & estratione di Radice.

DEL NVMERARE.

IL primo Atto dell'Aritmetica pratica, detto Numeratione, consiste in sapere rappresentare con qualche sorte di Carateri, ouer figure ogni qualità di Numero. Il che si fà al presente con queste dieci 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0. E perche anticamente li Romani numerauano per mezo delle lettere dell'Alfabetto; & in quei tempi s'vsauano certe abbreuiature, e colocauano li caratteri diuersamente da noi: quì sotto le noto; acciò occorrendo il caso (come si vede in certe Antichità) l'esperto Aritmetico si possi far valere. Cin-

A. B. C. D.
Cinquecento. Trecento. Cento. Cinquecento.
E. F. G.
Ducentocinquanta. Quaranta. Quattrocento.
H. I. K L
Ducento. Vno. Cinquantauno. Cinquanta.
M. N. O. P. Q.
Mille. Nouanta. Vndeci. Quattrocento. Cinquecento.
R. S. T. V. X.
Ottanta. Settanta. Centoseſſanta. Cinque. Dieci.
Y. Z.
Centocinquanta. Duemilla.

Alcuni vogliono, che la lettera I. inanzi a due, ouero più decine ſignifichi cento.

IXXVI. IIXXXVIII.
Centouintiſei. Ducentotrentaotto.

Dicono parimente, che queſta lineeta —— ſopra à qual ſi voglia lettera, ſignifichi tante milliaia, quante ne rappreſenta la lettera, ſopra la quale è poſta. Si che, ſe ſarà ſopra l'$\overline{I}$. ſignificarà mille; Se ſarà ſopra il $\overline{V}$. ſignificarà cinquemilla; Sopra il $\overline{X}$. diecimilla, e ſopra il $\overline{C}$. Centomilla, &c.

Hora mò, frà tutte le ſudette lettere, e antichità, ſette ſolamente ſono reſtate in vſo: Cioè

I. V. X. L. C.
Vno. Cinque. Dieci. Cinquanta. Cento.
D. M.
Cinquecento. Mille.

Queſte lettere ſi ſogliono abbreuiare (come ſiegue) per rappreſentare minor numero di figure. Il che ſi fà con anteporre vna lettera di minor ſignificatione, così

IV. IX. XL. XC.
Quattro. Noue. Quaranta. Nouanta.

No-

CM.

Nouecento; e così di molte altre.

Finalmente s'vsa anco quest'altra sorte d'abbreuiatura; ponendo il C, e l'M, sopra il numero delle centenaia, ò milliaia, come siegue.

C.	C.	M.	
IIII.	VIII.	VI.	e così nel resto.

Quattrocento. Ottocento. Seimilla.

Mà per tornare alla nostra propositione. Se s'hauesse da numerare vna quantità grande di figure, bisogna distinguerle in membri con punti di tre, in tre: ciascun de quali contiene numero, decina, e centinai, (eccetto l'vltimo, che resta con quello, che accade: sia mò vna, due, ò trè figure) Dipoi sopra la prima figura di ciascun membro disparo (eccetto il primo membro) si nota successiuamente 1. 2. 3. e quanto ricercarà la quantità delle figure da numerarsi. E si come li numeri infimi si pronunciano con numero, decine, e centinaia; così ancora si hanno da pronunciare li millioni; con aggiongerui solamente quella parola millioni tante volte; quanto ricerca il numero posto sopra li sudetti membri. Quanto poi a membri pari, che non hanno sopra numero alcuno, si pronunciano ancor loro col termine di numero; decina; & centinaia: non semplicemente di millioni; mà di milla millioni; tante volte però solamente quanto ricerca la figura, posta sopra il membro più vicino à man dritta: eccettuandone però il secondo membro (primo de membri pari) che per esser prima di qual si voglia millione, si pronuncia solamente col termine di numero, decine, e centenaia di milliaia, & il primo membro si pronuncia solamente col termine di numero, decine, e centinaia. Il che si fà chiaro, così.

3 2 1

26. 423. 570. 640. 325. 489. 225.

Adun-

Adunque queſte vinti figure, diſpoſte, & ordinate, (come di ſopra) ſi numerano cosi. Vintiſei millioni, di millioni, di millioni. Quattrocento vintitrè milla millioni, di millioni; e cinquecento ſettanta millioni di millioni. Seicento quaranta milla millioni: e trecento vinticinque millioni. Quattrocento ottanta noue milla, e ducento vinticinque. (Che, ſe foſſero gradi di gratia; Beati.)

DEL SOMMARE.

IL ſecondo atto dell'Aritmetica pratica ſi chiama Sommare; compoſitione; ouero raccogliere: perche non conſiſte in altro, che vnire inſieme più numeri, ò figure. Tutto il punto di queſto negotio conſiſte in colocare i numeri ſotto li numeri; le decine ſotto le decine; le centenaia ſotto le centenaia, &c. e ſe vi ſono minutie diuerſe; colocate ciaſcuna nel proprio luogo. La prima figura à man dritta ſignifica numero; la ſeconda ſignifica decina, la terza centenaia, e la quarta milliaia &c.

La proua del ſommare ſi fà col cauare li 9. per ciaſcuna filla di numeri lateralmente: traſportando di filla in filla il ſoprauanzo di tutti li 9. e finita l'eſtratione: ſi tiene da banda l'vltimo auanzo: dipoi ſi cauano tutti li 9. dalla ſomma: la quale ſe ſarà ben fatta, laſciarà ſopra li 9. vn numero, ſimile al già meſſo da banda. Mà perche queſta proua alle volte può fallare, è meglio tornare à ſommare, (eſcludendo la filla ſuperiore,) e fatta la ſomma ſottrare queſta dalla prima, perche ſe l'operatione ſarà ben fatta, laſciarà li numeri della prima filla del ſommare; come ſi vede qui ſotto.

Lir. 2750	sol. 15	din. 11	Lir.	120	
79	7	3		200	0)(0
264	0	7		139	
6	18	9			
				549	
Lir. 3101	sol. 2	din. 6			
350	sol. 6	din. 7			
Lir. 2750	sol. 15	din. 11			

Questa somma è falsa : è pure la prona batte bene;e però è più sicura l'altra. Se bene è quasi impossibile far sì grossi errori, se non da ignorantissimi, Quando si haueßero d'assumere gran quantità di partite, se ne pos. sono fare trè, ò quattro classe, e poi assumere di nouo la somma di tutte le classe.

DEL SOTTRARE.

LA Sottrazione (terzo atto dell'Aritmetica Pratica) non è altro, che saper trouare la differenza frà due propoßti numeri;cioè,sapere quanto il maggior numero ecceda,ò superi il minore. E per ciò fare;sẽpre si coloca nella prima filla il numero maggiore. Questo solo si deue auuertire nelli sottrari di qualità differenti; che non potẽdo sottrare,ò cauare(per esempio) vn numero maggiore dal minore ne'Danari; si piglia impreßto vn Soldo dalla filla de'Soldi superiori, e conuertito in Denari, s'vnisce con gli altri Denari superiori;e poi si fà la sottratione; e quel Soldo, leuato alla filla superiore, s'aggionge alla filla de'Soldi inferiore; e poi si fà la sottratione de'Soldi; come se dalla filla superiore, non si fosse leuato quel Soldo. Quest'ordine si tiene nel sottrare qual si voglia cosa,che sempre si conuerte vna vnità precedente nella natura di quelle, che attualmente si fà l'estrattione. Si che la Lira, si conuerte in Soldi: il Soldo in Denari. Il peso in Libra; la Libra in Oncie. La Pertica in piedi; il Piede in Oncie; & così del resto. La mi-

miglior proua del Sottrare è questa. Si sommano, ouero s'vniscono insieme il numero da esser sottrato, & il numero restato; e se sarà fatta bene l'operatione; riuscirà giustissimamente il numero, dal quale si fece la sottratione: come si vede in questo esempio.

Pietro deue havere da Giouanni Lir. 548 sol. 10 d.
Num. da farsi la sottratione
Giouanni n'hà dato à buon conto Lir. 275 sol. 17 d.
Num. da Sottrarsi.

Quanto resta debitore Giouanni? — — — —

Giouanni resta debitore. Lir. 272 sol. 12 d.
Resto.
Lir. 548 sol. 10. d.
Proua insegnata.

DEL MOLTIPLICARE.

LA quarta attione dell'Aritmetica pratica è chiamata Moltiplicare. Il che consiste in fare, che vn numero proposto diuenghi tante volte maggiore: quanto sono li numeri, per li quali si hà da moltiplicare. Il numero Maggiore si mette sempre di sopra, & il minore sotto: perche non saria bel sentire s'vno dicesse; Voglio moltiplicare tre per noue; mà si dice, noue per tre.

Quando occorre di moltiplicare qual si voglia numero per vn numero digito, articolo, ò altro numero composto, che si sappi bene alla mente; si moltiplica tutto in vna sol volta il numero moltiplicatore con ciascuna figura del numero da moltiplicarsi, e tal moltiplicare si chiama moltiplicare per discoro, ò per Colonna. Come si vede in questi due esempij.

470216		2
6	3 1 3	
		6
2821296		
		8
57140	6 1 6	
12		3
685680		

Quanto poi al moltiplicare per Scacchiero, ò Baricolo:

colo (modo vsitatissimo, e comune) si fà col moltiplicare tutto il numero di sopra per ciascuna figura di sotto, auuertendo, nel colocare li Prodotti a ritirarsi sempre vn numero indietro per ciascuna fila: Cominciando però sempre la moltiplicatione dalla prima figura verso man dritta. Fatta la multiplicatione, si sommano insieme tutti li Prodotti: e si fà la sua proua; come di sotto si dirà.

5780	*Numero da moltiplicarsi.*
327	*Numero moltiplicante.*
40460	2
11560	6 | 1 6
17340	1
	3
1890060	*Prodotto.*

Ogni volta, che si voglia moltiplicare per dieci vn numero di figure proposte: basta aggiongerui vn 0. Se per cẽto, due 00. se per mille, tre 000. e sarà moltiplicato.

Parimente occorrendo, che tanto nel numero di sopra, quanto in quello di sotto vi fossero vno, ouero più 00 vnitamente a man dritta, moltiplicansi insieme le figure significatiue, e poi s'aggiongono al Prodotto tutti li zeri di sopra, e di sotto, come si vede in questi esempi: e ne' quali basta à moltiplicare il 3. il 7. e l' 11. con le figure significatiue di sopra, e poi aggiungerui li zeri.

450	0	254		784	
300	0 | 1 0	70	2	110	1
	1		5 | 1 5		2 | 1 2
135000	3	17780	1	86240	1
			7		2

La proua si fà così. Si leuano tutti li 9. dal numero moltiplicando, (cioè di sopra) & il soprapiù si coloca sopra la Croce. Dipoi cauati li 9. dal numero, per il quale si moltiplica (cioè di sotto) il residuo si pone sotto la

Croce. Terzo, si moltiplicano insieme questi due sopra auanzi: e dal Prodotto cauatone li 9. il restante si mette a man sinistra della Croce. Finalmente cauando tutti li 9. da tutta la somma del moltiplicare (che si chiama Prodotto) se l'operatione sarà fatta bene, il sopra auanzo deue esser simile à quello, posto à man manca della Croce: E se sta bene: si mette à man dritta d'essa Questo sia ricordo, che ogni volta, che il numero è manco di 9. quel numero medesimo serue per colocarlo nella Croce, (però al suo luogo.)

Del Moltiplicare per Ripiego.

NOn si deue Partire in pratica dalli due predetti modi di moltiplicare: pure per curiosità ne toccarò di passaggio alcuni altri. Ripiego d'vn numero non è altro, che due numeri, i quali moltiplicati insieme, facciano il numero, del quale essi sono ripiego. Per esempio il 2. & il 4. sono ripiego di 8. perche 2. via 4. fanno 8. Di 12. è ripiego 2. 6. & anco 3. e 4. Di 24. sono ripiego 2. e 12. 3. e 8. 4 e 6. Di 48. sono ripiego 2. e 24. ouero 3. e 16. ò pure 4. e 12. & anco 6. e 8. e così molti altri numeri possono hauere più, ò meno ripieghi. Altri numeri poi non hanno ripiego: come il 13. 17. 19. 23. 29. 31. & altri infiniti numeri. Adunque per ripiego si moltiplica così. Voglio moltiplicare 420. per 48. posso moltiplicare il 420. per 6. ò per 8. prima: e quel che ne risulta rimoltiplicarlo, ò per 8 prima, e poi per 6. (Tanto riuscirà per qual si voglia ripiego del 48.) e di qual si voglia numero. Per esempio. Moltiplico il proposto 420 per 8. e mi dà 3360. Moltiplico di nuouo questo 3360. per 6. e mi dà 20160. E tanto daria il 420. moltiplicato per 48. in vn sol colpo.

Del Moltiplicare per Crosetta.

QVesto Moltiplicare per Crosetta è il più ingegnoso; mà anco il più laborioso modo, che sia stato in-

inuentato: perche il Prodotto di tal moltiplicare, si conclude con vna sola linea di figure, (à guisa del moltiplicare per colonna) mà ci vuole gran memoria. Se le figure da moltiplicarsi sono solamente due, cioè numero, e decine, l'operatione non è molto difficile: mà di trè, di quattro, &c. è laboriosissima. Ora veniamo alle curte,



Habbiasi da moltiplicare 52. per 46. Con trè operationi, ò Prodotti s'haurà l'intento così. Primieramente si moltiplicano insieme le due figure semplici 2. e 6. il cui Prodotto è 12. Si coloca il 2. e si porta vna decina. Per seconda operatione; si multiplicano in croce li numeri digiti con le decine: li Prodotti de'quali saranno per vn verso 30. e per l'altro 8. che vniti insieme saranno 38. e con la decina portata 39 Si coloca il 9, e si portano le 3 Centenaia. Ma perche non vi sono altre figure, per terza operatione si multiplicano insieme le decine, & al Prodotto 20 aggiongendoui le 3 Centinaia portate: s'haueranno poi 23, da colocarsi con gli altri due Prodotti. Si che à moltiplicare 52. per 46. ne vengono 2392.



Se le figure saranno trè: l'operatione si fà con cinque Prodotti. Primo. Si moltiplicano insieme le vnità, ò numeri semplici. Secondo. Si moltiplicano in croce le vnità con le decine: come s'è fatto nell'esempio precedente. Terzo. Si moltiplicano in croce le vnità con le Centinaia; che per vn verso daranno 20, e per l'altro 18, li Prodotti vniti insieme: & alla somma aggiongendoui il Prodotto delle decine insieme (cioè 10) & il 4 portato, in tutto s'haverà 52. Si coloca il 2, e si porta il 5. (Adesso mò le vnità sono fuori di ballo.) Per quarta operatione, si moltiplicano in croce le decine, con le centenaia: che per vn verso danno 15, e per l'altro 8: quali Prodotti vniti insieme, & alla somma aggiongendoui li 5, portati; s'haverà in tutto 28: si coloca l'8, e si porta il 2. Finalmente moltiplicando insieme le centenaia; & al Prodotto aggiuntoui il 2, portato; s'haverà 14, & è finita l'operatione. Si che à moltiplicare 456 per 325, il Prodotto è 148200. (Già hò detto, che l'operatione hà del scabroso; mà non bisogna perdersi d'animo) Per aiuto della memoria hò fatto quei punti sotto le figure del Prodotto di mano, in mano che si opera: e significano le decine, che si portano. Hò posto vn' esempio di quattro figure senza operatione da filosofarui sopra &c.

Del Moltiplicare per Quadrilatero.

IL moltiplicare per Quadrilatero è assai bello; perche non s'hanno da portare decine; mà per ciascun quadretto si coloca ciascun prodotto. Fatta moltiplicatione; si sommano diametralmente intorno al Quadrilatero; che tanti campi deue hauere, quanti sono li numeri da moltiplicarsi. Due esempij pongo; vno contrario al l'altro.



863247
386139

Prima operatione.

8 7

3 9

72 21

21
72
1256
2454
063242
081827
09162407
48060918
1824120421
6436030636
244818021263

Seconda operatione.

8 6

3 8

2454

4 7

3 9

1256

333333333333

Questo modo di moltiplicar in forma di Piramide si vede nel fine di certi libretti d'Abbaco, senza ãmaestramento. Io hò trouato vn modo facilissimo, ed è questo, Si moltiplicano in croce le figure angulari. Per prima operatione se ne piglia vna per angolo. Per seconda operatione se ne pigliano due per angolo: poi se ne pi-

gliano 3. poi 4. poi 5. Vltimamente si moltiplicano tutte le figure insieme, come stanno; cioè numero con numero: decine, con decine &c. Ogni Prodotto si mette giù intiero, nè si porta via cosa alcuna; e ogni volta, che il Prodotto sia d'vna sol figura se gl'aggionge di dietro vno: acciò ogni Prodotto caschi a suo luogo. Finalmente bisogna auuertire di non incauolcare, ò intensicare le linee nel moltiplicare le figure in croce; ma tutte siano parrallele. Per maggior intelligenza hò posto in disegno le due prime operationi, acciò facciano lume al resto.

Vn altro ammaestramento.

NEl fine dell'istesso Abbaco si troua scritto, che, chi sà moltiplicare Lire, Soldi, e Denari; per Lire, Soldi, e Denari, può francamente d'Abbaco parlare. Iui si troua vn esempio: ma senza instruttione. Io insegno il modo di garbo: mà notisi bene la forza, e sodezza del fondamento. E sappi, che non l'intenderai bene, fin che non habbi letto il Capitolo de rotti.

Vn soldo è $\frac{1}{20}$ di Lira. Vn Denaro è parimente $\frac{1}{240}$ di Lira: siche à moltiplicare Soldi con Soldi, è come à multiplicare 20. esimi, con 20. esimi. E à moltiplicare Denari con Denari, è come à moltiplicare 240. esimi, con 240. esimi. Attento. A moltiplicar mò $\frac{1}{20}$ con $\frac{1}{20}$ ne viene $\frac{1}{400}$, e à moltiplicare $\frac{1}{240}$ con $\frac{1}{240}$ ne viene $\frac{1}{57600}$. Adunque moltiplicando Soldi con Soldi, il Prodotto si parte per 400. E moltiplicando Denari con Denari il Prodotto si parte per 57. 600. e così il Quotiente dell'vno, e dell'altro saranno Lire; Se auanza qualche cosa; se ne cauano Soldi, e Denari, moltiplicando al solito per 20. il primo auanzo, e per 12. il secondo auanzo; e partendo per il commun Diuisore. Alla pratica.

A mol-

A moltiplicar Lir. 4 — 5 — 6
Per Lir. 3 — 10 — 8 Fà Lir. 15. — 2 — 1

Il modo piano è questo. Si conuerte ogni cosa in Denari, quali moltiplicati insieme, il Prodotto si parte per 57. 600. & s'opera come sopra.

Secondo modo. Ponganſi le quantità da moltiplicarſi insieme in forma di rotto, e ſtarano così. Lir. $\frac{4}{1}$ $\frac{5}{20}$ $\frac{6}{12}$. & Lir. $\frac{3}{1}$ $\frac{10}{20}$ $\frac{8}{12}$ Di poi ciaſcuna quantità s'infilzi: & hauerai per la prima $\frac{1026}{240}$ che risultano Denari: & per la seconda *hauerai* $\frac{848}{240}$ che pur risultano Denari. Moltiplica mò insieme questi due rotti secõdo la Regola à suo luogo insegnata: e come per l'altro modo, hauerai Lir. 15. 2. 1 $\frac{1}{2}$. Anzi questo modo s'incontra col primo, perche con quell'infilzare si conuerte il tutto in Denari: Mà in questo secondo modo, si vede, il perche s' habbia da partire il Prodotto de' Denari con Denari per 57. 600.

Per vn altro modo più maestrale, mà laborioso, si può risoluere il quesito, lasciando ciaſcun termine nel suo essere. Mà prima bisogna sapere, che

A moltiplicar Lire con Lire, si producono Lire.

A moltiplicar Soldi con Lire, si producono 20. *esimi di Lira.*

A moltiplicar Soldi con Soldi, si producono 400. *esimi di Lira.*

A moltiplicar Denari con Lire, si producono 240. *esimi di Lira.*

A moltiplicar Denari con Soldi, si producono 4800. *esimi di Lira.*

A moltiplicar Denari con Denari, si producono 57. 600. *esimi di Lira.* A noi.



Si moltiplica come si fà con Pertiche, Piedi, & Oncie.

Lir. 12, $\frac{55}{20}$ $\frac{50}{400}$ $\frac{50}{240}$ $\frac{100}{480}$ $\frac{48}{57600}$.

Cauando gl'intieri, e schisando li rotti, s'haueranno *Lir.* 14. $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{5}{24}$ $\frac{1}{48}$, e $\frac{1}{1200}$ quai rotti tutti sono parte di Lira; e però sommati insieme fanno pur *Lir.* 15. 2. 1. $\frac{1}{5}$ come per gli altri due modi, &c.

Del Moltiplicare alla Fiorentina detto all'indietro.

QVesto moltiplicare è tutto contrario al Baricocolo, perche si comincia a moltiplicare dalle figure di maggiore rappresentatione; e si tira da man manca verso man dritta di filla, in filla; come si vede in questo esempio; E per esser chiaro; poche parole.

```
                 4
4567        6 | 6
4326          6
-----------------
18268
 13701
   9134
   27402
-----------------
19756842
```

Del Moltiplicare Spezzato.

QVesto moltiplicare si fà così: Proposto due numeri si diuide vn di loro in più parti, e poi ciascuna parte si moltiplica con l'intiero: Il che fatto, si somma ogni cosa insieme; ouero si diuidono tutti due li numeri, e poi ciascuna parte d'vno si moltiplicano per tutti gli altri, e poi si somma. Per esempio. Volendo moltiplicare 67. per 26. diuido 26 in 3.4.5.6.8. E poi opero così.

```
3 via 67 fà 201.
4 — 67 — 268
5 — 67 — 335
6 — 67 — 402
8 — 67 — 536
-------------
fanno    1742
```

Altro essẽpio, *Diuido* 15 in 4.5.6.

```
   8
 5 | 5
   4
```

Da vn 67 solo si caua il 9.

```
      6
0 | 0
    3
```

Et 12 in 2.4.6.

```
 8. 16. 24.
10. 20. 30.
12. 24. 36.
-----------
30. 60. 90.
```

La

La proua di tutti questi moltiplicati è quella del 9. come si è insegnata di sopra. *Tutti insieme sono* 189

DEL PARTIRE.

LA quinta attione dell'Aritmetica pratica si chiamà Partire, che consiste in sapere diuidere ogni qualità, ò quantità di numeri in due, ouer più parti eguali. Il che si fà in quattro modi; Il primo de quali si chiama partire per Colonna, ò di Testa. E questo è quando il Partitore è d'vna, ò di due figure, che si possiedono bene: perche con vna sola filla di numeri si sbriga l'operatione. Se il Partitore non capisce nella prima, ò nelle due prime figure se ne pigliano due, ò trè: & il soprauanzo s'vnisce alla figura seguente con titolo d'articolo, cioè di 10. 20. 30. 40. 50. 60 70 80. 90. ouero d'altro numero composto, secondo la qualità dell'auanzo, come si vede in questi esempij.

Partitore 7.	174230	7	*Partitore* 12.	756408	3
Quotiente	24890	8 | 8	*Quotiente*	63034	3 | 3
	5				7

Del Partire per Battello, ouero per Galera.

IL partire per Batello, ò per Galera è stimato, e praticato d'alcuni: mà in fatti è laboriolo, e facile da sbagliare: poiche bisogna far à mente tutte l'operationi, che si fanno nel partire à Danda; e se nasce errore, non si può conoscere, se non si torna à fare nuoua operatione, per essere scancellate le figure: siche a me non piace. Si fà adunque cosi. Supposto, che s'habbia da partire 32320. per 40. si mette il Partitore sotto il 32320. come si vede nel seguente esempio.

Se il 40. foſſe ſotto il 32. faria errore: per eſſer più il Diuiſore, che il 32. da partirſi. Si dice adunque così, 40. da 32. non ſi può cauare; quante volte entra mò nel 323. ſi troua, che v'entra otto volte. Si mette da banda l'8, e poi biſogna con la mente multiplicare l'8. con il 40. e quel, che ne viene, ſottrarlo dal 323. e quel 3. che auanza, ſi coloca ſopra il 3, che col 2. ſeguente dirà 32. Ciò fatto, ſi ſcancella il 323, & il 40, il qual 40 ſi porta ſotto il 32. E di nuouo ſi dice: Il 40. in 32. non ci può capire, e però ſi fà 0. nel Quotiente. Si ſcancella il 40, quale ſi porta ſotto il 20. e poi ſi dice. Il 40. in 320. c'entra 8. volte. Si fà con la mente la moltiplicatione dell'8. con il 40, e perche il Prodotto fà 320. non ci occorre ſottratione. O vedete, che imbroglio, &c.

3 ·
32320 | 1808
40
40
40

Del Partire a Danda.

IL partire à Danda, porta vn poco più operatione del paſſato; mà è aſſai più facile. Propoſto adunque il precedente eſẽpio, ſi fà così. Si mette da canto il Partitore 40 e dall'altro canto l'8. Quotiente. Fatta la moltiplicatione, e ſottratione, reſta 3. al qual s'aggiõge il 2. E perche il 40 nõ entra nel 32. ſi fà 0. nel Quotiente. A queſto 32. s'aggionge il 0, e così nel 320. entra 8 volte il 40. Siche, fatta la moltiplicatione dell'8 col 40, ſarà finita l'operatione. Ogn' vno però ſeguiti il ſuo genio.

| 40 | 32320 | 1808
320
320
320
4
1 1 1
7

In qual ſi voglia partire vi ſono alcuni auuiſi molto importanti. Il primo è, che il Quotiente non ſi può eſſer mai più, che 9. e ſe bene in riſguardo alle prime figure, pareſſe che il Diuiſore poteſſe entrarui più; ad ogni modo

do in riſguardo all'altre figure non c'entraria.

Secondo. Il numero, che ne riſulta dalla moltiplicatione del Quotiente col Diuiſore, non deue mai eſſere maggiore del numero, dal quale ſi cauò detto Quotiente; e ſe foſſe in tal caſo biſognaria calare il Quotiente.

Terzo. Fatta la ſottratione, il numero che reſta, non deue mai ſuperare, nè eguaglare il Diuiſore, e ſe ciò foſſe, biſognaria alterare il Quotiente.

Quarto. Ogni volta, che s'habbia da partire per 10. qual ſi voglia numero: baſta tagliare la prima figura à man dritta, e ſarà partito. Se per 100. ſe ne tagliano due. Se per 1000. tre, &c.

Quinto. Anzi, ogni volta, che nel Partitore vi ſia vno, ò più zeri vniti verſo man dritta: ſi tagliano altretante figure del numero diuidendo pur à man dritta, & il reſto ſi parte per le figure ſignificatiue d'eſſo Partitore, e ſe auanza qualche coſa, s'vniſce per modo di numerare alle figure, che ſi tagliorno. Per eſempio. Se foſſe auanzato 4, e le figure tagliate foſſero 50 ſi faria 450.

Finita l'operatione ſi mette il Diuiſore ſotto il reſiduo, che reſtò nel diuidere. Suppoſto, che nell'eſempio precedente foſſero auanzati 10 ſi fariano notati coſì $\frac{10}{10}$ e fariano 10. quarantеſimi, cioè vn quarto. Queſti $\frac{10}{10}$ vogliono dire, che delle quaranta parti d'vn tutto ſe ne deuono hauere 10.

Del partire per Ripiego.

QVanto al partire per Ripiego ſi deue oſſeruare, che non tutti li numeri hanno ripiego. (come ſi diſſe del moltiplicare pur per ripiego) Suppoſto adunque di volere partire, per eſempio 5867 per 48 ſi può partir prima per 8, e ne verrà 733. ed auanza 3. Di poi ſi parte queſto 733. per 6. e ne verrà 122. e auanza 1. Ouero ſi potria partire prima per il 6. e poi per l'8. Queſto ſolo bisogna oſſeruare, che l'auanzo del primo partire ſono nu-

numeri ſemplici: ma l'auanzo del ſecondo partire, contiene per ciaſcuna vnità il primo Diuiſore. Si che nel caſo propoſto quell'1. auanzato figura 8. à quali aggionti li 3 primi, fanno 11. Si che il 48. nel 5867. v'entra 122 volte, & auanza $\frac{11}{48}$ Se foſſero $\frac{1ſt}{48}$; fariano vn quarto: ma poco vi manca.

La proua di qualſiuoglia partire ſi fà coſì. Si cauano li 9 dal Partitore, e poi dal Quotiente, e quel che ſopra auanza il primo ſi mette ſopra la Croce, e l'altro ſotto d'eſſa: poi ſi moltiplicano inſieme queſti due auanzi; al qual moltiplicato s'aggionge il numero reſtato nella diuiſione; dalla qual ſóma cauatone li 9, il reſto ſi colloca à man manca della Croce. Vltimamente ſi cauano li 9 dal numero partito, e ſe l'operatione ſarà fatta bene, reſtarà vn numero, ſimile à quello nella ſiniſtra della Croce.

Come ſi conuerti vna quantità in altra quantità di ſpetie diuerſe.

CAP. III.

NOn oſtante, che nella Prefazione al Lettore, mi ſia dichiarato di non volere inſegnare li primi principij di queſta ſcienza: nondimeno prima di paſſar auanti hò per bene d'inſegnar in queſto luogo il modo di conuertire vna quantità in altra quantità di ſpetie diuerſa da quella. Mà per meglio intenderlo: biſogna prima hauere cognitione delle quantità, ò termini più principali, che cómunemente s'vſano nel negotiare frà Mercanti, quali ſono queſti, cioè, Scudi, Lire, Soldi, e Denari. Peſo. Libra, & Oncie. Brazzo, & Oncie, &c. e molti altri.

Il Scudo è vna quãtità, che ſignifica prezzo, e ſi diuide in 4. Lire. La Lira ſi diuide in 20 Bolognini, (chiamati per l'ordinario Soldi) li Soldo ſi diuide in 12. Denari. Il

Dena-

Denaro poi non hà altra diuisione, che la propria frazione, di che non se ne tien conto alcuno. Il Peso è vna quantità, che significa mercantia, e si diuide in 25. Libre. La libra si diuide in 12 Oncie. L'Oncia poi non hà altra diuisione, che la propria frazione, di che non se ne tiene conto alcuno nelle cose grossolane: mà nelle cose pretiose, e di gran valuta: l'Oncia si diuide in 24 Scrupoli. Vn Scrupolo si diuide in 24. Grani, e cialcun Grano pesa quanto pesa vn grano di Formento.

Il Brazzo è vna quantità lineale, diuiso in 12. Oncie. E'benvero, che innumerabili sono li vocaboli, le misure, &c. che s'vsano nel trafficare; secondo la diuersità delle materie di che si negotia: e secondo la varietà de'costumi delli paesi, doue si contratta: Mà questo poco importa il saperlo per quello, che quì pretendo. O veniamo al nostro proposito.

Volendo adunque conuertire qual si voglia quantità maggiore in altra spetie di quantità minore: per Regola vniuersale basta à moltiplicare quella tal quantità maggiore per le parti, in che è diuisa. Per esempio. Volendo conuertire li Scudi in Lire; basta à moltiplicarli per 4, perche il Prodotto saranno Lire. Per conuertire le Lire in Soldi, si multiplicano per 20. Per conuertire li Soldi in Denari, si multiplicano per 12. &c.

Volendo poi conuertire vna quantità minore, in'altra quantità maggiore, s'opera tutto al contrario: cioè si parte la quantità minore per le parti in che la quantità maggiore è diuisa. Per esempio. Volendo ridurre le Lire in Scudi, si partono per 4, & il Quotiente saranno Scudi. Per ridurre li Soldi in Lire, si partono per 20. Per ridurre li Denari in Soldi, si diuidono per 12. Per ridurre le Libre in Pesi, si diuidono per 25. e il Quotiente saràno Pesi, &c.

Chi volesse conuertire li Scudi in Denari, ouero li Pesi in Oncie, questo si può fare in due modi. Il primo si

fà

fà conuertendo li Scudi in Lire, le Lire in Soldi, & li Soldi in Denari, li Pesi in Libre, e le Libre in Oncie. Il secondo modo si fà in vn sol colpo, moltiplicando li Scudi per la quantità de' Denari, che contiene vn sol Scudo. E li pesi moltiplicandoli per la quantità dell' Oncie, che contiene vn sol peso. E perciò bisogna sapere, che lir. 4. fanno vno Scudo; soldi 80. (cioè Bolognini) fanno vno Scudo. Denari 690. fanno vno Scudo. Di più. Libre 25. fanno vn Peso, Oncie 300. fanno vn Pelo, &c. E questo serui d'auuiso per sapere conuertire, e per trasmutare altre spetie di Monete, di pesi, di misure, &c. Et acciò meglio s'arriui à capire il tutto, qui pongo in figura vn esempio.

Scudi 250	Lir. 1000	Soldi 20000
4	20	12
Sono Lir. 1000	Sono Sol. 20000	Sono Din. 240000

Scudi 250
Den. 960

150
225

Sono Denari 240000

In questo esempio si vede chiaro, che per l'vno, e per l'altro modo li Scudi 250 fanno Denari 240000. Per ridurli mò in scudi, basta à partirli per 960, ouero partirli prima per 12, & il Quotiente partirlo poi per 20, & il secondo Quotiente partirlo per 4. perche il terzo Quotiente saranno Scudi come in figura si vede.

De-

Denari	240000	250 Scudi	Denari	240000
690	1920		12	S.20000
			240	L.1000
	4800		4	1250 Sc.
	4800			
	 0			

Quando poi si tratta di Scudi di Paoli: questo è il più facil modo di calcolare, e di conteggiare, che si possi desiderare: perche essendo diuiso il Scudo in 10 Paoli: & il Paolo in 10 Baiocchi, per conuertire ogni gran quantità di Scudi in Paoli; basta aggiongerli vn o à man dritta: e per conuertirli in Baiocchi, se n'aggiongono due. Per contrario. Volendo ridurre in Scudi ogni quantità di Baiocchi, basta à tagliare due figure à man dritta; perche il resto saranno Scudi. Mà se fossero Paoli da ridurre in Scudi, se ne taglia vna sola.

Paoli 275 | 8 Baiocchi 370 | 50

Diuentano Scudi 275. Paoli 8. Diuentano Scudi 370. Baiocchi 50. cioè Paoli 10.

Per ridurre li Scudi 275. Paoli 8. tutti in Paoli, s' aggionge l'8. al 275. e faranno 2758. Paoli. Per ridurre li Scudi 370. e Baiocchi 50. tutti in Baiocchi, s' aggionge 50. al 370. e faranno 37050. Baiocchi. Che felicità. E tanto basti à chi hà giudicio.

COME SI MANEGGINO LI ROTTI Per tutte le spetie dell'Algorismo.

CAP. IV.

Del Numerare.

ROtto non è altro, che vna, ò più parti dell'intiero, ouero del suo tutto: come la metà, vn terzo, vn quarto, vn quinto, e così in infinito. Vero è, che le monete, ne' pesi, e nelle misure, non si seruono gli huomini di questi nomi de' rotti; mà dicono vn Soldo, quattr'oncie, Otto Denari, &c.

Qual

Qual si voglia rotto si descriue con due ordini di numeri. L'vno si chiama Numeratore: e questo si colloca sempre sopra vna virgoletta: e l'altro si chiama Denominatore; qual si mette sempre sotto la detta virgoletta, in questa forma.

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$

Vn mezo, vn terzo, vn quar. vn quinto, vn sesto, vn sett.

$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$

vn ottauo, vn nono, vn decimo, due terzi, trè quarti.

$\frac{5}{8}$ $\frac{11}{15}$ $\frac{50}{100}$

Cinque otttaui, vndeci quindeciesimi, cinquãta cẽtesimi.

Li Denominatori de' rotti da 10. in giù si pronunciano semplicemente secondo la loro natura; dicendo quarto, ottauo, nono, &c. mà dal dieci in sù s'aggionge questa parola (esimi) ouero (ecimi) Per esempio cinque decimi, ouero quindeci ventesimi: cioè delle 10. parti 5, e delle 20 quindeci.

Può accadere, che alle volte vi siano rotti, de' rotti. Per esempio $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{2}$. Il terzo si riferisce al suo tutto, & il mezo à relatione al $\frac{1}{3}$ come à dire, vn terzo di Libra, e mezo terzo.

Ogni rotto, che hà l'vnità solamente sopra la virgoletta, si chiama rotto semplice. Quel rotto è maggiore in quantità, che hà minore denominatione. Cosa certa è, che più è vn terzo, che non è vn quarto.

Quando non si sapesse discernere, qual rotto fosse maggiore, si moltiplicano insieme dette minutie in croce, ponendo il Prodotto sopra il Numeratore di esse; e quella minutia, c'haurà più numero, sarà maggiore, come si vede in questi esempij, ne' quali appariscono maggiori li $\frac{6}{8}$ e li $\frac{12}{15}$.

40	42	45	60
$\frac{5}{7}$	$\frac{6}{8}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{12}{15}$

Tan-

Tante parti constituiscono vn tutto, ouero vn intiero, quanto è il numero del suo Denominatore, come $\frac{3}{3}$. $\frac{3}{3}+\frac{5}{5}$. &c. fanno vn intiero. Il che occorre sempre, che il Numeratore del rotto sia eguale al Denominatore: dal che si caua, che quando il Numeratore fosse maggiore del Denominatore, sempre se ne può cauare vno, ò piú intieri. Per esempio $\frac{15}{3}$ dariano 5. intieri. Il che si fà partendo il Numeratore, per il Denominatore. Alle volte, e spesso occorre, che li Numeratori, e Denominatori de' rotti sono di tali numeri, che difficilmente l'intelletto può capire, che parte d'intiero si siano, e che quantità contenghino, come chi dicesse $\frac{16}{48}$ sedici quaranta otto esimi, &c. In tal caso bisogna schisare, e ridurlo alla sua minore Denominatione, che nel proposto rotto saria $\frac{1}{3}$, perche trè volte entra il 16. nel 48.

Del Schisare.

SChisare adunque non è altro, che ridurre il rotto alla minor Denominatione, che sia possibile, e che contenghi l'istesso valore.

Ne' rotti piccoli si può schisare a tastone: ma ne' grandi nò. Se il rotto è di numeri pari, si può schisare sicuramente ò per numeri pari, ò per dispari: ma se vno, ò tutti due li numeri del rotto sono dispari, nó si può schisare, se non per numeri dispari: come $\frac{14}{35}$, che si schisa per il 7, che due volte nel 14, e 5 nel 35 si conosce entrare.

Quando poi li numeri del rotto sono grandi: si schisa in questa maniera. Si parte il Denominatore per il Numeratore; del Quotiente non se ne fà conto alcuno, ma il residuo, serue per partire il Numeratore: e così vicendeuolmente si fanno il seruitio l'vn l'altro: fin che vn di loro arriui ad vna diuisione, che lasci l'vnità, ouero non vi resti cosa alcuna. Se vi resta l'vnità, tal numero, ò rotto non si può schisare in conto alcuno; ma di necessità bisogna lasciarlo con la medesima denomi-

vatione de' numeri, che si troua hauere; come $\frac{9}{35}$, & $\frac{77}{78}$ con altri infiniti; che da Matematici sono chiamati numeri primi frà di loro: perche non si troua numero alcuno, che comunemente partischi il Numeratore, & il Denominatore. Quando poi nõ resta numero alcuno, tal rotto si può schilare: e quel Partitore, che eguaglia la diuisione, sarà il cõmune, e massimo Schisatore del rotto, per il quale si parte, prima il Numeratore; il Quotiente del quale si mette sopra la virgoletta: dipoi si parte il Denomin. & il Quotiente si mette sotto la detta virgoletta. Serui d'esẽpio questo rotto $\frac{418}{627}$. Prima si parte il Denominatore 627 per il Numeratore 418, & auanza 209. Per questo 209 si parte il Numerarore 418, nè auanza cosa alcuna. Adunque 209 è il commun Diuisore del rotto, il quale entra due volte nel Numeratore, e trè nel Denominatore. Si che questo rotto $\frac{418}{627}$ sarà $\frac{2}{3}$ d'vn tutto; sia di che spetie si voglia.

Ogni volta, che si voglia conuertire vn Numero intiero in rotti, basta moltiplicarlo per il Denominatore del rotto, in che si vuole conuertirlo; e per contrario volendo ridurre li rotti in Numero intiero, basta partire il Numeratore per il suo Denominatore.

Dell'Accattare.

ACcattare, non è altro, che vn atto, ouero vn modo di sapere trouare vn numero semplice, qual habbia le parti di più Denominatori de' rotti. Per esempio d'$\frac{1}{2}$, d'$\frac{1}{5}$, e d'$\frac{1}{10}$. Per trouar mò tal Numero; basta moltiplicar frà di loro li Denominatori. Si che nel caso nostro moltiplicando 4 con 6, fà 24: e questo 24. moltiplicato per 10, ne produce 240. Adunque 240 è il Numero cercato; e, che senza spezzare l'vnità, hà tutte le qualità de propositi rotti. Se il 240 si parte per 4, ne viene 60; se per 6, ne viene 40; e se per 10, ne viene 24; che sono vn quarto, vn sesto, e la decima parte di 240.

Se-

Secondo modo dell'Accattare.

MA perche in molte operationi rielce più di proposito il trouare il minimo numero, ch'habbia le pretese parti; voglio, che qui trouiamo il minimo numero, ch'habbia le parti d'$\frac{1}{2}$, d'$\frac{1}{5}$, & d'$\frac{1}{10}$. Il qual modo è questo. Primieramente si troua il massimo Schisatore, che possi partire li Denominatori de' due primi rotti, che nel caso nostro è il 2. Diuidēdo adūque 4, e 6 per 2, neverrà 2, e 3: l'operatione starà, come quì si vede in figura. Doppo questo si moltiplicano in croce, il 2. col Denominatore 6: ouero il 3 col Denominatore 4; e per l'vno, e per l'altro verso ne verrà 12. Deuesi similmente trouare il massimo Schisatore di questo 12, e del 10. (Denominatore del terzo rotto) qual Schisatore è pur 2. Diuidendo mò per 2 il 12, & il 10, e facendo la moltiplicatione in croce (come sopra) l'operatione starà, come si vede in figura; e s'hauerà 60.

1	1
4	6
2	3
12	12

Adūque 60 è il cercato numero; & il minimo, che sia diuisibile per 4, per 6, e per 10, senza rōpere l'vnità. Per $\frac{1}{4}$ s'hauerà 15. Per vn $\frac{1}{6}$ s'hauerà 10, per $\frac{1}{10}$ s'hauerà 6. Quando non si troua numero, che parti li Denominatori; si multiplicano insieme, e poi si proseguisse auanti.

1	
12	10
6	5
60	60

Reduttione de' Rotti sotto vn medesimo Denominatore.

QVādo bisognasse ridurre due, ò più rotti di diuerse denominationi sotto vna medesima denominatione, si fà così. Si moltiplicano insieme vicendeuolmente in croce il Numeratore d'vn rotto col Denominatore dell'altro, e li Prodotti, posti sopra la virgoletta, saranno li Numeratori. Di

3	5
4	6
18	20
24	24

poi moltiplicando insieme li Denominatori de' dette propositi rotti, il Prodotto sarà Denominatore dell' vno, e dell'altro Numeratore, trouato con la moltiplicatione, fatta in croce, come nell' esempio si vede.

L'istessa operatione si può hauere per la Regola precedente, detta Accattare. Ma, quando li rotti di diuerse Denominationi fossero più di due, difficilmente si potriano ridurre ad vn sol Denominatore, senza questo atto dell'Accattare. Seruino d'esempio questi rotti $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{5}{12}$, per la prima Regola dell'Accattare, si troua vn numero c'habbia le parti di terzo, di quarto, di sesto, e di duodecimo; così; moltiplicasi il primo Denominatore col secondo, & il Prodotto per il terzo; e questo secõdo Prodotto moltiplicasi per quarto il Denominat. & in tutto ne verrà 864, e questo sarà Denominat. di tutti li propositi rotti: diuisibile per 3, 4, 6, e 12 sẽza rõpere l'vnità.

Per hauer mò il Numeratore di ciascun rotto: basta il pigliare di questo 864 le douute parti. Per il primo rotto ne piglio $\frac{2}{3}$, per il secondo ne piglio $\frac{3}{4}$, per il terzo ne piglio $\frac{1}{6}$, e per il quarto ne piglio $\frac{5}{12}$, e staranno così. $\frac{576}{864}$. $\frac{648}{864}$. $\frac{144}{864}$. $\frac{360}{864}$.

Il modo di pigliare dette parti è vna Regola dignissima; e da conseruarsi bene nella memoria; perche serue in mille occasioni, per sapere, che parte d'vn tutto contenghi qual si voglia gran rotto. Il modo è questo, Basta moltiplicare l'864 per il Numeratore, & il Prodotto partirlo per il Denominatore, perche il Quotiente sarà il cercato numero. Si che tanto è dire; dammi $\frac{2}{3}$ di 864, quanto è moltiplicare $\frac{2}{3}$ con 864. (Quando sarai arriuato al moltiplicar de' rotti, l'intenderai meglio.)

Per maggior intelligenza dò questo esempio. Nel fine di certa mia operatione, mi trouo hauer questo rotto di Scudo $\frac{750}{1200}$, cioè delle 1200. parti d'vn Scudo, ne pretendo 750. Quiui più d' vno saria [illegible] intrigati: poi-

che

che il scudo conuertito in Denari, non passa 960. Denari: ma nel nostro suppostо il Scudo resta diuiso in 1200. parti. Hora mò, secondo l'insegnata Regola, multiplicando li 960. Denari, per il 750. (Numeratore del rotto) ne viene di Prodotto 720000. qual diuiso per 1200. (Denominatore di esso) di Quotiente s'haueranno 600. Denari. Si che il rotto di Scudo $\frac{750}{1200}$ contiene 600. Denari, cioè Lir 2. -- 10. -- 0. E questo seruid'auuiso in ogni materia. Basta à conuertire vn tutto nelle sue minime parti: come vn Scudo in Denari. Vn Peso in Oncie, &c. e poi operare (*vt supra.*)

Ma chi volesse operare per il secondo modo dell'Accatare. Il minimo numero, ch'habbia le parti de' propostі rotti, saria 12. e seruiria per commune Denominatore di ciascun rotto. Pigliandone poi le douute parti come poco sà hò insegnato: s'haueranno $\frac{8}{12}\frac{9}{12}\frac{2}{12}\frac{5}{12}$. Ma qui bisogna auuertire, che non hauendo li due primi Denominatori altro numero, che communemente li pari, eccetto l'vnità: basta a moltiplicarli insieme, e saranno 12. Doppo questo, si troua il massimo schisatore del 12. e del terzo Denominatore, che sarà 6. e poi s'opera nel restante come sopra, (e serui d'auuiso.)

Quando poi s'hauessero da ridurre minutie di minutie, cioè rotto di rotto ad vna Denominatione del suo intiero, ouero ad vna semplice minutia (che tutto è vno) basta a moltiplicare frà di loro li Numeratori, e frà di loro li Denominatori. Per esempio. Questo rotto di rotto, cioè $\frac{3}{7}$ di $\frac{4}{5}$ si ridurria à questa sèplice minutia $\frac{12}{35}$. Di modo che 3. quinte parti di quattro settime parti d'vn tutto, contengono $\frac{12}{35}$. del medemo intiero, ò tutto. E se nel proposto esempio si parlasse d' vn scudo, li $\frac{12}{35}$ sariano Soldi 2. Din. 3. $\frac{3}{7}$.

Sommare de' Rotti.

QVanto al Sommare de' rotti, non v'è altro da notare, se non che bisogna prima ridurli tutti sotto

vna medema denominatione, come di sopra hò insegnato. O moltiplicandoli in Croce, se sono solamente due, ouero per la Regola dell'Accattare, se sono più di due. Ma più di proposito sarà quella di trouare il minimo numero, ch'habbia le parti de' proposti rotti: poiche questa Regola riduce ciascun rotto alla sua minima denominatione. Il che fatto: basta à Sommare insieme tutti li Numeratori, e partire poi la somma per vn sol Denominatore, (per esser tutti li Denominatori eguali) perche il Quotiente sarà il numero de' sani, ouero intieri, contenuti ne' proposti rotti: quai sani s'aggiongono a gli altri sani, se ve ne sono. Per esempio. Chi volesse sómare questi quatro rotti, $\frac{2}{3}$. $\frac{3}{4}$. $\frac{1}{6}$. $\frac{5}{12}$, già sappiamo, ch'hauédoli ridotti alla loro minima denominatione, e sotto l'istesso Denominat. habbiamo $\frac{8}{12}$. $\frac{9}{12}$. $\frac{2}{12}$. e $\frac{5}{12}$. Hora mò Io dico, che si sommi li Numeratori, ed haueremo $\frac{24}{12}$, che sono precisamente due intieri. Se fosse auanzato qualche cosa, l'auanzo si metteria sopra, ed il commun Denominatore sotto la lineetta, ò virgola. Questo Sommare de' Rotti non è punto differente dal sommare li Soldi, e Denari. Attento alla proua. Certa cosa è, che vn Soldo è $\frac{1}{20}$ di Lira, e vn Denaro è vn $\frac{1}{12}$ di Soldo: perche tanto vale 12. Denari, quanto val vn Soldo: e tanto val 20. Soldi, quanto val vna Lira, perche vn tutto di Lira si diuide in 20. Soldi: e vn tutto di Soldo, si diuide in 12 Denari. Siche il Denominatore della Lira fatta in Soldi, è 20. e il Denominatore del Soldo fatto in Denari è 12. Li Numeratori poi di ciascuno di questi Denominatori, sono li Denari istessi, ò soldi medesimi. Per esempio 4. Soldi sono $\frac{4}{20}$ di Lira, e 4. Denari sono $\frac{4}{12}$ di Soldo: ma perche tutti li Soldi, e tutti li Denari sono d'vna medesima Denominatione, secondo la loro spetie: di qui è, che noi sommiamo semplicemente li Denari, e li Soldi, e la somma diuidiamo per 12, ò per 20, e il Quotiente li

te-

teniamo per intieri: ma in fatti si sommano come Numeratori. Adunque ridotta qualsiuoglia quantità di rotti ad vna medema denominatione, per sommarli, basta vnire li numeratori, e partire per il cõmun Denominatore.

Del Sottrare de'Rotti.

IL Sottrare de'rotti non è parimente differente in conto alcuno dal Sottrare de'numeri sani, ouero intieri. Basta a ridurli ad vna medema denominatione; e poi sottrare l'vno dall'altro, cioè vn Numeratore dall'altro Numeratore. Ma quando il rotto di sotto fosse maggiore del rotto di sopra, in tal caso al rotto di sopra s'impresta vn tutto, fatto in minutie, secondo che ricerca il Denominatore d'esso rotto superiore, ouero inferiore: perche già sono ridotti a denominatione simile: siccome appunto nõ potendo cauare vna quantità di Danari da vn altra quantità inferiore, à questa quantità inferiore, siamo soliti d'impresstarli un Soldo, fatto in Denari: ed a Soldi impresstiamo vna Lira, fatta in Soldi, &c. Qui propongo vn esempio da filosofarui sopra.

A Sottrar $25\frac{5}{9}$ Ridotti ad vna medema denominatione,
questi $18\frac{3}{4}$ sono $\frac{20}{36}$, & $\frac{27}{36}$.

Restano 6, & $\frac{29}{36}$.

Perche il rotto di sotto contiene $\frac{27}{36}$, e quello di sopra ne contiene solamente $\frac{20}{36}$ però si deue impresstare a quel $\frac{20}{36}$ l'vnità, conuertita in 36 parti: per esser tale il commune Denominatore de'rotti. Anzi per regola vniuersale basta a sommare il Denominatore 36 col suo numeratore 20, & hauuremo poi $\frac{56}{36}$. Cauando mò $\frac{27}{36}$ da $\frac{56}{36}$, ne restano $\frac{29}{36}$. Fatto questo: si porta l'vnità qual s'aggionge a 18. e poi al solito si dice, 19. di 25, resta 6. $\frac{29}{36}$.

La proua del Sommare, e del Sottrare de'rotti si fà in tutto, e per tutto, come si fà quella del Sommare, e Sottrare de'sani; non quella del cauare tutti li 9. ma l'al-

l'altra iui insegnata: cioè con l'atto contrario.

Del Moltiplicare de' Rotti.

PEr moltiplicare li rotti, (quali si siano) non è necessario ridurli ad vna medema Denominatione: ma si moltiplicano quali si trouano. E tutta la serie del moltiplicar rotti consiste in sapere moltiplicar rotto con rotto, e rotto con sano solo.

A moltiplicare rotto con rotto; basta à moltiplicar li Numeratori insieme, e li Denominatori insieme: (se fossero ben 50. rotti,) e li Prodotti metterli a suo luogo sotto, ò sopra la virgola.

A moltiplicare sani soli con rotto solo, si fà così. Si moltiplica il Numeratore del rotto con li sani; ed il Prodotto partendolo per il Denominatore, il Quotiente sarà la ricercata moltiplicatione. O vedete quanto è facile. Alla pratica.

A moltiplicar $\frac{5}{9}$ cõ $\frac{4}{9}$, fà $\frac{20}{72}$. A moltiplicar $\frac{2}{3}$ e $\frac{3}{4}$ con $\frac{2}{7}$, fà $\frac{12}{280}$. (cioe $\frac{1}{70}$.

A moltiplicar 25 con $\frac{3}{4}$	A moltiplicar 12 con $\frac{3}{5}$	A moltiplicar 50 con $\frac{4}{7}$
4 ¦ 75	5 ¦ 24	7 ¦ 200
fà $18\frac{3}{4}$.	fà $4\frac{4}{5}$.	fà $28\frac{4}{7}$.

Quando poi con li sani fossero rotti, da moltiplicarsi cõ rotto solo: ouero quando s'haueßero da moltiplicare sani, e rotti, con sani, e rotti: il più sbrigato modo, che sia; è conuertire li sani alla natura del suo rotto: e poi moltiplicarli insieme, come si fà a moltiplicar rotto con rotto. Alla pratica.

A moltiplicar $15\frac{2}{3}$

per $\frac{3}{5}$ ne viene $9\frac{6}{15}$

Li sani fatti in terzi sono $\frac{47}{3}$. Moltiplicati con $\frac{3}{5}$ producono $\frac{141}{15}$ cioè 9. intieri, e $\frac{6}{15}$.

A multiplicar 6 $\frac{1}{4}$
per 5 $\frac{2}{3}$ ne viene 32 $\frac{23}{36}$.

Li ſani fatti in rotti, ſtanno così $\frac{25}{4}$. & $\frac{47}{9}$. Moltiplicati inſieme producono $\frac{1175}{36}$, che fanno 32. intieri, e $\frac{23}{36}$.

Queſte ſorti di moltiplicari ſi potriano fare, laſciando ogni coſa nel ſuo eſſere; & il tutto ſtaria nel termine del moltiplicar rotto con rotto; e rotto cõ ſano: mà non è da praticarſi; perche per ordinario ne vengono trè rotti di varie ſpetie; che ſono poi cauſa d'intrigo nel ſommarli.

A moltiplicare 15 $\frac{4}{7}$.
con 11

165 5144
$\frac{8}{7}$ $\frac{4}{7}$

fà 173 $\frac{4}{7}$.

Ogni volta, che s'habbia da moltiplicare ſani, e rotti, con ſani ſoli. Si moltiplicano li ſani inſieme: e poi il rotto con li ſani contrarij: e li Prodotti s'vniſcono inſieme: come di ſopra ſi vede. Etanto baſti.

Del partire de' Rotti.

SE li rotti ſono tutti d'vna medeſima denominatione; baſta partire ſemplicemente il Numeratore del rotto, che ſi vuol partire, per il Numeratore del Partitore: ed il Quotiente ſarà il numero cercato. E' però da notare; che nel partir de' rotti, s'vſa anco a partire il numero minore, per vn numero maggiore: (coſa che pare impoſſibile; ne ſi può fare con numeri ſani.) Eccone due eſempij.

A partir per $\frac{2}{7}$ $\frac{5}{7}$ ne viene $\frac{5}{2}$. A partir per $\frac{2}{7}$ $\frac{5}{7}$ ne viene $\frac{35}{10}$

$\frac{2}{7}$ $\frac{5}{7}$ ne viene $\frac{5}{2}$ Rotti

Rotti di varie Denominationi.

MA se li rotti saranno di diuerse denominationi, si moltiplicano in croce, per ridurli tutti sotto vna medema denominatione. Il che fatto, si portano li Numeratori, come sopra. Vero è, che non occorre notare il commune Denominatore, perche non serue a cosa alcuna; ma basta notare solamente li Numeratori; come in questi esempj si vede.

A part. per $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$ ne vien $1\frac{1}{2}$. A part. per $\frac{2}{5} \times \frac{5}{6}$ ne vien $(2\frac{2}{12}$

Numer. 8 — 9 Numer. 12 | 25

A part. per $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$ ne vien $\frac{8}{9}$. A part. per $\frac{5}{6} \times \frac{2}{5}$ ne vien $\frac{12}{37}$.

Numerat. 9 | 8 Numerat. 25 | 12

Quando poi occorresse partire sani per rotti, ouero sani, e rotti, per sani, e rotti; in tal caso sempre si conuertono li sani nella natura del suo rotto. Di poi moltiplicandoli in croce, per hauerli tutti d'vna medema denominatione, si partono come sopra; auuertendo però, che il Partitore si suol mettere à man sinistra; e a man destra il numero, ò rotto, che si vuol partire, come con esempij si fà chiaro.

A partir per $\frac{2}{3}$ 8 cioè $\frac{24}{3}$, ne vien 12. Per $\frac{3}{7}$, 9 $\frac{3}{4}$ ne vien $14\frac{5}{8}$

Per $3\frac{1}{4}$. $18\frac{1}{2}$, ne viene $5\frac{9}{13}$. Per 6. $\frac{3}{7}$, ne viene $\frac{3}{10}$.

Quando che nel partire, ouero nel numero da partirsi, vi sono solamente sani; e nell'altro rotti soli, ò rotti, e sani; si mette il numero intiero, che non hà rotto sopra la virgoletta, con l'vnità sotto di essa in forma di rotto

to, e poi si fà la moltiplicatione in croce, per ridurli ad vna medema denominatione, mà in fatti riesce l'operatione, come sopra.

Per esempio. Chi volesse partire per 6 $\frac{2}{5}$ questi 25. si colocariano li numeri così

Numeratori 20 75

Et operando, s'haurà di Quotiente 3 $\frac{15}{20}$ cioè $\frac{3}{4}$.

Volendo mò operare per l'altro modo, si conuertiriano li 25. intieri in terzi; che sariano 75 terzi, e poi si partiriano per 20; che tutto riesce vna cosa istessa.

Se si volessero applicare li sopradetti, ò altri partiti a cosa materiale, si potria dir così.

Se $\frac{2}{3}$ d'Oncia di Muschio costano Lir. 8. Quanto costarà l'Oncia?

Operando, (come sopra) vn Oncia costaria Lir. 12.

Ouero. Se $\frac{2}{5}$ d'vn Brazzo di Velùdo costano Lir. 9 $\frac{3}{4}$. Quanto costarà il Brazzo?

Operando, come hò detto, costarà Lir. 14 $\frac{5}{8}$. E tanto basti per aprir l'intelletto. Ma in fatti tal operatione non si scosta da precetti della Regola Aurea.

La proua del Partire, e del moltiplicare de rotti si fà con l'atto suo contrario; cioè la proua del moltiplicare si fà col Partire, e quella del Partire si fà col Moltiplicare.

Per esempio. A partire per $\frac{2}{7}$ questi $\frac{3}{5}$ di Quotiente ne viene 2 $\frac{1}{2}$. Volendo mò prouare, che stia così, basta a moltiplicare insieme il Quotiente 2 $\frac{1}{2}$. col Partitore $\frac{2}{7}$. perche, se l'operatione sarà fatta bene, ne verrà di Prodotto il numero partito; cioè $\frac{3}{5}$. E perche a moltiplicare 2 $\frac{1}{2}$, con $\frac{2}{7}$. ne viene $\frac{10}{14}$, che schisati fanno $\frac{3}{5}$. (Numero partito) adunque il partire fù buono.

Quanto poi alla proua del Moltiplicare, si fà col partire

tire il Prodotto per l'vno de due numeri moltiplicanti (qual si vuole) perche, se l'operatione sarà fatta bene, nel Quotiente s'haverà l'altro numero, concorrente al Prodotto. Per esempio. A moltiplicar $\frac{2}{3}$ con 8 intieri, ne viene di Prodotto $5\frac{1}{3}$. Per farne mò la proua: se si parte il Prodotto $5\frac{1}{3}$ per il numero moltiplicãte $\frac{2}{3}$; nel Quotiẽte s'haueranno 8. intieri; e se si parte per 8. di Quotiente s'haueranno $\frac{2}{3}$. Adunque il moltiplicare stà bene.

Li Moltiplicari, e li Partiri de rotti si prouano parimente per la Regola del 9. così. Se il Moltiplicare, ò il Partire è solamente di rotti; basta à cauare la proua dal Numeratore, e dal Denominatore; e l'vna, e l'altra metterla al suo luogo, sotto, ò sopra la virgola. Mà se la proua sarà di sani, e rotti; prima si caua la proua del numero sano, e dal Denominatore del rotto, e queste due proue si moltiplicano insieme. Di poi cauando la proua da questo moltiplicato; a questa tal proua s'aggionge la proua del Numeratore del rotto. Finalmente cauando la proua da questa somma, essa proua si mette sopra la virgoletta, e sotto di essa si mette la proua del Denominatore del rotto. Ò veniamo alla pratica.

S'habbia da prouare $78\frac{60}{724}$. La proua del numero intiero è 6. e quella del Denominat. del rotto 724 è 4. Moltiplicando 6 per 4. fanno 24. la proua del quale è pur 6. Questa proua aggiongendola alla proua del Numeratore 60, la quale parimente è 6, fanno frà tutte due 12, la cui proua è 3. da mettere sopra la virgola, e sotto di essa si coloca la proua del Denominatore del rotto, la qual fù trouata essere 4. siche la proua di $78\frac{60}{724}$ sarà $\frac{3}{4}$.

Inteso bene quanto di sopra hò insegnato; facilissimamẽte si prouano li Moltiplicari, e li Partiri de rotti; procedẽdo cõ l'ordine del prouar li Moltiplicari, e Partiri de sani; cioè, Prima, si caua la proua dal numero, che si moltiplica. Secondo dal numero, per il quale si moltiplica.

Ter-

Terzo, si moltiplicano insieme queste due proue: dal quale moltiplicato cauandone la proua, si conserua, perche la proua del Prodotto deue essere simile alla proua di tal moltiplicato: (come appunto si fà de' sani.)

Alla pratica. A moltiplicare 11, e $\frac{3}{4}$ per 3, e $\frac{2}{3}$, ne vengono di Prodotto 43 $\frac{1}{12}$. La proua di 11, e $\frac{3}{4}$, secondo la sopradetta regola è $\frac{2}{4}$. La proua di 3, e $\frac{2}{3}$ è $\frac{2}{3}$; che moltiplicati con li $\frac{2}{4}$, fanno $\frac{4}{12}$; la cui proua è $\frac{3}{4}$. La proua poi del Prodotto 43, e $\frac{1}{12}$ è pur ancor lei $\frac{4}{12}$. Adunque la ragione stà bene, perche la proua di $\frac{4}{12}$ è ancor lei $\frac{4}{12}$.

Esempio d'vn Partire. A partire 18, e $\frac{1}{4}$ per $\frac{1}{4}$, ne viene 5, e $\frac{2}{11}$ schisati. La proua di 18, e $\frac{1}{2}$ è pur $\frac{1}{2}$. La proua di 3, e $\frac{1}{2}$ è $\frac{4}{9}$, che moltiplicata col $\frac{1}{2}$, fà $\frac{4}{9}$, cioè $\frac{1}{2}$. La proua poi di 5, e $\frac{2}{11}$ è $\frac{2}{4}$, cioè $\frac{1}{2}$. Adunque stà bene. Fà vn altra proua. Moltiplica in croce quel $\frac{1}{2}$, e $\frac{2}{4}$, che lasciaranno 44. La cui proua è eguale. 44

Perche causa il moltiplicare de rotti cali nel Prodotto, & il Partire creschi nel Quotiente.

LA causa, per la quale il Prodotto del Moltiplicare de' rotti è sempre manco di qual si voglia moltiplicante (contro la natura del Moltiplicare) è questa. Bisogna sapere, che il moltiplicare s' appartiene propriamente alla quantità discreta: come quella, che nel crescere tende all'infinito: si che duplicando, triplicando, quadruplicando, &c. di necessità il Prodotto deue esser maggiore del moltiplicante: e dell'istessa specie: ma perche l'vnità, e qual si voglia rotto (come parte di essa) cade sotto la quantità continua: alla quale secondo Euclide in più luoghi non si conuiene il nome di moltiplicare; ma quest'altro di menare, ò dure (per esempio) vna linea in vn altra; di qui è, che non è marauiglia, se moltiplicando vn rotto, non cresce; ma cala, e ne viene vn Prodotto di spetie diuersa; per esempio. Moltiplicando vna linea longa $\frac{1}{3}$ di Piedi con vn altra lon-

longa $\frac{1}{3}$ Piede, ne produrra vna ſuperficie ſolamente di $\frac{2}{6}$ di Piede. Quanto più ſi ſminuzza vna coſa, ciaſcuna parte contiene ſempre minor quantità di tal tutto; e ſe il moltiplicare de' rotti è vn ſminuzzar ſempre più tal quantità; però non è marauiglia, ſe il Prodotto cala, &c. Ma in pratica li Aritmetici non fanno differenza (quanto al nome) frà il moltiplicare de' ſani, & il moltiplicare de' rotti. Dalla quantità diſcreta alla continua.

Quanto poi al partire de' rotti, ſi vede vn effetto contrario alla natura del partire; la qual vuole, che la parte ſia minore del ſuo tutto; e pure nel partire de' rotti ſi vede, che il Quotiente è ſempre maggiore del numero diuiſo; e la ragione è queſta; perche eſſendo il rotto quantità continua, impropriamente ſi dice partire; ma propriamente ſe li conuiene queſto vocabolo di miſurare, ouero numerare; e veramente diſdice aſſai il dire; partitemi $\frac{1}{3}$ per $\frac{1}{2}$, ma ſe ſi dira quante volte vn $\frac{1}{3}$ miſura, ouero numeri, ò entri in $\frac{1}{2}$, non diſdice; & in fatti ſi vede, che ragioneuolmente il Quotiente creſce, perche ſi come il moltiplicare de' rotti è vn ſminuzzarli ſempre più: per contrario il partirli è vn radunarli inſieme, & vn farli creſcere in potenza in riſguardo al ſuo tutto.

Belle coſarelle, ſpettanti a' Rotti.

ACciò meglio ſi conoſchi la natura, e la forza de' rotti, ſi deue ſapere; che tanto è dire, dammi $\frac{2}{3}$ di 25. quanto è dire moltiplica per $\frac{2}{3}$ 25. Tanto appunto rieſce a dire; cauami, ò trouami $\frac{3}{4}$ di $\frac{5}{9}$: quanto a moltiplicare per $\frac{3}{4}\frac{5}{9}$. Certa coſa è, che a volere $\frac{2}{3}$ di 25, biſogna partire il 25 in tre parti eguali; che ſaria di 8, e $\frac{1}{3}$; e per $\frac{2}{3}$ ne verrà 16, e $\frac{2}{3}$. Hora mò, facciaſi la moltiplicatione, come s' inſegnò, e ne verrà pure 16, e $\frac{2}{3}$. Parimente, ſecondo l'ordine del partire de rotti, $\frac{3}{4}$ di $\frac{5}{9}$ ſarà $\frac{5}{36}$, quali triplicando fanno in tutto $\frac{15}{36}$, che ſchiſati per 3, ſono $\frac{5}{12}$. Hora mò, facciaſi la moltiplicatione de' $\frac{3}{4}$

con

con li $\frac{5}{9}$, e ne verrà appunto $\frac{15}{18}$, quali schisati per 3. ne vengono pure $\frac{5}{12}$.

Ogni volta, che bisognasse sapere, che parte, ò parti d'vn numero maggiore sia vn numero minore: bisogna sempre partire il numero minore per il numero maggiore. Per esempio. Voglio sapere, che parte di 24 siano 16. Facciasi la partitione, e ne riuscirà $\frac{16}{24}$, quali schisati per 8, fanno $\frac{2}{3}$. Parimẽte per sapere, che parte di $\frac{8}{9}$ siano $\frac{3}{4}$ s'opera, come sopra, e ne viene $\frac{27}{32}$; e chi volesse sapere, che parte siano di 6, e $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$, si trouarà, che sono $\frac{6}{13}$, cioè, $\frac{3}{26}$. E così con qual si voglia altro proposto numero. Li sopradetti due atti sono contrarij l'vno all'altro; perche l'vno col moltiplicare, e l'altro si fà col partire; sì che la proua d'vno consiste nell'atto dell'altro. Per esempio. Già dissi, che li $\frac{3}{4}$ di $\frac{5}{9}$ erano $\frac{5}{12}$. Hora mò per farne la proua, vedasi, che parte siano $\frac{5}{12}$ di $\frac{5}{9}$; & in fatti riusciranno $\frac{3}{4}$. Parimente s'è detto, che 16 sono li $\frac{2}{3}$ di 24. Per farne la proua, trouasi li $\frac{2}{3}$ di 24, e ne risulta 16; e così con altri.

Del traslatare, & infilzare de' Rotti.

TRasmutare, ouero traslatare de' rotti non è altro, che conuertire vn rotto di strana Denominatione in vn altra spetie di rotto più nota, e chiara: il che si può fare in due modi. Il primo si fà col moltiplicare il Numeratore del rotto, che si vuole traslatare, col Denominatore del rotto, in che si vuole traslatare; perche il Prodotto partito per il Denominatore del rotto, che si trasmuta; lascierà nel Quotiente il numero cercato. Per esempio. Volendo conuertire $\frac{11}{13}$ in tanti quarti, si moltiplica il Numeratore 11 per 4 (Denominatore di $\frac{1}{4}$) & il Prodotto 44 diuidendolo per il Numeratore 13 di Quotiente s'hauerà 3 $\frac{5}{13}$, e sono quarti. Adunque $\frac{11}{13}$ riescono $\frac{3}{4}$, e $\frac{5}{13}$ d'vn quarto. Il secondo modo si fà col partire il rotto, che si vuole trasmutare, per quello, in

che

che si vuole traslatare, perche il Quotiente sarà lo cercato numero. Il che facendo nel proposto caso, ne vengono pure $\frac{3}{4}$, e $\frac{5}{13}$. L'operatione in sostanza è come la prima.

L'infilzare è vn atto totalmente contrario all'atto del trasmutare: e però la proua dell'vno si fà con l'atto dell'altro. Con l'infilzare si proua il traslatare; e col traslatare si proua l'infilzare. Infilzare adunque non è altro, che vnire insieme più rotti, d'vn rotto: ouero più rotti de'rotti, e ridurli tutti sotto vn rotto solo, ch'habbia relatione solamente a quel primo principal tutto. Il qual atto si fà cosi. Nel traslatare dicessimo, che $\frac{11}{13}$ si mutauano in $\frac{3}{4}$, e $\frac{5}{13}$ di quarto. Hora mò a chi volesse infilzare questi due rotti $\frac{3}{4}$, e $\frac{5}{13}$ di quarto, si moltiplica il Denominatore del primo rotto a man dritta, cioè il 13, con il 3 (Numeratore del secondo rotto) e fanno 39; al quale s'aggionge il 5, (Numeratore del primo rotto) che in tutto fanno 44; il quale si mette sopra vna virgoletta; e sotto di essa si mette la moltiplicatione de' suoi Denominatori 4, e 13, che fanno 52. Adunque infilzando $\frac{1}{4}$, e $\frac{5}{13}$ di quarto, rielcono $\frac{44}{52}$, quali schisati per 4, fanno appunto $\frac{11}{13}$ d'vn intiero: e non d'altra parte.

Se li rotti fossero più di due; (siano quanti si vogliono) si comincia sempre a infilzare a man dritta, & infilzati li due primi rotti, come sopra, il Prodotto di questi s'infilza col terzo rotto: e parimente il Prodotto di questo, s'infilza col quarto: e così successiuamente. Due cose bisogna auuertire. La prima, che a man stanca nel primo luogo si mette il maggior rotto di quantità intrinseca; cioè il rotto dell'intiero; e poi gli altri successiuamente, secondo che vno nasce dall'altro. La seconda è; che sempre si comincia ad infilzare a man dritta; e per molti rotti, che s'infilzino, non possono mai arriuare a fare vn tutto, ò intiero; perche il principio d'on-

d'onde nascono tutti li rotti de' rotti è pur ancor lui rotto. Per esempio. Chi volesse infilzare $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$, & $\frac{1}{8}$. Infilzati li $\frac{4}{5}$. & $\frac{1}{8}$ nel modo sudetto; fanno $\frac{17}{40}$ Infilzando poi questi $\frac{17}{40}$ con li $\frac{5}{8}$, fanno $\frac{137}{160}$. Finalmente infilzati questi $\frac{137}{160}$ con li $\frac{2}{3}$, (rotto maggiore, e primario) faranno in tutto $\frac{457}{480}$ d' vn intiero. Li mancano solamente $\frac{23}{480}$ Li $\frac{3}{4}$ sono parte di $\frac{1}{3}$ solamente. Li $\frac{2}{5}$ sono parte di $\frac{1}{4}$. & $\frac{1}{8}$ è parte solamente di $\frac{1}{5}$, che perciò si chiamano rotti di vn rotto.

Ma se il rotto di rotto, si piglia in altro senso; cioè, che il rotto seguente sia minutia, e parte di tutto il rotto precedente; come se li $\frac{3}{4}$ fossero trè quarte parti di tutti li $\frac{2}{3}$, &c. l'ineftamento, ouero infilzamento si fà così.

Supponiamo gl'istessi rotti cioè $\frac{2}{3}$ d'vn intiero, $\frac{3}{4}$ di due terzi; $\frac{2}{5}$ di trè quarti, & $\frac{1}{8}$ di due quinti: Questi si descriuono, (come nell'altro modo,) col rotto primario a man manca così $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{8}$, & à man manca si comincia l'infilzadura; (al contrario dell'altro modo, che comincia a man dritta.) Si moltiplica adunque il 2, (Numeratore del rotto primario) col 4, (Denominatore del rotto seguente,) e fanno 8; al quale aggiongendo 6. (Prodotto delli due primi numeratori 2, e 3.) fanno 14. Questo 14 si moltiplica per 5. (Denominatore del terzo rotto,) e fanno 70. al quale aggiongendo 12, (Prodotto delli trè numeratori 2, 3, 2, frà di loro,) fanno 82. Vltimamente moltiplicando questo 82 per 8, (Denominatore dell'vltimo rotto) fanno 656; al quale aggiongendoui 12. (Prodotto di tutti quattro li Numeratori frà di loro,) faranno 668, e questo sarà il Numeratore già infilzato. Per hauer mò il suo Denominatore; basta a moltiplicare frà di loro tutti li Denominatori de' propolti rotti; che nel caso nostro sarà 480. Adunque li $\frac{2}{3}$ d'vn tutto, li $\frac{3}{4}$ di $\frac{2}{3}$, li $\frac{2}{5}$ di $\frac{3}{4}$, di $\frac{2}{3}$, & $\frac{1}{8}$ di $\frac{2}{5}$, di $\frac{3}{4}$, di $\frac{2}{3}$ formano questo rotto $\frac{668}{480}$,

cioè vn intiero, e $\frac{188}{480}$. Ideſt $\frac{47}{120}$ (già ſchiſati.

Che queſto ſia così, facciamone la proua; riducendo ciaſcuna minutia di minutia a rotto d'intiero, (come hò inſegnato di ſopra a car. 29,) L'$\frac{1}{8}$ di $\frac{2}{7}$, di $\frac{3}{4}$, di $\frac{2}{3}$, diuentano $\frac{12}{480}$ d'vn intiero; che ſchiſati ſono $\frac{1}{40}$. Li $\frac{2}{5}$ di $\frac{3}{4}$, di $\frac{2}{3}$ diuentano $\frac{12}{60}$ d'vn intiero; che ſchiſati ſono $\frac{1}{7}$, e li $\frac{3}{4}$ di $\frac{2}{3}$ diuentano $\frac{6}{12}$ pur d'vn intiero; che ſchiſati ſono $\frac{1}{2}$, e poi vi ſono li $\frac{2}{3}$ d'vn intiero. Hora mò dico; che ſe ſi ſommaranno inſieme tutti queſti rotti d'intiero, cioè $\frac{1}{40}$, $\frac{1}{7}$, $\frac{1}{2}$, e $\frac{2}{3}$, faranno di brocca 1 $\frac{47}{120}$.

Frà queſte due ſpetie d'infilzare v'è queſta particolarità da oſſeruare, che nella prima ſpetie non biſogna mai ſchiſare alcuna minutia, nè ridurla a minima denominatione, fin che non ſi ſia finito d'infilzare: ma in queſta ſeconda ſpetie ſi poſſono ridurre a minimi termini tutte le minutie, ò parte di eſſe ſenza pericolo d'errore. E notiſi bene.

La prima ſpetie dell'infilzare ſerue di garbo per diuidere qual ſi voglia numero intiero, che ſia accompagnato da qualche rotto, per vn altro numero intiero. Per eſempio. Voglio partire 20, e $\frac{1}{4}$ per 12, ma per diuiderlo nel propoſto modo; diuidendo l'intiero 20 per 12, ne viene di Quotiente 1 $\frac{8}{12}$: e perche, chi voleſſe partire $\frac{1}{4}$ per 12, ne vengono $\frac{1}{4}$ d'$\frac{1}{12}$, ne ſeguita: che infilzando li $\frac{8}{12}$ col rotto propoſto da partire con l'intiero cioè $\frac{1}{4}$, ne vengono $\frac{33}{48}$. Ideſt $\frac{11}{16}$, e così per queſta Regola a partire 20 $\frac{1}{4}$ per 12, ne vengono di Quotiente 1 $\frac{11}{16}$. Il che rieſce anco per la Regola del partire. Si può anco far così. Ponganſi gl'intieri in forma di rotto, col Partitore ſotto, & il numero da diuidere ſopra la virgola, e poi ſi faccia l'infilzamento di queſta minutia con la minutia da diuiderſi, Ecco l'eſempio.

Nu-

Numero da partirsi 20 1

Numero partitore 12 4

81

48

Riescono $\frac{81}{48}$, cioè vn intiero, & $\frac{11}{16}$ come sopra.

Interrogationi sopra li Rotti.

S'Vno diceſſe: hò infilzato tanti terzi, tanti quarti, tanti quinti, e tanti ottaui; che dall' vltimo rotto infilzato mi venne $\frac{457}{480}$. Hora mè, s'addimanda, quanti terzi, quarti, quinti, e quanti ottaui furono infilzati?

Per ſaperlo ſi fà così. Primo, ſi moltiplicano li Denominatori propoſti, l'vno con l'altro; cioè 3, 4, 5, e 8; il che fatto, danno appunto 480, eguale al Denominatore di tutto l'aggregato propoſto $\frac{457}{480}$. Secondariamente ſi parte il Numeratore 457 per il Denominatore del primo rotto infilzato, che fù 8. Il che fatto ne viene 57. di Quotiente, & auanza $\frac{1}{8}$. Queſto Quotiente 57. ſi parte per il 5. (Denominatore delli quinti.) Il che fatto; s' haurà 11. di Quotiente, & auanzarà $\frac{2}{5}$. Dopo queſto, ſi parte il paſſato Quotiente 11 per 4 (Denominatore delli quarti) e ne verrà 2 di Quotiente; & auanzarà $\frac{3}{4}$. Finalmente partendo queſto Quotiente 2 per 3 (Denominatore de'terzi,) ne verrà 0 di Quotiente, e reſtaranno pur $\frac{2}{3}$. Adunque li rotti infilzati, che produſſero $\frac{457}{480}$, furono $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$ e $\frac{1}{8}$, come in fatti ſi vede nell'infilzadura de' medeſimi rotti poſto di ſopra.

S'vno diceſſe. Hò infilzato tanti mezi, tanti terzi, tanti quinti, e tanti ottaui, che l'vltimo Prodotto m'hà

dato $\frac{3}{4}$. Quanti furono li mezi, li terzi, li quinti, e gli ottaui infilzati?

Moltiplicando al solito li Denominatori 2, 3, 5, e 8, l'vno con l'altro, fanno 240. E perche questo 240 non si confà col 4 del proposto Prodotto, ne siegue, che il Prodotto sarà stato schisato, e cauatone li $\frac{3}{4}$. Per trouar mò il numero, per il quale hà schisato, basta a partire il 240. per 4, e ne verrà 60, per il quale fù schisato tutto il corpo dell' infilzadura. Moltiplicando adunque il 3. de' trè quarti per 60. fanno 180. e moltiplicando il 4 pure per 60. fanno 240. Et io dico, che $\frac{180}{240}$ fù tutto l'aggregato dell'infilzadura. Fanne la proua col partire il 180 per tutti li Denominatori de' rotti, e riusciranno $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{5}$, e $\frac{4}{8}$.

Quando poi la somma del Denominatore de' rotti moltiplicati, non incontra il Denominatore del proposto aggregato; è chiaro segno, ò che non propone sinceramente l'infilzadura, ò che hà fallato nell'infilzare.

S'addimanda; da che numero fù sottrato $\frac{1}{3}$, che ne restò $\frac{1}{4}$?

In questo, & in altre simili domande: basta a sommare insieme il $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$; Il che fatto; danno $\frac{7}{12}$. Adunque da $\frac{7}{12}$ fù sottrato $\frac{1}{3}$, e restò $\frac{1}{4}$. Fanne la proua, col sottrare $\frac{1}{3}$ da $\frac{7}{12}$, e vedrai, che in fatti ne resta $\frac{1}{4}$.

S'addimanda; che numero si può aggiongere a 2, e $\frac{2}{3}$, che faccia 8, e $\frac{3}{4}$?

Questa proposta è tutta al contrario della passata: è però sì in questa, come in altre simili, basta a sottrare li 2, e $\frac{2}{3}$ da 8, e $\frac{3}{4}$; il che fatto, ne resta 6, e $\frac{1}{12}$, e questo è il numero, al quale aggiongendo 2, e $\frac{2}{3}$ fanno appunto 8, e $\frac{3}{4}$. Se ne vuoi la proua, somma li 6. & $\frac{1}{12}$ con li 2, e $\frac{2}{3}$, e vedrai, che fanno 8, e $\frac{3}{4}$.

S'addimanda; qual è quel numero, che partito per 3. e $\frac{1}{3}$, me ne venghi 5, e $\frac{2}{3}$,

Que-

Questa, e simili proposte si sciolgono col moltiplicare. Moltiplica li $3\frac{1}{2}$, con li $5\frac{2}{3}$, e ne verrà $19\frac{5}{6}$ di Prodotto. E questo è il numero, che partito per $3\frac{1}{2}$, ne viene $5\frac{2}{3}$.

S'addimanda. Con qual numero si moltiplicaranno $2\frac{1}{3}$, che facciano $5\frac{3}{8}$?

Questa, e simili richieste si risoluono col partire Partiscansi li $5\frac{3}{8}$ per $2\frac{1}{3}$; e di Quotiente ne verrà $2\frac{17}{56}$, e questo sarà il numero, che moltiplicato per $2\frac{1}{3}$, faranno $5\frac{3}{8}$.

Modo di ridure varie specie di monete, ò pesi in parte del suo tutto.

S'Addimãda. Che parte d'vna Lira, siano soldi 12 Denari $7\frac{3}{4}$. Noi sapiamo, che 20. soldi fanno vna Lira Adũque quei soldi 12 sarãno $\frac{12}{20}$ d'vna Lira. E perche 12 Denari fãno vn soldo, quei Den. 7 sarãno $\frac{7}{12}$ d'vn soldo, e li trè quarti saranno $\frac{3}{4}$ d'vn Denaro, e staranno in questa forma $\frac{1}{20}, \frac{7}{12}$, e $\frac{3}{4}$. Questa adunque, e simili proposte si risoluono per la Regola dell'Infilzare. Infilzati li $\frac{3}{4}$ con li $\frac{7}{12}$, fanno $\frac{31}{48}$, e questi sono minutie d'vn Soldo. Infilzando poi $\frac{31}{48}$ con li $\frac{12}{20}$, faranno $\frac{607}{960}$, e sono parti d'vna Lira, il qual numero, non potendosi schisare, si lascia così.

Addimando. Lir 2. Sol. 16. Din. $5\frac{3}{8}$, che parte d'vn Scudo sono?

E perche 4 Lire fanno vn Scudo; così s'ordina questa propositione $\frac{2}{4}, \frac{16}{20}, \frac{7}{12}, \frac{3}{8}$, e poi s'infilza al solito.

Addimando Libre 20, oncie 10, e $\frac{6}{7}$ di Lino, che parte siano d'vn Peso?

Bisogna sapere, che 25 Libre fanno vn Peso, & 12 Oncie vna Libra. Il che saputo, s'ordina così il quesito $\frac{20}{25}, \frac{10}{12}, \frac{6}{7}$, e poi s'infilza al solito. E così con questo giudicio si risolue qualsiuoglia altro simile quesito. Questo solo bisogna auuertire, che per Denominatore di qualsiuoglia minutia, si serue del tutto, ò intiero d'esse minutie; come s'è fatto ne soprapposti quesiti; ne' quali per Denominator de' Soldi, s'è pigliata la Lira intiera. Per Denomi-

nator de' Denari, s'è pigliato il Soldo intiero. Per le Libre di Lino si pigliò il Peso, e per l'Oncie la Libra intiera.

Finalmente, se fosse addimandato, Denari 9, che parte sono d'vna Lira? In questo, e simili quesiti, perche li Denari non prouengono immediatamente dalla Lira, ma da Soldi; bisogna prima vedere, che parte d'vn Soldo siano li 9 Denari; il che facendo, si troua, che sono $\frac{3}{4}$. Hora questi $\frac{3}{4}$ si moltiplicano per il tutto di che son parte; cioè cõ $\frac{1}{20}$, e il Prodotto sarà il numero cercato. Vn Soldo si dice vn vintesimo. Moltiplica adũque $\frac{1}{20}$, cõ $\frac{3}{4}$, e ne verrà $\frac{3}{80}$, e tante parti appunto d'vna Lira sono li 9. Denari.

Chi volesse mò sapere, che parte d'vn Scudo sian quei 9. Denari; basta a moltiplicar quei $\frac{3}{80}$ per $\frac{1}{4}$. Dico per $\frac{1}{4}$, perche diuidendosi il Scudo in 4 Lire; il Denominatore d'esso Scudo diuiso è 4; Moltiplicãdo adunque $\frac{3}{80}$ per $\frac{1}{4}$, ne verrà $\frac{3}{320}$, siche 9 Denari sono $\frac{3}{320}$ d'vn Scudo. Fanne la preua così. Cõuerti il Scudo in Denari, che sono 960. diuidali per 9, e ne verranno Denari $106\frac{2}{3}$ Schisa mò quel rotto di Scudo $\frac{3}{320}$, e di garbo ne vengono Denari $106\frac{2}{3}$, e tanto basti per conclusione di questo Capitolo.

DELLA REGOLA DEL TRE'.

CAP. V.

QVesta regola del Trè è chiamata Regola delle Proportioni, e per eccellenza Aurea. Si perche nõ falla mai, sì anco perche mirabilmente serue non solo a Matematici nelle loro operationi, mà facilita, e s'intromette ancora ne' negotij, e traffichi Mercanteschi. Questa Regola cõsiste in questo: che dati, ò proposti tre numeri, si troua il quarto numero proportionato incognito; qual sempre riesce della natura del secondo, e quella proportione, che si troua frà il primo, ed il secondo numero, ò termine della propositione, quella medesima hauerà il ter-

terzo col quarto. Nè altro ci vuole, per hauer l'intento; che moltiplicare il secondo col terzo termine; e il Prodotto partirlo per il primo; perche il Quotiente sarà la quarta cosa, o numero cercato, e della natura (come hò detto) del secondo.

Per non errare, bisogna sapere, che il primo numero deue essere della spetie, e di simil parti del terzo, & il secondo, (finita l'operatione) sarà della spetie, e di simil parte col quarto, che si cerca. Laonde bisogna auuertir bene la propositione, e se non fosse ordinata di proposito, ordinarla bene, e porla in forma.

Mà per maggior chiarezza bisogna esser auuertito, che in qual si voglia quesito sempre si fà vn suppoſto, ed vna dimanda. Il suppoſto occupa sempre li due primi termini d'ogni quesito, perche sono compagni, e la domanda è sempre sola, e discompagnata, qual si mette nel terzo luogo del quesito. Per esempio.

Se quattro Mine di Formento costano Lir. 40. quanto costaranno Mine 85.

Volendo adunque saper quanto costino le Mine 85. Io faccio vn mio suppoſto, e metto per fondamento, che le quattro Mine costino Lir 40, perche tanto vale, ò si stimano le 4 Mine, quanto le Lir. 40. E però notisi bene, che nel primo, e secondo luogo sempre si mettono le due cose compagne, ancorche nel proporre li quesiti con parole si pronunciasse prima la domanda, che il suppoſto. Come chi dicesse.

Quanto costano Mine 85. à ragion di Lir 40. per ogni quattro Mine?

In tal caso bisogna ordinare li termini, &c.

Done sia fondata questa Regola d'oro, l'hauerai nel trattato delle Proportioni. Mà per esser Regola tanto

necessaria, & vtile, qui metterò, e breuemente toccarò molti casi pratici, e che possono bastare, per ammaestramento. Veniamo alla pratica.

Quesito Primo.

Con 12 Soldi si comprano 3 Libre di Carne: con 100 Soldi quante Libre se ne compraranno?

Questo quesito è bene ordinato. Moltiplicansi li 100 Soldi con le 3 Lib. di carne; e il Prodotto diuidasi per 12 Soldi, ed il Quotiente sarà il quarto numero cercato.

Lib.		100
Sol.		3
12	1	300
	Lib.	25

Con 100 Soldi si compratiano 25 Libre di carne.

Quesito Secondo.

Con 100 Soldi si comprano 25 Libre di carne: con vn Scudo quante Libre se ne compratiano?

Questo quesito non è bene ordinato: perche il terzo numero non è di spetie, e di simil parte del primo, poiche il primo è di Soldi, ed il terzo è di Scudo. Conuertisi il Scudo in 80 Soldi, e poi s'operi, come sopra. Con vn Scudo se ne compratiano 20 Libre.

		80
		25
100	20	00

Quesito Terzo.

Vn Moggio di Grano costa Scudi 20. Quanto costaranno Moggie 256?

Mà perche qualsiuoglia numero partito per l'vnità non si diminuisce, però si in questo, come in qualsiuoglia altro quesito, ch'habbia l'vnità nel primo luogo, basterà moltiplicare il secondo col terzo termine, perche il Prodotto sarà la quantità cercata, e la valuta del terzo termine.

Mog.

Moggia 256

Scudi 20

Le Moggia 256 costariano Scudi 5120

Quesito Quarto.

Se Moggia 256 di Formento costano Scudi 5120; vn Moggio quanto vale?

Per prima operatione di questo quesito bisognaua moltiplicare vn Mogg o con li 5120 Scudi; mà perche l'vnità non accresce il numero moltiplicato per essa; però si in questa, come in qualsiuoglia proposta, ch'habbia l'vnità del terzo luogo non occorre far moltiplicazione del secondo col terzo termine: ma basta partire il secondo per il primo numero. Il che facendo nel nostro caso, vn Moggio di Formento costaria pur 20. Scudi.

256 — 5120 — 20

512.

20.

Quesito Quinto.

Con 50 Lire hò comprato 94 Brazza di tella. Quanto vale, ò costa vn Brazzo?

Questo quesito nõ è bene ordinato. Metti le 94 Brazza nel primo luogo, e le 50 Lire nel secondo, dicendo. Se brazza 94 costano L. 50. bra. 94. de. 12000 quot. de. 127. $\frac{62}{94}$.

Lir.	50	
	20	
Soldi	1000	
	12	
	94	Sol. 10. 7 $\frac{62}{94}$.
	260	
	188	
	720	
	658	
	62	

Quanto valerà vn Brazzo? Operando: vedrai, che vn Brazzo costa Soldi 10, Denari 7, & $\frac{62}{94}$ d'vn Denaro. Vero è, che per esser maggiore il Partire, che non è il numero da diuiderſi, bisogna conuertire le 50. Lire in Soldi: moltiplicandole per 20, e li Soldi conuertirli in Denari, moltiplicandoli per 12. Il quotiente poi si parte per 12. per ridurre li Denari in Soldi. E così con simili quesiti.

Quesito Sesto. (10 il Cento?

Quãto si cauaria d'Voua 2750, a ragion di Lir 2. Sol

Ordina così la propositione.

Se 100 costano Lir 2. 10. Quanto costaranno 2750?

Prima d'ogni cosa si cõuertono in Sol. di Lire 2, à quali Sol. 50 s'aggiongono gl'altri 10. Soldi.

	20	50
Sol.	1371	100
Lir.	68	15

Ciò fatto. Si moltiplicano l'Voua 2750 per li Soldi 50, e di Prodotto ne veranno Soldi 137500. Ma per-

perche bisognaria partirli per 100, basta a tagliare al so. lito due figure, e per il Quotiente restaranno Sol 1375. Per ridurre mò questi Soldi 1375. in Lire si taglia vn altra figura, ed il resto 137 diuiso per metà, ne vengono Lir 68. Sol. 15. E tanto costariano l'Voua 2750.

Questa sia Regola vniuersale, che quando nel secondo termine del quesito vi siano diuerse spetie di prezo, ò di mercantia, come di Lir, Soldi, e Denari; Ouero di Brazzo, e d'Oncie, &c. in tal caso sempre si conuerte ogni cosa nella quantità minore; cioè in Denari, In Oncie, &c. E poi si moltiplicano questi Denari, ouero Oncie con la terza cosa, e il Prodotto si parte per la prima. Fatta la diuisione; Se il Quotiente sarà di Denari, per ridurlo in Lira si parte prima per 12, e poi per 20. Se sarà di Soldi si parte solamente per 20. &c.

Quesito Settimo.

Quanto spenderia Vno in Brazza 12 di panno, e 6. Oncie: à ragione di Lir 645 — 15 per ogni 100. Brazza? Ordina cosi il ques. Se Bra. 100. Li 645-15 che bra. 12-6?

Quanto al secõdo numero, à bastanza s'è parlato delle minutie nel passato quesito; e del modo, che si deue tenere; Adesso mò bisogna sapere: che quãdo nel primo, ò nel terzo numero della proposta; (già ordinata) saranno minutie: ouero nell'vno, e nell'altro: all'hora si cõuertano tutti gli

12	20	12
On. 1200.	12900. Sol.	Onc. 150
	15. Sol.	
	12915. Sol.	
	150. Onc.	
	645750	
	12915	
12 1001	193721 5 9 Sol.	
Sol del Quot.	161 1 4-450. Sol da	
Lir. 80.- 14	(farsi in Lir.	

sani dell'vno, e dell'altro numero,

nel-

nella ſpetie delle loro minutie, e queſto non per altro; ſe non accioche il primo, e il terzo numero ſiano di ſpetie, e di parti ſimili, come da principio s'è detto. Il che facendo, nel propoſto queſito; le brazza 12. onc. 6. coſtaranno Lir 80. Sol. 14. E perche auanzano 450 Soldi, da partirſi in 1200 parti: (il che non ſi può fare,) biſogna conuertirli in Denari, e poi partirli per il 1200: il che facendo, ne vengono 4. Denari. e $\frac{600}{1200}$. Si che in tutto, e per tutto le 12 Brazzi, e 6 oncie coſtariano Lir. 80. Sol. 14. Den. 4. e $\frac{600}{1200}$, cioè $\frac{1}{2}$. E queſto ſerui d'auuiſo per altri caſi ſimili.

REGOLA DEL TRE'. Con Rotti in qualſiſia termine.

CAP. VI.

SIn qui hò propoſto quei queſiti, che poſſono ſeruire d'eſemplare; volendo operare alla ſemplice ſecondo il coſtume Mercanteſco: parlando à Scudi, Lire, Soldi, e Denari, che ſono certi tutti, ouero intieri di diuerſe ſpetie. (Benche habbino relatione l'vno all'altro.) Le Lire ſono parti d'vno Scudo. Li Soldi ſono parti d'vna Lira. E li Denari ſono parti d'vn Soldo. Ma chi voleſſe operare più maeſtralmente per via di rotti. (Il che rieſce di manco fatica, e con meno figure ſi riſoluono li queſiti) qui inſegno vna Regola generale, e tanto facile, quanto deſiderar ſi poſſi. Alcuni Scrittori hanno voluto inſegnare Regole particolari, quando foſſero rotti nel primo termine ſolamente. Quando ne foſſero nel ſecondo, ò nel terzo ſolamente. Quando ne foſſero in due, quali ſi ſiano, &c. Le quali Regole ſono tutte ſuperflue; nè ſeruono ad altro, che a confondere la mente de' principianti, e farli andar via la voglia di ſtudiare: poiche con la Regola, che quì s'inſegna, ſi riſolue ogni propoſto

posto quesito: habbia mò rotti in tutti ; ò in qual si voglia termine della propositione. E poi, chi hà imparato bene il moltiplicare, & il partire de' rotti, non hà bisogno d'altro ammaestramento: poiche l'operatione del secondo termine col terzo si fà col moltiplicar de' rotti: e l'operatione del primo termine, col Prodotto del secondo nel terzo, si tà col partire de' rotti. Ma lasciamo le parole, e veniamo alli fatti: perche più giouà vn oncia di buona pratica, che vn Peso di Teorica.

Questa è la Regola. Prima d'ogni cosa si riducono tutti gl' intieri alla natura del suo rotto: e se vno, ò due termini della propositione, non haueslero rotto; quei sani si mettono in forma di rotto: cioè, li sani sopra la virgola con l'vnità sotto di essa.

Secondariamente. Per hauere il general Diuisore dell' operatione, si moltiplicano insieme li Denominatori del secondo, e terzo termine: & il Prodotto si moltiplica subito col Numeratore del primo termine: e così il Prodotto di questa seconda moltiplicatione, sarà il ricercato general Diuisore.

Terzo. Per hauere il numero vniuersale da diuidersi, si fà così. Si moltiplicano insieme li Numeratori del secondo, e terzo termine; & il Prodotto si moltiplica subito col Denominatore del primo termine. Il che fatto il Prodotto di questa seconda moltiplicatione sarà il ricercato numero, da diuidersi per il gia ritrouato Diuisore. Fatta poi la diuisione: il Quotiente di tal partitione, sarà la conclusione del quesito; e della natura del secondo termine.

Bisogna auuertire, che il Prodotto del secondo nel terzo termine da diuidersi è sempre della natura del secondo termine: che se non fosse; nè anco tale saria il Quotiente. Si che, se il secondo termine sarà prezo; prezo sarà parimente tal Prodotto: e se sarà mercantia;

tia; mercantia parimente sarà il Prodotto. Veramente non si può desiderare d'auantaggio; & in pratica non si deue partire da questo modo d'operare. O veniamo all'vso pratico.

Quesito Primo.

Brazza 5, e $\frac{2}{3}$ di Veludo costano Scudi $7\frac{3}{4}$, Quanto costaranno Brazza 12. e $\frac{7}{8}$.

Ordina così la propositione. Brazza $\frac{17}{3}$ ⋈ Scud. $\frac{31}{4}$ — Braz. $\frac{103}{8}$

Terzo Denominatore. 8 — Terzo Numeratore. 103

Secondo Denominatore. 4 — Secondo Numeratore. 31

Primo Prodotto. 32 — Primo Prodotto. 3193

Primo Numeratore 17 — Primo Denominatore 3

Second. Prod.e Diu. 544 — Num. da partirsi. 9579

Diuisore 544 — 9579 — Quot. Scu. 17.
544.

4139

3808

331. Scu. da farsi in Lir.
4

Diuisore 544 — 1324 — Quot. Lir. 2.
1088

236. Lir. da farsi in Sol.
20

Di-

Diuisore 544 — 4720 — Quot. Sol. 8.
4352

368 Sol. da farsi in Den.
12

Diuisore 544 — 4416 — Quot. Den. 8, e $\frac{64}{544}$, cioè $\frac{2}{17}$.
4352
64

Le Brazza 12, e $\frac{7}{8}$ costariano Scud. 17. Lir. 2. Sol. 8. Din. 8, e $\frac{2}{17}$.

Questa prima operatione l'hò fatta con quella chiarezza, che si vede, acciò s'impari bene il modo d'operare. Ma perche l'intelletto humano non resta mai sodisfatto; nè s'acquista facilità nell'operare; finche non arriui a conoscere il *propter quid* delle cose: quì voglio sotto breuità far capire la forza di questa operatione, tanto facile, & vniuersale. O' stiamo nel precedente quesito.

Noi habbiamo questi trè rotti $\frac{17}{3}$, $\frac{31}{4}$, e $\frac{103}{8}$; Moltiplicando il secondo, col terzo, mi viene questo rotto $\frac{3193}{32}$; e perche deuo partire questo $\frac{3193}{32}$, per il primo rotto, cioè $\frac{17}{3}$, di necessità bisogna moltiplicarli in croce, per ridurli ad vna medema denominatione, & il Prodotto metterlo sotto il Numeratore: Hora mò; moltiplicando il Denominatore 32 col Numeratore 17, ne viene 544, che serue per l'vniuersal Diuisore. Moltiplicando poi il Denominatore del primo rotto col Numeratore 3193 di Prodotto ne verrà 9579, per il numero da partirsi; che appunto è la medema operatione, fatta nella risolutione del quesito. Chi la capisce buon prò li faccia.

Que-

Quesito Secondo.

Brazza 2, e $\frac{1}{4}$ di Damalco costano Lir. 9, e $\frac{4}{5}$; Che valeranno Brazza 8?

Brazza $\frac{9}{4}$ Lir. $9\frac{4}{5}$ Brazza $\frac{8}{1}$

1 — 5 — 9 — Partitore 45

49 — 8 — 392 — 4 — Num. da part. 1568 Quot. Lir. 34.

135 — 218 — 180 — 38 Lir. da farsi in Sol. — 20 — Partitore 45-760-Quot. Sol. 16. — 45. — 310 — 270 — 40 Sol. da farsi in Den. — 12 — Partitore 45-480-Quot. D. 10. $\frac{10}{45}$, cioè $\frac{2}{9}$. — 45. — 30

Le Brazza 8 costariano Lir. 34-16-10-e $\frac{2}{9}$ (già schif. il rotto) In questo Quesito vi sono rotti solamente in due termini, 1, e 2.

Quesito Terzo.

Quanto costariano Lib. 75. di Cera bianca à Sc. 12, e $\frac{4}{5}$ il Cento. Ordina così il quesito. Se Lib. $\frac{100}{1}$. Scud. $\frac{64}{5}$, che $\frac{75}{1}$.

1 — 5 — 100

Diuisore 500 75
64
300
450
Diuisor. 500 — 4800 Quot. Scu. 9.
4500
300 Sc. da farsi in Lir.
4
Diuisor. 500 -- 1200 Quot. Lir. 2.
1000
200 Li. da farsi in Sol.
20
Diuisor. 500. — 4000 Quot. Sol. 8.
4000
....

Questa propositione hà rotti solamente nel secondo termine, e cosi le 75. Libre di Cera costariano Scudi 9. Lir. 2. e Sol. 8. in punto. E tanto basti in questa materia della Regola del trè ordinaria, e piana.

QVESITI STRAORDINARII.

CAP. VII.

HAuendo nel Capitolo precedente insegnato il modo di risoluere per la Regola Aurea, li quesiti ordinarij, e piani: in questo Capitolo giudico bene il proporre alcuni altri quesiti straordinarij; quali souente sogliono occorrere nel mercantare: e se bene si risoluono pur essi ancora per la Regola del Trè: nondimeno ricercano qualche discorso d'intelletto; per aggiustare la propositione in modo, che la Regola v'habbia luogo, e si possi maneggiare. Alla pratica.

Quesito Primo.

VNo compra del Melle a ragion di Scudi 5. il Cento

(cioè per ogni 100. Libre) e lo riuende poi a ragion di Scudi 6, e $\frac{1}{4}$ pur il Cento. Addimando. Quanto guadagna questo tale per ogni 100. Scudi, che impieghi in questa mercantia?

Questo è chiaro; che per ogni 5. Scudi, che spende, ne guadagna vno, & $\frac{1}{4}$. Ordina adunque così la propositione. Se Scudi 5. guadagnano Scudi 1, e $\frac{1}{4}$, che guadagnaranno Scudi 100? Operando secondo la Regola: vedrai, che guadagna Scudi 25. E così con casi simili.

Quesito Secondo.

Vno compra all'ingrosso vn Sacco di Castagne, quali paga a ragione di Lire 15. il Cento; e pesa lib. 674. Questo amico vendendole alla minuta 20. Quattrini; cioè Soldi 3, e Denari 4 la Libra: addimanda se guadagna, ò perde, e quanto per Cento.

In questa, e simili proposte bisogna vedere quanto vende, ò caui d'vn Centenaro, venduto alla minuta; così. Se Lib. 1. vale Sol. 3. Din. 4 che valeranno Lib. 100? Il che fatto, si vede chiaro, che vi guadagna Lir. 1. Sol. 13. Din. 4. per Cento. Per sàper mò quanto guadagni in tutto il Sacco: si dice così. Le Lib. 100. guadagnano Lir. 1. Sol. 13. Din. 4. che guadagnaranno Lib. 674? Operando in tutto il Sacco guadagna Lir. 11. Sol. 4. Din. 8. Ma se per nome di Cento s'intendesse, quanto guadagni per ogni cento Lire di prezo, s'operaria come nella passata propositione: cioè. Se Lir. 15. impiegate in tante Castagne guadagnaranno Lir. 1. Sol. 13. Din. 4 che guadagnaranno Lir. 100.

Quesito Terzo.

Vn Droghiero compra vna quantità d'Oglio grande, e per ogni cento Scudi, che spendi, ne vorria guadagnare 10. vendendo però detto Oglio Soldi 6. la Libra. Hora mò questo Droghiero desidera sapere, quanto può pagare l'Oglio il Cento; acciò vendendolo

(co-

(come sopra) guadagni li pretesi 10. Scudi.

In questa, e simili ragioni bisogna sapere, che chi vuole guadagnare 10, per Cento; vuole di 100. far 110, ma fondato però sopra quel vendere l'Oglio vn tanto determinato per Libra: Per prima operatione adunque bisogna far conto, quanto si cani del Cento a ragion del prezo tassato per Libra. E perche vuol vender l'Oglio Soldi 6 la Libra; chiara cosa è, che l'Oglio gli verrà venduto Lir. 30 il Cento.

Fatto questo, si dice così? Se 110 vengono da 100. Lir. 30. da quante verranno? Operando al solito; verranno da Lir. 27 -- 5 -- 5 $\frac{5}{11}$. E questo è il prezzo, che per Cento s'hà da comprar l'Oglio. Adunque, se il Droghiero vuol vendere l'Oglio Soldi 6. la Libra; e guadagnarui 10. Scudi per cento Scudi, che spendi; deue egli comprar l'Oglio a ragione di Lir. 27. Sol. 5. Din. 5. e $\frac{5}{11}$ il Cento: cioè per ogni quattro Pesi.

E che sia il vero; facciasi la proua in questa maniera. Sottraganssi le Lir. 27. Sol. 5. Din. 5. e $\frac{5}{11}$; dalle Lir. 30. e ne restaranno Lir. 2. Sol. 14. Din. 6. e $\frac{6}{11}$ (che viene ad essere il guadagno, che per ogni 100. Libre d' Oglio fà il Droghiero) Fatto questo si dice così. Se Lir. 27. Sol. 5. Din. 5. e $\frac{5}{11}$ spesi in tanto Oglio, mi guadagnano Lir. 2. Sol. 14. Din. 6, e $\frac{6}{11}$, che mi guadagnaranno Lir. 400. che sono li 100. Scudi? Opera al solito, e vedrai appunto, che per li 100. Scudi il Droghiero guadagna li pretesi 10. Scudi.

Quesito Quarto.

Vn Mercante compra delle Gallette, con intentione di riuenderle poi a ragion di Scudi 24. il Cento; e di guadagnarui 12. per Cento di quanto spenderà in comprar Gallette. S'addimanda. Quanto deue pagarle, per hauer l'intento?

Questa propositione è poco dissimile dalla passata. Si

dice adunque così. Se 112 trà guadagno, e capitale mi dà 100. di puro capitale; che mi darà Scu 24 pur di guadagno, e capitale? Operando al solito, ne vengono Scudi 21, e $\frac{3}{4}$. Adunque se il Mercante vuol vendere le Gallette 24. Scudi il 100. e guadagnarui 12. per Cento: bisogna, che lui le comprà per Scu. 21, e $\frac{3}{4}$ il Cento.

Quesito Quinto.

Io vendo l'Vua schiaua Sol. 4. la Libra, e mi trouo guadagnarui 5. per Cento. Addimando, quanto costa a me di prima compra?

Questa, e simili ragioni si fanno come le passate così. Se 105 mi dà 100, che mi daranno Soldi 4? Operando al solito, haurai Sol. 3, e $\frac{17}{21}$, che fatti in Din. fariano Din. 9, e $\frac{5}{7}$ di Denaro. Adunque hò comprato l'Vua schiaua a ragione di Soldi 3 Din. 9, e $\frac{5}{7}$ la Libra.

Quesito Sesto.

Pietro vende vna quantità di Cera a ragione di Scudi 8. il Cento: e facendo bene il conto; troua d'hauerui perso 10. per 100. Hora s'addimanda quanto costasse a Pietro la Cera il 100.

Queste simili ragioni si fanno, come le passate: non v'è altro da osseruare; se non che bisogna semare, ò calare la perdita del capitale; si come per contrario al capitale parimente s'aggionge il guadagno preteso, ò fatto a ragion di Cento; di Milliaro, ò di Libra. Dirassi adunque così. Se 90 auanti la perdita erano 100, che erano Scudi 8. Opera al solito, e vedrai riuscirne Scudi 8, e $\frac{8}{9}$; e tanto appunto costò le Cera a Pietro il 100. Se ne vuoi la proua, dirai così. Se in Scudi 8, e $\frac{8}{9}$, perdo $\frac{8}{9}$, che perderò in 100. Scudi? Operando al solito; si troua perdersi appunto 10. per 100.

Quesito Settimo.

Intendo, che mio Padre cõprò vna Possessione: nè sò per quãto; trouo bẽ sì, ch'auendola venduta Scudi 3900.

vi perse 16. per 100. Sarei mò curioso di sapere quanto costasse a mio Padre la Possessione.

Questo quesito è come il passato. Leuansi Scudi 16 da Scudi 100, e ne restaranno solamente 84; e poi dicasi. Se 84 prima della perdita erano 100. Quanti furono 3000? Operando per la Regola, ne vengono Scudi 3571. $\frac{3}{7}$. E per tanto appunto mio Padre comprò la Possessione.

Due cose bisogna osseruare in queste ragioni. La prima è che nel primo luogo si mette sempre quella cosa, che contiene il capitale, con la perdita, ò guadagno; e nel secondo luogo si coloca il capitale puro, e così l'aumentimento sarà della spetie, ò natura, non della seconda cosa, (come doueria) mà sarà simile alla terza cosa. L'altra osseruatione è questa, che la prima, e seconda cosa si notano senza alcun nome, perche sono generali, talmente che possono seruire à qualsiuoglia spetie di Moneta, ò di Peso: sia mò a ragione di Libra, di Cento, ò di Miaro: di Scudo, di Lire, di Soldi, &c. perche in tutte loro ritiene la douuta proportione.

Quesito Ottano.

Vna Botte hà trè Spine, ò Canelle diuerse; Chi apre la piccola, si vuota la Botte in trè giorni; Se la seconda, in due giorni; e se s'apre la maggiore, si vuota la Botte in vn sol giorno. S'addimanda. Chi le apriste tutte trè d'accordo, in quanto tempo si vuotaria?

Per ordinare questa, e simili propositioni, si dice così. Se la Spina piccola in 72 hore vuota vna Botte, la seconda, ò mezzana ne vuotaria vna, e meza, e la maggiore ne vuotaria trè: mà per rispetto di quella meza, bisogna ridurle tutte in meze. Dicasi adunque così.

Se 12 meze Botte si vuotano in 72 hore; due meze, (che sono la proposta Botte) in quanto tempo si vuotaranno?

2

Diuis. 11 — 144. hor.

La Botte si vuotaria in hore 13. $\frac{1}{11}$.

Quesito Nono.

Vn Sarto promette, e li basta l'animo di far vn vestimento in 4. giorni. Vn altro lo faria in 3. Vn altro in 2. E vn altro lo faria in vn sol giorno. Se tutti quattro lauorassero vnitamēte insieme, in quanto tempo lo fariano?

Per fuggir rotti in questa, e simili domande per la Regola dell'Accattare si troua vn numero, che sia diuisibile per 1. 2. 3. e 4. E per il minimo sarà 12. il quale rappresenta 12. giorni ne' quali il primo Sarto faria 3. vestimenti. Il secondo 4 Il terzo 6. E il quarto ne faria 12. che in tutti fariano 25. vestimenti: ciò fatto per la Regola si dice. Se 25. vestimenti si fariano in 12. giorni, vna sol veste in quanto tempo si farà? Si farà in $\frac{12}{25}$ di giorno; cioè in hore 11, minuti 39. $\frac{1}{5}$. Bisogna sapere, che 60. minuti fanno vn hora, 60. secondi fanno vn minuto, 60. terzi fanno vn secondo &c.

Quesito Decimo.

Vn altro hà trè Operarij di varij talenti. Ad vno dà Soldi 15. il giorno Al secondo ne dà 11. & al terzo ne dà solamente 8. Mà acciò vno non habbia da inuidiare l'altro, fà lauorare tanto ciascun di loro, che tutti riceuino eguale quantità de' Denari. S'addimanda. Quante giornate hauerà da lauorare ciascun di loro?

Per la Regola dell'Accattare, si troua vn numero diuisibile per 15. per 11. e per 8. e questo sarà 1320 Dipoi si parte questo numero per il prezo, ch' ognuno hà il giorno, cioè per 15. per 11. e per 8. E così il Quotiente sarà la quantità de' giorni, che ciascuno deue lauora-

re.

re. Il primo haverà da lavorare 83 giorni. Il secondo 120. E il terzo 165. Così con simili quesiti.

Quesito Vndecimo.

Vorrei macinare 15. Corbe di Formento, e perche hò fretta, vado in luogo doue sono 3. Molini, vno de' quali le macinaria in 8. giorni, l'altro in 6. giorni, e il terzo se ne sbrigaria in 3. giorni. S'addimanda à farli lavorar tutti trè insieme, in quanto tempo le macinaranno.

In altri modi si potria sciogliere il quesito, ma breuissimamente faccio così. Per la Regola dell'Accattare trouo vn numero ch'habbia le parti d'8. di 6. e di 3. Il quale è 144. e questo partendolo per 8 per 6. e per 3. ne vengono 18. 24. e 48. quali sommati insieme fanno 90. Finalmente diuilo il 144. per questo 90. di Quotiente ne viene 1 $\frac{3}{5}$. Adunque tutti 3. li Molini insieme macinariano le 15. Corbe di Formento in giorni 1 $\frac{3}{5}$. Questo è modo breuissimo, ma la causa dell'operatione è occulta.

Chi volesse risoluerlo per altro modo, come s'è fatto con la Botte, bisognaria vedere quante Corbe ne macinaria la 3. Macina in 8. giorni, e quante la 2. La terza per la Regola del trè ne macinaria Corbe 4. e la seconda Corbe 20. le quali vnite con le Corbe 15. che in 8. giorni macina la prima, fanno Corbe 75 Si dice poi per la Regola. Se Corbe 75. sono macinate in 8. giorni, Corbe 15. in quanti saranno macinate. Operando al solito saranno macinate pure in giorni 1. $\frac{3}{5}$. Etanto basti per far strada all'ingegnoso studente.

BELLISSIMA OSSERVATIONE NELLA REGOLA DEL TRE.

NEl principio di questo Capitolo, hò detto frà l'altre cose, che la Reg. del Trè deue hauere questa cõditione, che la prima cosa sia della spetie, e di simili parti della terza, e la seconda similmen e sia dell'istessa natu-

ra della quarta, che si cerca. Ma perche sono più li casi occorrenti, che le leggi, ò precetti; adesso io dico, che ogni volta, che la prima, e seconda cosa, ò termine della Regola del Trè, saranno simili di nome, & il terzo dissimile: in tal caso senza accordare la terza con la prima, (ed è contra) s'opera al solito, e l'auuenimento sarà la cosa, che si ricerca, non simile al secondo termine della Regola, ma sarà della natura del terzo termine. E per meglio esser inteso, propongo due quesiti.

Quesito Primo.

Vno comprò Sol. li 18. di Canella per riuenderla; nel che vi guadagnò Soldi 2. Se'l Mercante compraſſe 30. Scudi di Canella, quanto vi guadagnaria?

Senza muouere cosa alcuna; moltiplicando al solito il 30. per 2. sarà 60. e partēdo questo 60. per il 18 ne verrà di Quotiente $3\frac{1}{3}$, che sono pur Scudi; per esser Scudi il terzo termine della propositione. Con trenta Scudi adūque spesi in Canella, guadagnaria Scudi 3. Lir. 1. Sol. 6. Din. 8. a guadagnarui Soldi 2 per ogni Soldi 18. spesi.

Quesito secondo.

Se Lir. 2. 7. 9. spesi in Ouadelle, per hauerne Seta, mi guadagna no Sol. 15. Che mi guadagnaranno Paoli 90. spesi pur in Ouadelle?

In questo quesito la prima, e seconda cosa non sono totalmente simili; però per far che siano, si riducono le Lir. 2. Sol. 7. e Din. 9. tutti in Denari. Parimente in Denari si conuertono li Sol. 15. della seconda cosa, e poi s'opera, come sopra, e come quì di sotto vedi notato. E tanto basti à chi hà discorso.

Se Lir 2 Sol. 7. Din. 9. guadagnano Sol. 15 che guadagnaranno Paoli 90?

20 12

Sol. 47 Din. 180
12 90

Diu. 573 Diuis. 573 16200. Quot. Pao. li 28 $\frac{156}{573}$
1146. cioè $\frac{52}{191}$
4740
4584
156

Guadagnaranno Paoli 28. e $\frac{156}{573}$, cioè $\frac{52}{191}$ di Paoli.

PROVA DELLA REGOLA DEL TRE'.

CAP. VIII.

IN varij modi si possono prouare le ragioni fatte per la Regola del Trè. Alcuni, finita l'operatione, sogliono tornare indietro moltiplicando per quello, ch'hanno partito, e partendo per quello ch'hanno moltiplicato, aggiongendo a proprij luoghi le minutie, e residui: Il che fatto, se l'operatione sarà fatta bene, ne tornaranno a puntino li termini della propositione.

Altri la rouersiano, facendo prima cosa la terza, e facendo terza cosa la prima; per esempio: quanto costariano 8. Brazza di tela, a ragion di Soldi 10, il Brazzo? Questa ragione và ordinata cosi.

Se 1. Brazzo val Sol. 10. che valeranno Brazza 8? Il che fatto si vede, che le 8. Brazza di tela costano 80. Sol. Volendone mò far la proua, si volta la ragion cosi: Se Brazza 8. costano soldi 80 che valerà 1. Brazzo? Operando, ne tornano Soldi 10. Adunque la ragion è ben fatta, e se nō tornasse saria errata,

Al-

Altri vſano queſt'altro modo di prouare le dette ragioni, & è breuiſſimo. Moltiplicano il primo termine della propoſitione con il quarto, & il ſecondo termine lo moltiplicano con il terzo: il che fatto, ſe l'operatione ſarà fatta bene, il Prodotto di queſte due moltiplicationi riuſcirà ſimile vno all'altro, e ſe nò, è ſegno, che la ragione contiene errore. Facciamone la proua nel ſoprapoſto eſempio. Multiplicando l'1. della prima coſa, ò termine con 80. della quarta, reſta pure l'iſteſſo 80. Moltiplicandoſi poi li Soldi 10. della ſeconda coſa, ò termine con le Brazza 8. (terzo termine) ne riſultano pure 80. adunque la ragione ſtà bene.

Finalmente ſi prouano ancora queſte ragioni per la Regola del 7. ouero del 9. (Io però m'appiglio ſempre à quella del 9.) la quale ſi fà coſi. Primo, ſi cauano li 9. dalla prima coſa, & il reſiduo ſi coloca ſopra la Croce. Doppo ſi cauano li 9. dalla quarta coſa, ed il reſiduo ſi mette ſotto la Croce. Cauando poi li 9. dalla moltiplicatione di queſti due reſidui, l'auanzo di queſti ſi mette à man deſtra, ouero a man ſiniſtra della Croce. Fatto queſto, con l'iſteſſo ordine ſi cauano li 9. dalla ſeconda, e terza coſa, e ſe l'operatione ſarà fatta bene, il terzo auanzo dell'vna, e l'altra operazione ſarà ſimile.

Facciamone proua nel propoſto eſempio. La proua del primo termine è 1. e quella del quarto è 8. La proua del prodotto di queſte due proue è pur 8. E perche tale è anco la proua de gl'altri due termini, però ſtà bene, come qui ſi vede in figura.

1 8 1 2 10 8 1 8

Prima coſa. 8 Quarta coſa. Secõda coſa. 8 Terza coſa.

Il paſſato eſempio è facile, per non eſſerui minutie, ò rot-

rotti. Propongo perciò quest'altro esempio con minutie, e lasciando da parte li due primi modi insegnati, lo praticaremo per gli altri due modi, assai più laudabili. Se Lib.16 onc.8.costano Lir 2.Sol.5.Din.10.che valerà Lib.1?Vale Sol.2.d.9.

12		20	12	12
Oncie 200	Prima cosa.	45	onc.12	Den.33.
33	Quarta cosa.	12		
600	Den.	550.	Seconda cosa.	
600		12.	Terza cosa.	
6600		6600.	Adũque stà bene per il primo modo accẽnato.	

Volendolo mò prouare per la Regola del 9, si riducono pure li termini della propositione alla natura infima delle loro minutie; e poi s'opera, come di sopra s'è insegnato. La propositione staria così.

Oncie 200. Denari 550. Oncie 12. Denari 33.

2 — 3 1 — 6 — Prima, e quarta cosa.

2 — 3 1 — 3 — Seconda, e terza cosa.

Adũque stà bene anco per il secondo modo accẽnato: perche il terzo Prodotto della secõda operatione è pur 3 simile al 3 della prima operatione. Qui giudico bene auuertire, che facendosi la proua per la Regola del 9, si possono cauar li 9, da qual si voglia gran numero in due modi: o partendo detto numero per 9. e s'auanza qualche cosa, quall'auanzo sarà la proua. Ouero sommando detto numero; e poi gettãdo tutti li 9, il resto sarà la proua, e se nõ resta cosa alcuna, la proua sarà ose quest'vltimo

mo modo è il più facile, ed il più praticato. Questo priui-legio nō hà la proua del 7. la quale si caua da numeri solamēte per via di partire. Anzi voglio quì insegnare vna bellissima regola per saper conoscer prestissimo la proua: cioè che numero auanzi, dopo d'hauer gettati tutti li 9. senza far conto, quante volte entri il 9. nel proposto numero. Per esēpio, voglio cauar la proua del 9 da questo numero 754230. Operando per via di sommare, dico così 7, e 5, fà 12; e 4, fà 16; e 2, fà 18; e 3. fà 21; e 0. fà pur 21. Adūque 21. è la sōma del proposto numero. Sēza far mò il cōto, quante volte entri il 9 in 21. e che numero auanzi per la proua, basta sōmare insieme quel 21, e faranno 3. e pur 3 restariano à gettar via due volte il 9. da 21. Mà se la somma fosse di tal numero, che producesse vn altro numero, che superasse il 9. (se fosse per esempio 57) quel 57. si torna à sommare, e fanno 12. che vniti insieme sono 3. Adunque 3. è la proua di 57 ouero d'altro numero, che sommato, producesse vn 57. *Et sic de singulis*.

Ma quando nelle ragioni da prouarsi fossero rotti, (il che accade quasi sempre) la proua si fà (come sopra) per la Regola del 9; ma è vn poco più scabrosa: la qual difficoltà si lieua col mettersi à memoria quello s'insegnò à questo effetto nella proua de' rotti à carte 26. Tenganſi anco à mente, che la proua d'vn Scudo, pigliato ò per Lir 4. ò per Sol. 80. è 8. La proua d'vna Lira è 2. e la proua d'vn Soldo è 3. *His præmissis*, per fuggir parole veniamo alla pratica.

Vna Libra d'Amandole costa Soldi 5. Den. 7. Quanto costaranno Lib. 16. Onc. 9? Costaranno Lir 4. Sol. 13. Den. 6. $\frac{3}{12}$.

Per farne mò la proua, si comincia sēpre dalla quarta cosa (come più brigosa) e per ciò conuertite in Denari le Lir 4. Sol. 13. Dē. 6. se ne caua la proua, qual è Dē. 6. Questa proua vnita col suo rotto, darà Den. 6. $\frac{3}{12}$. cauando po-

poscia la proua da questo 6, e $\frac{3}{12}$ (come s' insegnò pure a car. 26.) ne riuscirà $\frac{3}{3}$, cioè 1. intiero; e questa è la proua della quarta cosa; qual si conserua. Secondariamente si caua la proua dalla prima cosa, cioè da vna Libra conuertita in Oncie, per esserui Oncie nella terza cosa; la qual proua è 3, il qual 3, moltiplicato con $\frac{3}{3}$, ouero con l'1. intiero, ne dà parimente di proua 3, e tanto ne deue dare la moltiplicatione della proua della seconda, e terza cosa: del che facendone esperienza: la seconda cosa ne dà 4 di proua, e la terza ne dà 3, che moltiplicato col 4 ne produce 12, la cui proua è ancor lei 3. Adunque la ragione stà bene. Alle volte occorre, che la proua della prima, e quarta cosa non batte così bene, con la proua della seconda, e terza cosa, come hà fatto nel proposto esempio: in tal caso si moltiplicano in croce tali proue; e dal Prodotto cauandone la proua, lasciarà figure simili, se la ragione non sia errata. La qual cautella accade appunto nel quesito, che siegue.

Vn altro esempio. Se Brazza 5 $\frac{2}{3}$ di Veludo costano Scudi 7 $\frac{3}{4}$, che costaranno Brazza 12 $\frac{7}{8}$? Costaranno Scudi 17. Lir. 2. Sol. 8. Din. 8. e $\frac{64}{544}$. Questo è differente dal passato per rispetto de' rotti in tutte quattro le cose; ad ogni modo la proua si fà come nell' esempio passato. Cominciando adunque dalla quarta cosa, la sua proua è Den. $\frac{0}{4}$, e quella della prima è Brazza $\frac{3}{8}$, che moltiplicate insieme fanno $\frac{0}{12}$, la cui proua è $\frac{3}{0}$, e tale doueria essere la proua della seconda, e terza cosa moltiplicate insieme. Alla pratica. La proua della seconda cosa, cioè di Scudi 7 $\frac{3}{4}$, è $\frac{4}{4}$. Ma perche la quarta cosa fù prouata in Denari; per la relatione, che hà la seconda cosa con la quarta, bisogna ridure quel $\frac{4}{4}$ in proua di Denaro; il che giudiciosamente si fà così. Primo, si moltiplica il 4 Numeratore del rotto $\frac{4}{4}$ per 8, (proua d' vn Scudo, cioè di Soldi 80.) e fanno 32, la cui proua è 5.

Dop-

Dopo, si moltiplica questo 5 con 3 (proua d'vn Soldo,) e fanno 15, la cui proua è 6; sotto il quale ponendo il 4 (Denominatore di $\frac{4}{4}$) fà $\frac{6}{4}$, e questo $\frac{6}{4}$ sarà la proua della seconda cosa. La proua poi della 3. cosa è $\frac{4}{3}$, la quale moltiplicata col $\frac{4}{6}$ della seconda, produce $\frac{24}{12}$, la cui proua è $\frac{6}{1}$. Ma perche doueria essere $\frac{0}{3}$, simile al $\frac{0}{3}$ della prima, e quarta cosa; però (come dissi nel passato esempio) bisogna moltiplicare in croce il $\frac{0}{3}$ con il $\frac{6}{1}$, e ne verrà 0. 18. la cui proua è 0. 0. Adunque la ragione stà bene. E tanto basti all'ingegnoso, e speculatiuo. Se bene il meglio sia, che facendo vna ragione, si proui a membro per membro. Fatto vn moltiplicare, ouero vn partire, si proui subito; e quando fosse negotio di rilieuo, si proui più volte.

REGOLA DEL TRE' ROVERSCIA.

CAP. IX.

QVesta Regola si chiama del Trè alla Rouerscia; perche s'opera tutto al contrario dell'altra: In quella si moltiplica il secondo numero, ò cosa proposta con la terza, e partendo il Prodotto per la prima, nel Quotiente s'hà la ricercata quarta cosa, ò numero: ma in questa si moltiplica la prima con la seconda, e partendo il Prodotto per la terza, nel Quotiente s'hà parimente la quarta cosa cercata.

Per conoscere mò quando il quesito s'habbia da risoluere per la Regola Rouerscia, si dà questo auuertimento. Ogni volta, che la quarta cosa cercata, habbia da esser manco del secondo termine del quesito in quella proportione, che il terzo termine supera il primo; tali quesiti si risoluono per la Regola del Trè Rouerscia. Per esempio. Quando il Sacco del Formento val Lir 24

la

la Chioppa del pane peſa Oncie 14. quãdo valerà Lir. 40 quanto peſarà? In queſto queſito col ſol lume naturale ognuno sà, che quãto più vale il Formento, la Chioppa deue eſſer più piccola, e tanto più piccola, quanto che le Lir 40 ſuperano le Lir 24. Mà perche il 24. contiene le trè quinte partè di 40. però quando il Sacco val Lir 40 la Chioppa doueria peſare $\frac{3}{5}$ di quello, che peſa quando val Lir 24. cioè Onc. 8. $\frac{2}{5}$ e que'to ſerui ſolo per auuiſo.

Queſta Regola ſeruè per ſaper dar il callo, ò accreſcere alle mercantie de Panni, Lana, Grano, Pane, &c. Alla pratica.

Queſito Primo.

Vno ſi cõpra Brazza 8 $\frac{1}{2}$ di pãno fino, alto Brazza 2 $\frac{1}{8}$ per veſtirſi; Volendo foderare l'habito di dentro via d' vn altro pãno, alto ſolamente Brazza 2 $\frac{1}{8}$, s'addimanda quante Brazza ce ne vorranno di queſt'vltimo panno?

Moltiplicanſi le Brazza 8 $\frac{1}{2}$ con la ſua altezza 2 $\frac{1}{8}$, & il Prodotto, che ſarà $\frac{119}{6}$ ſi parti per le Brazza 2 $\frac{1}{8}$, che di Quotiente ne verrà 9 $\frac{1}{3}$, e tante Brazza appunto ce ne vorrano per fodra del veſtimento.

Queſito Secondo.

Brazza 9. alto Brazza 2 $\frac{1}{4}$, fa vna veſte. Per fodrarla quanto Damaſco ci vorrà, alto ſolamente trè quarti, e $\frac{1}{2}$?

In queſto, e in qualſiuoglia altro caſo propoſto, quando le due miſure compagne ſono denominate con Brazza, ò parte di Brazzo, e la miſura diſcompagnata, è denominata con nome di quarti, ò parte di quarti; in tal caſo biſogna ridurre la ſua relatiua delle due compagne parimente in quarti, &c. acciò ſiano di ſimil parti, e poi s'opera come ſopra. Siche riducendo le

Braz-

Brazza 2 $\frac{1}{4}$ in quarti fariano $\frac{9}{4}$, con li quali operando, si vede, che per fodrar la veste ci vorriano Brazza 23 $\frac{1}{4}$ di Damasco.

Quesito Terzo.

Vno cõpra vna pezza di panno, longa Brazza 45, à ragione di Soldi 32. il Brazzo, costui bagnandola, la pezza resta solamente 40. Brazza. S'addimanda, quanto s'hà da vendere tal panno il Brazzo, per non perderui?

S'opera come sopra, e ne vengono Soldi 36. E tanto deue vendere il panno bagnato per Brazzo.

Quesito Quarto.

Vn altro fà bagnare, e cimare Brazza 16 $\frac{1}{2}$ di panno, qual restò solamente Brazza 12 $\frac{1}{2}$. S'addimanda. Quanto viene à calare il Brazzo?

Sottraganſi le Brazza 12 $\frac{1}{2}$ dalle 16 $\frac{1}{2}$, che ne restaranno 4, e poi si dichi. Se Brazza 16 $\frac{1}{2}$ mi calò 4. che mi calarà vn Brazzo? Opera per la Regola del Trè retta, che ne restaranno $\frac{8}{33}$, e tanto calla il panno per ciascun Brazzo.

Quesito Quinto.

Vn altro cõpra Stara di Formento 2368. à ragione di Lir 3 -- 5. il Staro: mà facendolo criuellare, & acconciare, troua che d'ogni 16 Stara li cala vn Staro. S'addimãda. Quãto lo deue vender lui il Staro; per non perderui?

Di cosi. Se Stara 16, restano Stara 15. quante restarãno Stara 2368? Operando per la Regola dritta, restaranno Stara 2220. Ciò fatto: torna à dir per la Regola Rouerscia. Se Stara 2368. prima, che calassero, costauano Lir 3. -- 5. il Staro. Doppo l'esser restato Stara 2220. quãto valerà? Valerà Lir 3 -- 9 -- 4. e tanto deue vender il Staro del Formento, per non perderui. Si potria anco operare per

per la Regola dritta cosi. Certa cosa è, che le Stara 2368. a Lir. 3 -- 5. il Staro costano Lir. 7696. Dicasi adunque. Se Stara 2220. netto mi costano Lir. 7696. Quanto costarà vn Staro? Operando valerà Lir. 3 -- 9 -- 4, come per l'altro modo.

Quesito Sesto.

Quattro Maestri da Cazzuola promettono di far in due Anni certa fabbrica di proposito: mà perche il Padrone se ne vuol sbrigare. S'addimanda. Se vi lauorassero 10 Cazzuole, in quanto tempo saria finita la fabbrica?

Moltiplicando le 4. Cazzuole con 730. (giorni di due Anni:) e partendo il Prodotto per le 10. Cazzuole; ne verranno giorni 292. Et in tanto tempo appunto si finirà la fabbrica; lauorandoui 10. Maestri da Cazzuola.

Quesito Settimo.

Quando il Staro del Formento vale Lir. 8. vn Soldo di pane fatto in Casa pesa Oncie 11. Quest'Anno, che il Grano vale Lir. 12. il Staro; quant' Oncie se n'haueranno per vn Soldo?

Moltiplicasi l' 11 con l' 8; e partito il Prodotto per 12, ne verranno Oncie $7\frac{1}{3}$, Numero cercato. Per vn Soldo s'haueranno Oncie $7\frac{1}{3}$ di pane.

Quesito Ottauo.

Hò detto pane fatto in Casa: oue non si conta nè macina, nè fattura, ouero cottura: perche in risguardo a Fornari, non seruiria questa Regola rouerscia mà saria pregiudiciale a compratori. Per dare adunque vn limite a fornari, si fà cosi. Prima bisogna sapere quanto pane si caui da certa misura. Secondo bisogna sapere

le spese di gabelle, macina, &c. d'essa misura. Terzo, quanto habbia da guadagnare per sua fatica, e mercede il Fornaro; e così la somma di tutte queste cose, s'aggiongono al prezzo di tal misura. Hora mò suppolto, che vn Staro di Formento costi Lir. 4. Per macina, e gabelle Sol. 5. per sua fattura, cottura, &c. Sol. 7. il Staro: è che da vn staro si cauì Lib. 50. di pane ben conditionato. Si fà così. Sommato insieme le sudette cose fanno Lir. 4. Sol. 12. Si dirà adunque per la Regola retta. Se per soldi 92. s'hanno Lib. 50. di pane; per vn soldo solo, quante Libre, ouero Oncie se n' haueranno? Fatte in Oncie le 50. Libre, & operando; per vn soldo s'hauranno Oncie 6, e $\frac{4}{92}$ di pane.

Questa distintione, ò differenza d'operare è insegnata dal non mai a bastanza lodato Nicolò Tartaglia, nella prima parte lib. 10. cap. 2. oue insegnando il modo di far la Tariffa, ò di dar il Calmierò alli Fornari, insegna anco la sudetta Regola. E molto mi marauiglio, che nissuno di quei ch'hanno scritto dopo di lui: proponendo simili quesiti: non fanno distintione alcuna da pane a pane, e pure la pratica fà vedere il contrario. Per esempio.

Quando il Sacco del Grano in Modona, vale Lir. 24. la chioppa del Pane pesa Oncie 14. Quando valerà Lir. 40. quanto pesarà? Operando per la Regola Rouerscia, la chioppa doueria pesare Onc. 8. $\frac{2}{5}$, e pure l'Anno 1664. che il Formento valeua Lir. 40. la chioppa pesaua Onc. 9. $\frac{3}{5}$ in vigore del Calmiero di Modona: (molti de'quali si trouano nel fine del Libro de' Statuti, secondo che cala, ò cresce il prezo del Grano;) e questo auuiene; perche quei, che fecero li detti Calmieri, operorno come si deue.

Quesito Nono.

Cento settanta Frati si trouano in certo Conuento con

con prouisione solamente per 7. mesi: e sono certi, che per 12. mesi intieri non possono prouedersi. S'addimanda. Quanti Frati deue licentiare il Priore: acciò gli altri, che restano, habbiano da viuere per 12. mesi; fin che venghi soccorso?

Moltiplica li 170. Frati, con li 7 Mesi, e partendo il Prodotto per 12. Mesi, di Quotiente, ne verranno Frati 99. $\frac{1}{6}$. e tanti per 12. Mesi viueranno con la prouisione, &c. Adunque 70, e $\frac{5}{6}$ ne deue licentiare il Priore. E tanto basti. Questa è Regola generale, che si moltiplicano le due misure, o cose compagne, & il Prodotto si parte per la misura, ò cosa discompagnata, & il Quotiente sarà quello si cerca, e la compagna della cosa discompagnata; siano mò nel primo, ouero nell'vltimo luogo le cose compagne. Per esempio. Hò 6. Brazza di panno, non sò quanto sia alto, sò bene, che per fodrarla vi vogliono 8. Brazza di tela liscia, alta Brazza 1. $\frac{1}{2}$. S'addimanda. Quanto è alto il Panno? Moltiplicando le Brazza 8. con Brazza 1 $\frac{1}{2}$, e partendo il Prodotto per le Brazza 6. ne verrà 1. $\frac{1}{2}$. E questa è l'altezza del panno.

REGOLA DEL TRE' COMPOSTA DRITTA.

CAP. X.

NEl calcolare spesse volte occorrono alcuni quesiti, ch'hanno cinque termini, li quali sogliono ingarbogliare la mente. Mà per fuggir ogni difficoltà, è stata inuentata questa Regola del Trè composta; la quale si chiama così: perche mòltiplicando il primo col secondo termine, & il quarto col quinto, il quesito si riduce sotto la Regola del Trè ordinaria.

Questa Regola cõposta hà lei ancora le sue osseruationi, necessarijssime, s'hà da dir il vero. Bisogna, che il primo termine sia della natura del quarto, il secondo sia

della natura del quinto; & il terzo resta solo nel mezo; e della natura della cosa cercata; però bisogna considerar bene le propositioni, e se non fossero proferite bene; aggiustarle. O veniamo alla pratica.

Quesito Primo.

Cinque Segatori, ò Mietitori in 8. giorni beuono 12. secchie di vino. S'addimanda 10 Segatori, ò Mietitori, quante secchie ne beueranno in 15. giorni?

Questa, e simili propolte, si possono risoluere per la Regola Aurea semplice in due colpi così. Dico adunque. Se 5. beuono in otto giorni secchie 12, che beueranno 10. pur in otto giorni? Operando li 10. Segatori, ò Mietitori in otto giorni beueriano 24. secchie di vino. Fatto questo si dice mò. Se otto giorni mi danno 24. secchie di spesa. Quante me ne daranno 15. giorni? Ne daranno 45. secchie. E tanto Vino beueranno li 10 Segatori, &c. in 15. giorni.

Ma per vn altro modo più succinto, e più maestrale, si risoluono simili quesiti; & è questo. Si moltiplicano insieme li 5. Segadori con li 8. giorni, quali fanno 40: Si moltiplicano parimente li 10. Segadori con li 15. giorni, che fanno 150. Fatto questo, si dice poi per la Regola; se questo composto 40. vuole, ò bene 12. secchie di vino; quante ne vorrà quest'altro composto 150? Opera, e vedrai, che pur ne sortiscono 45. secchie; col quale ordine si sciolgono li seguenti quesiti.

Quesito Secondo.

Vna famiglia honorata d'8. bocche, spende 45. Scudi il Mese, per il vitto cotidiano; mà che? Sopraggiongono trè Parenti, che per vn Anno intiero vogliono piantare il Bordone Hor s'addimanda Quanti Scudi deue preparare in borsa il Padrone, senza alterare il viuo consueto?

Di-

Dicasi così. Bocche 8. con vn Mese fanno vn cõposto pur di 8; e bocche 11. con 12. Mesi fanno vn altro cõposto di 132. e poi, se 8. mi danno 45. scudi di spesa: 132. quanta spesa mi darà? Opera, che certo ci vogliono Scudi 742. $\frac{1}{2}$ che a farne il conto, sono 15. Soldi il giorno per testa a 360. giorni per vn Anno Mercantesco.

Quesito Terzo.

Con Scudi 130. vn Mercante in 10. Mesi hà guadagnato Scudi 25. S'addimanda. Con Scudi 317. quanto guadagnarà in 3. Anni, e mezo?

Il primo composto è 1300. ed il secondo composto è 12680. Opera, che guadagna Scudi 243 $\frac{11}{11}$. *Et sic de singulis.*

Quesito Quarto.

Cinque Segadori braui in vn giorno hanno segato 12. Tornature di prato. Altre 45. me ne restano da segare, e vorrei segarle in due giorni; Addimando. Quanti huomini hò da incaparare per ciascun giorno?

Questa, e simili si potriano sciogliere in varij modi, ma questo è il più leggiadro. Dicasi così. Se 12. Tornature sono segate da 5. huomini in vn sol giorno, da quanti se ne segariano 45. pur in vn sol giorno? Operando per la Regola ordinaria, si segariano le 45. Tornature da 18 $\frac{3}{4}$ in vn sol giorno: ma perche voglio segarle in due giorni, basta partire per metà quel 18. $\frac{3}{4}$, il che fatto consta chiaro, che per segare le proposte 45. Tornature di prato in due giorni, ci vogliono Operarij 9 $\frac{3}{4}$ per ciascun giorno.

REGOLA DEL TRE' COMPOSTA ROVERSCIA.

CAP. XI.

QVesta Regola composta Rouerscia, hà lei ancora cinque termini: trè nel suppostо, e due nella domanda, (come la composta dritta.) Mà perche alle volte sono propostі li quesiti tanto confusamente, e con sì poco ordine; che difficilmente si troua il modo d'intauolarli: però bisogna star molto bene auuertiti, per saper discernere, quando li quesiti s'habbino da risoluere per la Regola Dritta, è quando per la Rouerscia. Ogni volta, ch'hauendo ordinata la propositione, li termini del quesito non saranno al proprio luogo, si risolue per la Regola Rouerscia.

Il primo, ch'habbia scritto di questa Regola è stato il Zucchetta Genouese: mà con tanta oscurità, che (al dir del Dottor Bailli Piacentino nella medesima Regola) da pochi è inteso. Se poi sia stato inteso da quei, che dopo al Zucchetta hanno stampato: non tocca à me il dirlo. Sò bene, che alcuni propongono li puri quesiti del Zucchetta, senza vna sol parola di dichiaratione. Altri si discostano vn tantino dalla riua: ma non hanno data Regola chiara, ed vniuersale. Confesso la verità, che più m'hà dato da faticare l'intender bene il Zucchetta in questa materia, che l'hauere appreso l'Algebra: mà perche col fauor del Cielo, n'hò cauato il marcio; qui ordinatamente metto in chiaro quello, ch'altri hanno lasciato oscuro, ed imbrogliato. Mà perche *posita iuxtà se opposita magis elucescunt*; prima insegnarò a conoscere la propositione dritta, acciò meglio s'apprendi poi la rouerscia, Alla pratica.

Se

Se ſcudi 540. in Meſi 9. hanno guadagnato ſcudi 30. quanti ne guadagnaranno ſcudi 378. in Meſi 12?

Se Molini 12 in giorni 7, macinarono Mine 480. di Grano. Quante Mine ne macinaranno Molini 5. in giorni 8?

Queſti due eſempij ſono bene ordinati, e ciaſcun termine è poſto al ſuo luogo. Conſiderateli bene, e ſappiate, che nel mezo ſempre vi deue ſtare il patiente, (come a dir il guadagno, le Mine, &c.) e nelli due primi luoghi vi deuono ſtare li due agenti. State bene attento. Quei ſcudi 30. di mezo non ſono guadagnati ſolamente dal capitale di quei ſcudi 540. mà vi concorrono anco li Meſi 9. ſiche li due primi termini ſono ſempre quaſi come Padre, e Madre, che generano, e producono il termine di mezo. (il che milita in ogni queſito dritto, e ben ordinato.) A noi.

Ogni volta adunque, ch'hauendo ordinata la propoſitione, ſe nel terzo luogo vi ſarà qual ſi voglia delli due agenti; cioè il capitale, ouero il tempo, ò altra coſa equiualente al capitale, per Regola vniuerſale, ed infallibile il queſitò è ſottopoſto alla Regola Rouerſcia. E perche la ſeſta coſa, che ſi cerca è ſempre della natura di quella, poſta nel terzo luogo dopo l'hauere ordinato il queſito, (nè iui può cadere, ſe non vno delli due agenti: cioè ò capitale, ò tempo, ò coſa equiualente) ne ſiegue di neceſſità: che due ſole ſaranno le intauolature ſpetiali, per riſoluere ogni queſito rouerſcio. Or laſciamo la teorica, e veniamo alla pratica.

Queſito Primo.

Se Scudi 28. furono guadagnati da Scudi 378. in Meſi 12. In quanti Meſi ſaranno guadagnati Scudi 30. da Scudi 540?

Ouero.

Se Scudi 378. guadagnarono Scudi 28. in Mesi 12. In quanti Mesi Scudi 540. guadagnaranno Scudi 30?

O pur,

Se in Mesi 12. scudi 28. furono guadagnati da Scudi 378. in quanti Mesi saranno guadagnati scudi 30. da scudi 540?

Hor quì considerate, che tutti trè questi modi di proporre vn medesimo quesito, cadono sotto la Regola Rouerscia, e non per altro, se non perche, discacciato il guadagno fuori del terzo luogo dal modo di proporlo; v'entra dentro vno delli agenti: cioè, ò capitale, ò tempo. Mà perche in tutti trè questi esemplari si ricerca il tempo (come secondo agente) però tutti trè si deuono intauolare con quell'ordine, che in questo primo Specchio si vede

Primo Specchio, ouero Modello, per intauolare ogni queſito compoſto rouerſcio; quando in eſſo ſi ricerca il tempo.

Caſe,	PRIMA.	SECONDA.	TERZA.	QVARTA.	QVINTA.
	Scudi 378.	Meſi 12.	Scudi 30.	Scudi 540.	Scudi 28.
	Capitale del ſuppoſto. 1.	Tempo del ſuppoſto. 2.	Guadagno della domanda. 3.	Capitale della domanda. 4.	Guadagno del ſuppoſto. 5.

Per capir mò presto questo Specchio, ed il modo d'intauolar qual si sia propositione rouerscia: considerate, che ciascun termine cade nel proprio luogo; come nella regola Dritta; eccetto li patienti, ò guadagni, che vicendeuolmente barattano il proprio luogo; (come insegnano li numeri posti nel piè del specchio.) Intauolato, che sia il quesito, come insegna il specchio, s'opera tutto al contrario della Regola Dritta, cioè si multiplica il primo composto per il termine di mezo, & il Prodotto diuiso per il secondo composto, nel Quotiente, s'hauerà la cosa cercata (come qui di sotto si vede.)

Scudi 378	-- Mesi 12	-- Scudi 30	-- Scudi 540	-- Scudi 28.
	12			28
	4536	Primo composto		4320
	30			1080
	136080	-- Quot. Mesi 9.	Diuisore	15120 è secondo
	136080			composto.

.....

Si conclude, che in Mesi 9. li scudi 540. guadagnariano scudi 30.

Per farne la proua, si dice così.

Se 540. in Mesi 9. guadagnano 30. Quanti ne guadagnaranno 378. in Mesi 12. Operando secondo la Regola Dritta, guadagnaranno scudi 28 (come si propose da principio.) Adunque l'operatione fù buona.

Quesito Secondo.

Se scudi 28. furono guadagnati in Mesi 12. da scudi 378. Da quanti saranno guadagnati scudi 30 in Mesi 9?

Ouero,

Ouero,

Se in Mesi 12, scudi 28. furono guadagnati da scudi 378. da quanti saranno guadagnati in Mesi 9. scudi 30?

O pure,

Se scudi 378. guadagnarono scudi 28. in Mesi 12. Quanti furono li scudi, che guadagnarono scudi 30. in Mesi 9?

O qui considerate ancora, che l'istesso quesito passato, pronunciato in questo luogo in trè altri modi differenti da quello stà parimente sottoposto per ciascun modo alla Regola Rouerscia, nè per altro, se non perche nel terzo luogo vi stà vn agente, che doueria stare nel primo, ò secondo luogo. Ma perche in tutti trè questi esemplari si ricerca il capitale (come agente primario) però tutte trè si deuono intauolare con quell'ordine, che in questo secondo specchio si vede.

Secondo Specchio, ouero Modello, per intauolare qualſiuoglia queſito compoſto rouerſcio, quando in eſſo ſi ricerca il capitale, ò il primo agente.

Caſe. PRIMA.	SECONDA.	TERZA.	QVARTA.	QVINTA.
Scudi. 378.	Meſi. 12.	Scudi. 30.	Meſi. 9.	Scudi. 28.
Capitale del ſuppoſto. 1	Tempo del ſup. poſto. 2	Guadagno del. la domanda. 5	Tempo della domanda. 4	Guadagno del ſuppoſto. 3

Risolutione del Quesito.

Scudi 378. Mesi 12. Scudi 30. Mesi 9. Scudi 28.
12 9.

Primo cõposto 4536 Secondo Cõposto, e Diuisore 252
30

Diuis. 252. — 136080 — Quot. 540. Scudi ricercati.
1260..
1008
1008
....0

Si conclude, che li scudi 30. saranno guadagnati in Mesi 9. da scudi 540.

Per farne la proua, si dice così.

Se scudi 540. in Mesi 9. guadagnano 30. Quanti ne guadagnaranno 378. in Mesi 12? Questa intauolatura è come quella della proua passata: & operando, come iui s'insegnò, ne verranno pure li scudi 28. (come anco da principio di questo secondo quesito si propose.)

Auuiso.

Osseruate di gratia per vostro ammaestramento, che questo secondo specchio, ouero intauolatura è in tutto & per tutto simile alla prima; eccetto che nella quarta Casa, poiche nel primo Specchio la quarta Casa contiene il primo agente della domanda, cioè il Capitale, & in questo contiene il secondo agente, cioè il tempo.

Que-

Quesito Terzo.

Se Mine 400. di Grano furono macinate da Molini 5. in giorni 8. In quanti giorni saranno macinate Mine 840. da Molini 12?

Questo quesito in tutto, e per tutto è simile al primo: perche si ricerca il tempo: e però si risolue, e si proua con l'ordine, e per li modi, iui insegnati: nè altro v'è d'auuertire: se non che li Molini fanno vfficio di capitale, (come agenti primarij:) e le Mine tengono il luogo del guadagno (come patienti.) L'intauolatura adunque starà come siegue.

Molini 5.	Giorni 8.	Mine 840.	Molini 12.	Mine 400.	
	5	40		12	
40	33600	Quot. giorni 7.	Diu. 4800		
	33600				

.....

Le Mine 840. fariano macinate da 12. Molini in sette giorni.

Quesito Quarto.

Se Mine 400. fariano macinate in giorni 8. da Molini 5. Da quanti Molini saranno macinate Mine [illegible] in giorni 7?

Questo quesito è in tutto simile al secondo: perche in esso si cerca il primario agente; cioè li Molini, che tengono il luogo di capitale: però la risolutione, e la proua, si troua come sopra nel secondo quesito, e Specchio.

Mol.

Mol. 5. Giorni 8. Mine 840. Giorni 7. Mine 400.

5 40 7

40 33600 -- Quoc. Mol. 12 2800

2800.

5600
5600

....

Le Mine 840. saranno macinate in 7. giorni da Molini 12.

Finalmente per non lasciar cosa desiderabile in questa da me molto stimata Regola, qui voglio insegnare il modo di conoscere con prestezza, se il quesito sia dritto, ò rouerscio, ed è questo. Proposto il quesito sempre si batte l'occhio addosso alli due termini della domanda, e quali si siano, subito si colocano nella quarta, e quinta casa dell'intauolatura, come pare. Fatto questo: nelle due prime case si colocano quei due termini del supposto, che corrispondono alla natura delli due già intauolati della domanda. Siche vi restarà di necessità quel termine, ò cosa da metter nel mezo. Hora mò io dico.

Se quella cosa, che cade nel mezo, sarà guadagno, ò cosa fatta; il quesito è dritto, mà se sarà vno degli agenti del supposto, sarà rouerscio. Chi non la capisce, si dichiara molto grosso di legname.

RE-

REGOLA DEL TRE MVLTIPLICE.

CAP. XII.

LA Regola del Trè Multiplice consiste nel risoluere in vn sol colpo li quesiti, ch'hanno più suppositi, & vna sol domanda (se più d'vna fossero le domande, impossibile saria il risoluerli in vn sol colpo) tutto il punto consiste nel sapere intauolare li quesiti. (il che è facilissimo.) Li termini sono sempre dispari. La domanda si coloca sempre da sè sola nell'vltimo luogo, (ne fà Casa) e per il primo termine della prima Casa s'ellege sempre la cosa simile alla domanda, e appresso se gli mette la sua compagna. Tutte l'altre Case si formano col proprio suppositi con li numeri simili vno a fianco all'altro. Ciascuna Casa hà due numeri, cioè sinistro, e destro. Il destro dell'vltima Casa è sempre simile alla cosa, che si cerca, e chiamasi numero penultimo. La domanda, se bene è sola, si reputa per numero destro. Ma per esser questo negotio più di curiosità, che di necessità, veniamo alle curte.

Quesito primo.

Brazza 10. di tella costano Lir 4. & il 100. della Canepa val Lir 16. S'addimanda. Per Brazza 85. di tella quanta Canepa s'haverà?

Braz.	Lir.	Lir. Canep.	Braz.
10	4	16	100	85

Canep. Lib. 100.
Tela Braz. 85.
Lir. 16.
Braz. 10.
8500
Lir. 4

Diuif. 16 | 0 | 3400 | 0 Nu. da partirfi.
Quot. 212 $\frac{80}{160}$ cioè $\frac{1}{2}$.

Intauolato, che fia la propofitione, (come hò infegnato, e come fi vede in figura,) per hauere il numero da partirfi, fi moltiplicano infieme tutti li num. deftri di ciafcuna cafa: e s'hauerà nell'vlt. Prodotto 34000. Per hauer mò il Partitore, fi moltiplicano inlieme parimente tutti li numeri finiftri di ciafcuna cafa: e s'hauerà 160. Diuifo poi quello per queſto, di Quotiente s'hauerà 212 $\frac{1}{2}$ per la cofa cercata. Adunque per Brazza 85. di tela, s'haueranno Lib. 212. $\frac{1}{2}$ di Canepa. Per farne la proua, fi dice così. Se Brazza 10. coftano Lir. 4. Quanto coftaranno Brazza 85. Coftaranno Lir. 34. Dipoi fi dice. Se con Lir. 16. hò Libre 100. di Canepa. Con Lir. 34. quante Libre n'haverò? Operando, n'haurai Libre 212, $\frac{1}{2}$ (come per l'altro modo.)

Queſito Secondo.

Supponiamo; che Brazza 10. di qual ſi voglia cofa alla mifura di Milano, fiano 12. in Venetia; e 9. di Venetia fiano 11. in Ferrara; e 15. di Ferrara fiano 16. in Bologna; e 20. di Bologna fiano ſolamente 18. in Modona. S'addimanda. Brazza 100. di Modona; quante riuſciranno in Milano?

Mod.Bol. 18 -- 20	Bol.Fer. 16 -- 15	Fer.Ven. 11 -- 9	Ven.Mil. 12 -- 10	Mod.100. di Mod. quante in Mil.

In questo quesito, perche la domanda è misura di Modona, bisogna metter nel primo luogo dell'intauolatura il suppostо di Modona, col suo equiualente: cioè, che 18. di Mod. sono 20. in Bol. Nel resto retrogradando, le case si danno la mano l'vna l'altra (come gli Anelli della Catena.) Operando poi, (come hò insegnato,) il Diuisore sarà 8018. il numero da partirsi 2. 7000000, & il Quotiente 71 $\frac{1}{44}$. Si che 100. Brazza di Modona, saranno in Milano solamente Brazza 71 $\frac{1}{44}$.

Quesito Terzo.

Vno compra vna quantità di Formento à Lir. 8. la Corba, e più $\frac{1}{20}$ di spesa. Nel maneggiarlo, e nel condurlo calò a ragion di 5. per 100. Domando quanto deue venderlo la Corba per non perderui?

	Corb. Lir. 1 -- 8	Proport' 20 -- 21	Proport. 100--105	Corb. 1. Quanto costarà?

In questo quesito bisogna osseruare; ch' hauendo

do $\frac{1}{20}$ di ſpeſa per Corba, quel, ch'è 20. diuenta 21. Et eſſendo calato 5. per 100. quello, che prima era 105. reſta poi ſolamente 100. Si che habbiamo due Caſe di proportioni: cioè aſtratti da ogni materia: Queſte Caſe mò di proportioni ſi poſſono colocare nell'intauolatura oue più piace: ò trà l'vltima Caſa, e la domanda; ò pure frà le medeſime caſe materiali, ſenza pregiuditio alcuno. Operando al ſolito il Diuiſore ſarà 2000. Il numero da partirſi 17640, & il Quotiente Lir. 8 -- 16 -- $4\frac{4}{7}$. Adunque; ſe l'amico non vuole perderui, deue vender la Corba del Formento Lir. 8 -- 16 -- $4\frac{4}{7}$. Alla proua.

Habbia comprato 100. Corbe a Lir. 8. la Corba, fanno Lir. 800; ma perche vi è $\frac{1}{20}$ di ſpeſa per Corba: biſogna dire. Se 20. diuenta 21. Che diuentarà 800? Operando, diuentarà 840. E perche calò 5 per 100. Si dice. Se 100 prima della perdita erano 105. Quante erano 840? Operando erano 882. E queſtoè la vera valuta delle 100 Corbe di Grano, computandoui la ſpeſa, & il calo. Per ſaper mò la valuta d'vna ſol Corba: baſta à partir per 100 quelle Lir. 882, e ne verranno appunto Lir. 8 -- 16 -- $4\frac{4}{7}$ (come prima.)

Queſito Quarto, e Primo Rouerſcio.

Lauoranti 100 preſero la rottura d'vn fiume in 30 giorni d'hore 14. Domando in quanti giorni d'hore 12 là pigliariano Lauoranti 75?

Che queſto queſito ſia rouerſcio, da queſto ſi conoſce: che il maggior numero de'lauoranti; & i giorni più longhi da nuo l'opera fatta più preſto, & è contra. Il modo facilisſimo di riſoluere ſimili queſiti non è ſtato nè anco nominato d'alcun Scrittore (ch'io ſappia.) Eccolo da me ritrouato. S'opera in tutto, e per tutto, come ſi fà nella Regola del Trè ſemplice Rouerſcia.

Cioè: si moltiplicano insieme tutti trè gli agenti del supposto; & il loro Prodotto si moltiplica per il patiente: cioè per il termine discompagnato, (che nel caso proposto è la rotta) Diuidendo poi questo secondo Prodotto per il composto della domanda, nel Quotiente s'haurà quello si cerca. (Si può desiderare d'auuantaggio?)

Agenti del supposto	Patiēte	Agēti della domāda
Lauor. 100. Gio. 30. H. 14.	Rot. 1.	Lauor. 75. Hor. 12.
Gior. 30.		12.
3000.		Diu. 900. e composto della domanda.
Hor. 14.		
42000.		
Rotta 1.		

Diu. 9|00. 420|00. Quot. gior. 46. $\frac{600}{900}$, cioè $\frac{2}{3}$ d'hore 12.

Si cōclude, che la rottura saria presa da Lauoranti 75. in giorni 46 $\frac{2}{3}$ d'hor. 12.

Chi volesse operare con l'ordine de' precedenti quesiti, l'intauolatura staria come siegue: & operando al solito, s'haueriano pure giorni 46 $\frac{2}{3}$ d'hor. 12.

Lauoranti.	Hore.	Giorni.
Della domanda.	Della domāda.	Del supposto.
Del supposto.	Del supposto.	30.
75 —— 1000.	12 —— 14.	

Se

Se il quesito dicesse vna rotta di 50. Pertiche: quel termine 50 saria superfluo; poiche l'hauer preso la rotta cõtiene in sè la quantità delle Pertiche, e serui d'auuiso.

Quesito Quinto, e Primo mescolato.

Se con Brazza 380 di panno, alto 2. Brazza, si vestono huomini 30. S'addimanda. Quanto panno ci vorrà, alto solamente Brazza 1 $\frac{1}{2}$. per vestirne 45?

Questo quesito cade sotto la regola moltiplice mescolata: perche le due altezze diuerse del panno fanno vna positione rouerscia, essendo che la minor altezza ricerca più longhezza, ed è contra; mà gli huomini 30. in risguardo alli 45. fanno vna positione dritta; però simili quesiti s'intauolano, come siegue.

Huomini.	Altezza.	Longhezza.
Del supposto.	Della domãda.	Del supposto.
Della domãda.	Del supposto.	380.
30. —— 45.	1 $\frac{1}{2}$ —— 2	

Operando secondo la Regola per vestire 45. huomini di panno alto vn Brazzo, e mezo, ce ne vorriano Brazza 760 e che sia così, lo dichi la Geometria (*Per modum transeuntis*) à chi l'intende.

Long. Braz. 380.

Alt. Braz. 2.	Brazza quadre per vestire 30. huomini. Brazza 760.	Alt. Braz. 1 $\frac{1}{2}$.	Brazza quadre per vestire 45. huomini, Altezza senza longhezza Brazza 1140.

Le Brazza 380. alto 2. Brazza moltiplicate cõ le Braz-

za due della sua altezza, formano vna superficie di Brazza quadre 760. mà perche deuono seruire, per vestire 30. huomini: diuidendo per 30. il 760. ne viene 25 $\frac{1}{3}$. Si che per vestire vn sol huomo, ci vorranno Brazza quadre 25 $\frac{1}{3}$, e per vestirne 45. ce ne vorranno Brazza 1140, pur quadre: ma perche il panno da vestire questi 45. huomini è alto solamente Brazza 1 $\frac{1}{2}$, per hauere la sua longhezza; basta à partire il 1140 per 1 $\frac{1}{2}$. perche il Quotiente (che pur è 760.) sarà l'altro lato, concorrente alla formatione della superficie 1140. che hà vn lato cognito d'vn Brazzo, e mezo; e per conseguenza sarà anco la longhezza, ò le Brazza del panno cercato. Adunque l'operatione fù buona: perche anco geometricamente si proua, che per vestire li predetti 45. huomini (vt suprà) ci vogliono 760. Brazza di panno alto vn Brazzo $\frac{1}{2}$. Or proseguiamo cose più serie.

DE' CENSI, O MERITARE.

CAP. XIII.

CEnso non è altro, che dare, ò riceuere vna quantità di Denari, ò altra robba Mercantesca, con patto di pagare vn tanto all'Anno per 100. ouero al Mese, fin tanto che si restituischi il capitale. Quel tanto poi, che si paga per 100. è chiamato merito, ò frutto di quei Denari, ò altra robba impresstata, ò consegnata.

Il merito, ò frutto è di due sorti. cioè merito semplice, e merito di merito. Il merito semplice è quando si paga vn tanto all'Anno per 100 fin che sia restituito il capitale: ma il merito di merito, è quando che nel dare a censo, si fà patto, che ogni Anno li sian dati li suoi frutti; altrimente si dichiara, che quei frutti l'Anno seguente habbino d'hauere la sua ratta portione pur di frutto. Si che, se vno pigliasse Scudi 100, a censo con patto

to di pagare Scudi 10 all'Anno, e in capo a ciascun Anno di sborsar li detti 10. Scudi; se quel tale non li pagasse il primo Anno; l'Anno secondo douria sborsar Scu. 21. 20 per li Scudi 100, e 1. per merito, ò frutto di quei 10. Scudi, e così successiuamente. Ma questo secondo merito, si chiama vsura.

La maggior parte delli quesiti di questa materia, si risoluono, come s'è detto nel primo quesito della Regola del Trè composta: cioè. O per la Regola del Trè semplice in due colpi; ò per via di componimento, e per essere quest'vltimo più maestrale si seruiremo di esso. Ma per non errare nel comporre, bisogna auuertire, che il merito, ò frutto nasce da due cose; cioè, da terminata quantità di Denari, e di tempo prefisso, & vna, che manchi, non vi può esser merito. *His præmissis*. Veniamo alla pratica; poiche val più vn gran solo d'esempio, che cento Moggia di parole.

Quesito Primo.

Quanto meritaranno Scudi 4164. à ragione di Scudi 10. il 100. all'Anno?

Questa non porta difficoltà alcuna, qual si risolue per la Regola del Trè ordinaria. Guadagnariano all'Anno Scudi 416 $\frac{2}{5}$.

Quesito Secondo.

S'addimanda Scudi 630. Lir. 3. Sol. 15 Den. 8. à ragione di 15. per 100. all'Anno, in quanto tempo si radoppiaranno?

Fà così per la più curta in simili quesiti. Parti il 100. per il 15. (suo merito,) ed il Quotiente (che sarà 6 $\frac{2}{3}$) sarà quello, che si cerca. Siche in 6. Anni, & $\frac{2}{3}$, cioè 8. Mesi hauerai il doppio.

Quesito Terzo.

Ma se si dicesse Scudi 630. Lir. 3. Sol. 15. Den. 8. à ragione di Den. 3. per Lira al Mese; in quanto tempo si radoppiaranno?

In simili quesiti à Mese, basta à partire la Lira, cioè 20. per li Den. che merita la Lira al Mese: perche l'Auuenimento sarà quello, che si ricerca. Che nel caso nostro sariano pure Anni 6 $\frac{2}{3}$. cioè Mesi otto.

Quesito Quarto.

Vno impresta ad vn suo amico scu. 735. a 5. per 100. all'Anno. S'addimanda. Quanto hauerà guadagnato in due Anni, Mesi 7. e giorni 25?

Per hauere il primo composto si moltiplicano li scudi 100. col suo tempo, cioè con giorni 360. (per rispetto de' giorni, che sono nell'altro termine) e s'hauerà 36000. Per hauere il secondo composto si moltiplicano li Scudi 735. con gli Anni 2. Mesi 7. e giorni 25. (fatti tutti in giorni,) e s'hauerà 701925. E poi si dice. Se vn composto di 36000. guadagna scudi 5. Quanto guadagnarà quest'altro composto di 701925. Operando guadagnarà scudi 79. Lir. 1. Sol. 19. Den. 2. (Per vn Anno hò preso 360. giorni al costume de' Mercanti.)

Quesito Quinto.

S'addimanda Lir 60. à Den. 2 $\frac{1}{2}$. per Lira al Mese, quãto fruttaranno, ò meritaranno in Mesi 8. e $\frac{2}{3}$. cioè giorni 20.

La Lira, ed il Mese, fà vn composto d'1. solo. Le Lir. 60. con li Mesi 8. $\frac{2}{3}$. fanno l'altro composto di 520. Si dice adunque. Se 1. guadagna, ò merita Den. 2. $\frac{1}{2}$, che meritaranno 520? Operando, guadagnano Den. 1300. che riescono Lir 5. Sol. 8. Den. 4. (Quando li giorni si possono maneggiare per via di rotto, come hò fatto in questo esempio; riesce l'operatione di manco fatica, e numeri; per non hauere da fare li Mesi in giorni.)

Que-

Quesito Sesto.

Vno impresta ad vn altro vna quantità di Scudi, senza far scrittura à ragion di 10. per 100. all'Anno. Costui li godè Anni 2. e Mesi 8. E per frutto d'essi diede al Padrone Scudi 200. con carta di riceuuta, e testimonij. Volendo poi l'amico negare il captale, fù messo ll negotio in lite &c. Quanti furono li Scudi, che l'vno riceuette dall'altro?

Per risoluere simili quesiti, bisogna primieramente vedere, quanto guadagnino in due Anni, e 8. Mesi 100. di quei Scudi, che per frutto diede al Padrone a 10. per 100. Del che facendone proua, guadagnano Scudi 26 $\frac{2}{3}$. Patro questo, si dice poi. Se Scudi 26 $\frac{2}{3}$. vengono da Scudi 100. Da quanti verranno Scudi 200. che pagò per frutto? Operando vengono da scud. 750. E tanti furono li scudi dati a Censo. Se non ti fidi: fanne la proua, dicendo. Se scudi 100. in Mesi 32. (che sono li 2. Anni, e 8. Mesi) guadagnano scudi 26 $\frac{2}{3}$. Quanti ne guadagnaranno scudi 750. pur in 32. Mesi? Guadagnaranno Scudi 200. Adunque stà bene.

Quesito Settimo.

Vno hà tolto da vn suo amico scudi 100. a pagarli 12 per 100 all'Anno, quanto li tenesse non si sà; solo consta, che per frutto pagò al Padrone scudi 150. quanto tempo gli hà tenuti?

Per saperlo fà cosi. Moltiplica 100. di quei scudi, che pagò per frutto con vn Anno, e haurai vn composto pur di 100. e poi dirai. Se scudi 12. vengono da vn composto di 100. da che composto verrāno scudi 150? Verranno da vn composto di 1250. Mà perche l'vno de' componimenti questo numero 1250. sono li scudi 150. cogniti, e l'altro cōponēte cōsiste negli Anni incogniti; per hauere questi Anni; basta à partire il 1250. per li Scudi

di 1000. tolti a Censo; perche di Quotiente ne verrà 1 $\frac{8}{4}$, e tanti Anni appunto tenne li Scudi 1000. Che ciò sia il vero, dicasi. Se Scudi 100. in Mesi 12. guadagnano Scudi 12. Quanti ne guadagnaranno Scudi 1000. in Mesi 15? (che sono quell'Anno 1 $\frac{1}{4}$) Operando guadagnaranno Scudi 150. però stà bene.

Quesito Ottano.

Vno dice così. La Lira mi guadagna Den. 6. il Mese. Quante Lire mi guadagnaranno Den. 1. il giorno?

Questo si risolue come il passato. Per hauere il primo composto, si moltiplica Lir. 1. con li 30. giorni d'vn Mese, e s'haverà pur 30; e poi si dice. Se Den. 6. sono guadagnati dal composto di 30. Da che composto sarà guadagnato Den. 1?

Sarà guadagnato dal composto di 5. Diuidendo mò questo 5. per vn sol giorno restarà pur 5. e così Lir. 5. guadagnaranno vn Den. il giorno (Questo modo si tiene ogni volta, che manchi vno de' componenti il secondo composto: cioè, che il Quotiente sarà il componente incognito di tempo, ò di Scudi, &c.

Quesito Nono.

Vno piglia impresto Scudi 96. a Den. 4. per Lira al Mese di frutto. Costui le tenne Mesi 7. giorni 25. S'addimanda. Quanto montarà il merito di detti 96. Scudi in questo tempo?

Si fà così. Vedasi quanto guadagni vna Lira sola in detto tempo dicendo. Se Mesi 1. mi dà Den. 4. che mi daranno Mesi 7 $\frac{5}{6}$? Daranno Sol. 2. Den. $\frac{1}{3}$. Di poi si dice. Se Lir. 1. cioè Den. 240. mi guadagnano Den. 31 $\frac{1}{3}$, che mi guadagnaranno Scudi 96? Hò conuertito la prima, e seconda cosa in Den. per potere operar per quella

Re-

Regola detta a carte 45. come più lesta; cioè che quando la prima, e la seconda cosa sono simili, la quarta riesce della natura non della seconda, mà della terza cosa. Siche nel caso nostro moltiplicando li Den. 31 $\frac{5}{7}$ con li scudi 96 saranno 3008. che partito per il 240 ne risulteranno Scudi 12 $\frac{8}{11}$, ancorche il primo, & il secondo termine siano Denari. E questo auertimento è molto osseruabile. Adunque li scudi 96 in 7 Mesi, e giorni 25 fruttano scudi 12 $\frac{8}{11}$. (Quei Denari 240. sono la Lira, che tiene il primo luoco del quesito.) E tanto basti la materia del merito, ò frutti,

DEL SCONTARE.

CAP. XIV.

IL Scontare è vn atto contrario al meritare: perche col frutto s'accresce il capitale: mà col scontare si cala, e sminuisce. Quando vno guadagna 10. per 100. fà di 100 110, e di 10. fà 11. Ma per contrario scontando si fà di 110, 100, e d'11. si fà 10. solamente. E notisi bene.

Quesito Primo.

Vno deue dare ad vn altro in capo a due Anni, e mezo Scudi 350, ma perche il Padrone si troua necessità del suo Dennaro, promette di scontare al debitore 10 per 100. se di presente li sborsa la moneta: del che contentandosi, s'addimanda, quanto deue di ragione sborsare il debitore.

Primieramente vedasi, quanto meritano Scudi 100. in 2. Anni, e $\frac{1}{2}$ à 10 per 100. il che fatto, si troua, che fruttano scudi 25. i quali col suo capitale fanno 125. Dicasi poi così. Se 125, mi restano 100. che mi restaranno 350? Operando, restaranno Scudi 280. E tanti apunto ne douerà sborsare il debitore, ed hauerà sodisfatto per li scudi 350. (scontandone il Padrone 10. per 100.)

Que-

Quesito Secondo.

Vn'altro deue hauere da vn suo prossimo Lir 100. in termine di Mesi 4. ma se li sborsa il Denaro di presente: il creditore gli vuole scõtare Den. 3. per Lira al Mese. Hor s'addimanda. Quanto deue sborsare di ragione?

Questa si scioglie come la passata. Vedasi quãto frutti la Lira ne' 4. Mesi, à ragion di Den. 3. il Mese; qual frutto si troua esser sol. 1. siche 20. diuentano 21. meritãdo; mà scontando si dice: se soldi 21. restano 20. che resteranno Lir. 100? Operando resteranno Lir. 95. Sol. 4. Den. $9\frac{1}{2}$.

Quesito Terzo.

Vno deue hauere da vn altro scudi 300. con quest'ordine. Da quì ad vn Anno Scudi 100, e da quì a due Anni altri scudi 100 e da quì a trè Anni altri Scudi 100. Se di presente il debitore volesse sborsare tutti li scudi 300 il creditore vorria scontarli il 10. per 100. semplicemẽte. Se il debitore si risolue, quanto douerà sborsare?

Per il primo Anno bisogna dire. Se 110. era 100. che sarà 100? Ouero se 11. era 10. che sarà 100? Operando sarà 90 $\frac{10}{11}$. Per il secondo Anno si dice; se 120. era 100. che sarà 100? Sarà 83 $\frac{1}{3}$. E per il terzo Anno si dice pure; se 130 erano 100, quanto sarà 100, sarà 76 $\frac{11}{13}$ sõmando mò insieme queste trè partite, cioè 90 $\frac{10}{11}$. 83 $\frac{1}{3}$. e 76 $\frac{11}{13}$, s'haueranno scudi 251 $\frac{71}{429}$, e tanti a punto ne douerà sborsare &c.

Questa Regola del scontare, insegnata da gli Antichi Scrittori, ed approuata dalli Moderni, pare, che nõ quadri bene ad alcuni, ne restano del tutto sodisfatti, parendo loro, che si come nel meritare Scudi 100. diuentano (per esempio) 110, così nel scontare 100. douessero re-

star-

ſtar ſolamente 90. Ma certiſſimo la Regola è buoniſſima, & eſſi ſono in grand'errore: perche la proportione con la quale il Capitale creſce, con l'iſteſſa proportione deue calare; il che non ſi troua, operando ſecondo il lor poco ſapere. E' ben vero, che non rendendo la ragione, nè prouando detti Scrittori la predetta Regola con fondamenti ineſpugnabili, ſono cauſa, che li men dotti vacillino. Adunque, acciò niſſuno per l'auuenire poſſi più dubitare: quì voglio prouare la fedeltà di queſta Regola. Attenti alla proua.

Euclide, lib. 7. prop. 20. dice così. Se ſaranno trè numeri continui proportionali, il Prodotto del primo nel terzo ſarà ſempre eguale al Prodotto del ſecondo, moltiplicato in sè ſteſſo. (Seruino d'eſempio 2. 4. 8.) Queſti trè numeri ſono continui proportionali; perche vno contiene egualmente l'altro. Il ſecondo contiene due volte il primo, & il terzo contiene parimente due volte il ſecondo. Di più, moltiplicando il primo col terzo, ne produce 16, e 16 pure ne dà il ſecondo moltiplicato in sè ſteſſo. Ma notate di gratia, che per trè numeri continui proportionali non è neceſſario, che li numeri eſtremi ſiano diſtanti dal numero di mezo con eguali vnità: anzi quanto più creſce l'vno, tanto più cala l'altro. Si che, ſe il terzo numero, cioè l'8. foſſe 16. il primo doueria eſſer di neceſſità 1. ſolo, e ſtariano così 1. 4. 16. & haueriano parimente le douute ſudette conditioni. (Ma perche nella ſeconda parte faccio vn trattato delle Proportioni, non m'eſtendo più oltre: baſtandomi per il mio intento quanto di ſopra hò dichiarato) Ò veniamo alle proue di queſt'vltimo queſito.

Noi habbiamo detto, che li ſcudi 100. del primo Anno meritando ſi fanno 110, e ſcontando, reſtano ſolamente 90 $\frac{10}{11}$, ſi che habbiamo queſti trè numeri.

Ca-

Capitale scõtato	Puro Capitale	Capitale col guadagno.
Scudi 90 $\frac{10}{11}$	Scud. 100.	Scud. 110.
	100.	90 $\frac{10}{11}$.
	Scud. 10000.	9900-11-11000
		100. Scud. 100
		Scud. — 10000.

O vediamo vn poco se questi trè termini habbino le conditioni, che ricerca Eucl. Moltiplicando 90 $\frac{10}{11}$ con 110, ne produce 10000. Moltiplicando anco li Scudi 100 del Capitale in sè stesso, fanno pur 10000. Di più, diuidendo il 100 (termine di mezo) per 90. $\frac{10}{11}$ di Quotiente ne viene 1 $\frac{1}{10}$. E perche diuidendo il 110 (terzo termine) per 100, ne viene parimente 1. $\frac{1}{11}$. Adunque li trè termini, hauendo le douute conditioni, sono continui proportionali. Adunque la proportione che hà il meritare, la medesima hà il scontare. Però la Regola è buona.

Per li Scudi 100. *del secondo Anno.*

Capitale scontato	Puro Capit.	Capit. col guadagno.
Scud. 83. $\frac{1}{7}$	Scud. 100.	Scud. 120.

Moltiplicando il primo col terzo termine fà pur 10000. Di più, diuidendo 100 per 83. $\frac{1}{7}$, ne viene 1 $\frac{1}{7}$, & 1 $\frac{1}{7}$ ne viene anco diuidendo il 120. per 100. Aduuque la Regola è ottima.

Per li Scudi 100. *del terzo Anno.*

Capitale scõtato	Puro Capit.	Capit. col guadagno.
Scudi 76 $\frac{12}{17}$	Scud. 100.	Scud. 130.

Moltiplicãdo il primo col terzo termine fà pur 1000

Di

Di più, diuidendo 100 per $76\frac{12}{13}$ ne viene $1\frac{3}{10}$; & $1\frac{1}{3}$, ne viene anco diuidendo il 130 per 100. Adunque non si può negare la verità di questa Regola: poiche in tutti trè li proposti Anni vi si ritrouano le conditioni, ricercate da Euccl. cioè, che il Prodotto del primo nel terzo numero, è stato sempre eguale al Prodotto del secondo, moltiplicato in sè stesso: e di più in tutti trè gli Anni il terzo numero contiene tante volte il secondo, quanto che il secondo contiene il primo. (Conditioni, che non trouarete, se farete, che 100 resti 90.) Adunque la proportione, che si troua nel meritare, quell'istessa hà il scontare: perche si tocca con mani, che la proportione che hà il puro capitale col capitale, e guadagno: l'istessa hà il puro capitale col capitale scontato.

Addimando a quei, che sono di contraria opinione. S'vno mi douesse dare Scudi 100. da qui a 10. Anni, e sborsandoli di presente gli volessi scontare il 10. per 100, quanto mi doueria dare? Certissimo, che non mi doueria dare cosa alcuna: volendo, che Scudi 100. nel scontare restino solamente 90. (O vedete se hà del buono) Ma operando secondo la vera regola; li Scudi 100 in capo a 10. Anni meritando si fariano scudi 200, e scontando restariano solamente 50. E tanti ne deuo hauere. Fatene la proua.

Capitale scõtato	Puro Capit.	Capit. col guadagno.
Scud. 50.	Scudi 100.	Scudi 200.

Moltiplicando il 50 col 200, fà pure 10000. Di più si come il 100. contiene due volte il 50, così il 200. contiene due volte 100, Adunque &c.

Mi resta da rispondere ad vna difficoltà sopra questo preciso quesito per lettera fattami dal Sig. Francesco Manelli Faentino; huomo dotto, e stimatissimo, che poco fà pur lui ancora hà posto alla Stampa in materia di Geometria. La difficoltà è questa.

Se:

Se noi riduciamo quei trè termini di pagamenti ad vn sol termine; certo è, che (secondo l' insegnata Regola) in capo a due Anni il debitore saria tenuto di sborsare in vn sol sborso li scudi 300. Si che volendoli scontare, bisognarà dire. Se 120. resta 100, che restarà 300? Operando restarà 250. E tanti Scudi appunto doueria sborsare di presente il debitore. Il che non batte con l'altra operatione di scudi 251 $\frac{71}{489}$. E donde nasce questa differenza? Lo volete sapere? Attenti. Non hò detto Io, che in trè termini continui proportionali quanto più cresce vn termine estremo, tanto più cala l'altro? Hauete considerato, che il capitale scontato per li Scudi 100. del primo Anno sono restati 90 $\frac{10}{11}$. Quelli del secondo Anno 83 $\frac{1}{3}$, e quelli del terzo Anno solamente 76 $\frac{12}{11}$: nè per altro, se non perche per li primi Scudi 100 hauete detto. Se 110. resta 100, &c. Per li 100 del secondo Anno, se 120 resta 100 &c. e per il terzo Anno hauete detto. Se 130 resta 100, &c. Hora mò, quando voi riducete a pagare scudi 300. in capo a due Anni, si come v' obbligate a questi due termini. Se 120. resta 100, &c. così di necessità obbligate anco li scudi 300. all' altro termine in continua proportione di Scudi 83 $\frac{1}{3}$. Si che quei Scudi 100. del primo Anno, che scontati restauano 90 $\frac{10}{11}$, ridotti in capo alli due Anni, restano solamente 83 $\frac{1}{3}$. E quei 100 del terzo Anno, che prima erano solamente 76 $\frac{12}{11}$, anticipandoli vn Anno, si fanno pur loro 83 $\frac{1}{3}$. E questa è la causa del sbaglio.

O passiamo più auanti. La differenza di 83 $\frac{1}{3}$ a 90, è 7 $\frac{10}{11}$. La differenza da 76 $\frac{12}{11}$ a 83 $\frac{1}{3}$ è 6 $\frac{16}{18}$. Si che li scudi 100. del primo Anno ridotti al secondo Anno calano scudi 7 $\frac{10}{11}$, e li 100 del terzo Anno crescono solamente 6 $\frac{16}{18}$. Cauansi mò le differenze l'vna dall'altra; cioè 6 $\frac{16}{18}$ da 7 $\frac{10}{11}$, e ne restara $\frac{171}{198}$ d'aggiongersi alli Scudi 250;

che

che poi faranno 251 $\frac{17}{149}$, come per il primo modo. O ben che ne dite. La verità è sempre essa; basta il saperla trouare. Adunque non vi sia più alcuno, che dubiti della fedeltà di questa Regola, trouata da nostri Antichi: che quando la saprete maneggiare in qual si voglia modo, che sia, sempre vi dirà il vero.

MODO DI RIDVRE PIV' PAGAMENTI, Ad vn sol termine, ò pagamento.

CAP. XV.

Quesito Primo.

VVno cõpra vna Casa per il valore di Scudi 1200. con patto, & obbligatione di pagare in capo a 2. Anni scudi 700, e gli altri scudi 500. promette sborsarli immediatamente finiti li quattro Anni: ma per certe occorrenze accadute; concordemente le parti vorriano fare vn sol sborso di questi Scudi 1200, ma ad vn tempo, e termine tale, che di ragione non pregiudichi nè all'vno, nè all'altro. Hor s'addimanda; a che tempo, ò termine s'hà da fare tal pagamento?

In due modi si può questa, e simili questioni risoluere. La prima è questa. Vedasi quanto meritariano li Scudi 700. in quei 2. Anni, che hà tempo a pagarli a 10 per 100. (ò altro merito ad libitum.) Il che facendo; meritano scudi 140. Vedasi ancora quanto meritano gli altri Scudi 500. nelli 4 Anni. Il che facendo, fruttano Scudi 200. e questi sommandoli con gli altri 140, faranno tutti insieme 340. Dopo questo. Vedasi in quanto tempo tutta la massa de' scudi 1200. meritariano pure scudi 340. a 10 parimente per 100, del che facendone proua; li meritaranno in Anni 2, e Mesi 10. E così in termine di due Anni, e dieci Mesi sarà tenuto il debitore a pagarli li 1200. Scudi. E questa è la ragione, perche tanto meritano a qual si voglia merito li 1200. Scudi in due Anni, e dieci Mesi, quanto meritano li 700.

Scudi in due Anni, e gli altri 500. Scudi in 4. Anni.

Il secondo modo è più breue, più facile, & il più maestrale, & è questo. Siano mò quanti si vogliono li termini, ò le partite; che per hauer l'intento, basta a moltiplicare ciascuna partita, ò quantità di Scudi, di Lire, &c. col suo tempo, prescritto a pagarli. (conuertendo gli Anni in Mesi, quando co gli Anni vi siano Mesi: e li Mesi cõuertendoli in giorni, quando con li Mesi vi siano giorni) Fatto questo: si sommano tutti li sudetti Prodotti (che compositi di prezo, e di tempo si chiamano) e la somma diuidendosi subito per la somma di tutte le partite di Scudi, di Lire, &c. il Quotiente sarà il tempo cercato, nel quale sarà tenuto il debitore a sborsare la Moneta. Qui il tutto si vede chiaro per l'istesso quesito.

Scu. 700 suo termine di pag. An. 2. suo Prod. òCõp. 1400
Scu. 500. suo termine di pag. An. 4. suo Prod. òCõp. 2000

Diu. 1200. e sõma delle partite. Somma de Comp. 34100
12100 An. 2. $\frac{12}{1}$,

cioè 10. Mesi come per il primo modo. E questo secõdo modo è da praticarsi.

Quesito Secondo.

Vno deue dare ad vn altro
L. 50. hà tẽpo Mesi 7. Cõp. 350.
L. 10. hà tẽpo Mesi 9 —— 90.
L. 36. hà tẽpo Mesi 10. —— 360.

Diuisore 96. Somma de' Compositi 800. -- Quot. Mesi 8.
768.
(gior.
.32. Mesi da farsi in
30.
Diu. 96. - 960 - Quot. giorni 10.
96
..0

In

In capo a Mesi 8. giorni 10. sarà tenuto di pagare in vn sol sborso le Lir. 96.

Quesito Terzo.

Vno deue dare ad vn altro per certi interessi, ch'hanno insieme, li sottoscritti Denari; da pagarsi in diuersi tempi. Volendoli pagare tutti in vna sol volta; a che tempo di ragione douerà far tal sborso?

Scu. 123. adì 7. Gen. 1692. Mesi. Gior.
Scu. 184. adì 18. Lug. 1692. Differeza. 6 11. Per merito Sc. 9. L. 3. S. 0. D. 11.
Scu. 127. adì 16. Set. 1692. Differenza 8. 9. Per merito Scu 8. L 3 S 2 D. 8.
Scu. 368. adì 26. Mar. 1693. Differ. 14. 19. Per merito Sc 44 L 3. S. 10. D. 0.

Scu. 802. Scu. 63. L 1. Sol. 13. D. 7.

Per il primo modo questi quesiti si risoluono cosi. Per fondamento dell'operatione, si piglia la prima partita, cioè quella delli 7. di Gennaro 1692. Il che supposto; bisogna vedere la differenza del tempo, che si troua dalla prima partita a ciascun altro termine, ò partita. La qual differenza l'hò notata in mesi, e giorni. Dopo bisogna vedere, quanto meritano li Scudi di ciascuna partita in quel tempo, ò mesi della sua differenza a 10. per 100. all'Anno, (ouero a qual si voglia merito per maggior intelligenza l'hò notato nella propria partita. Fatto questo; si sommano le partite del debito, che fanno Scud. 802. Si sommano parimente tutti li meriti insieme, che sono Scudi 63. Lire 1. Sol. 13. Den. 7. (Vi saria vn rotto di Denaro, del quale non se ne fà conto; come anco per vn Anno, si pigliano solamente 360. giorni) Dopo tutto questo, bisogna mò vedere, in quanto tempo la somma delli Scu. 802. meritariano a 10. per 100 li sudetti Scudi 63. Lir. 1. Sol. 13. Den. 7. dal che facendone proua; gli meritariano, ò guadagnariano in Mesi 9. giorni 14. (lasciando da parte le minutie) Finalmente aggiongendo questi Mesi 9 giorni 14. al tem-

po della prima partita, cioè alli 7. di Genaro 1692. (oue s'è fondata l'operatione) il termine di questo aggregato arriuarà alli 21. d'Ottobre dell'istesso Anno 1692. Adunque alli 21. d'Ottobre 1692. si doueranno pagare le sudette quattro partite.

Ma volendo risoluere il quesito per il secondo modo; bisogna conuertire in giorni li Mesi della differenza. Il che fatto, si moltiplicano li giorni con li scudi della loro partita; e li Prodotti si sommano insieme; e questo vltimo auuenimento, si parte per la somma de' scudi delle quattro partite; che sono 802. e di Quotiente ne verranno 284. che saranno giorni; perche li composti parimente sono di Scudi, e di giorni. Conuertendo finalmente questi 284. giorni in mesi, ne vegono pure mesi 9. giorni 14. quali aggionti alli 7. di Gennaro, arriuaranno (come per l'altro modo) alli 21. d'Ott. 1692.

Scudi 123. adi 7. Gen. 1692.
Scudi 184. Differ. gior. 191. Suo comp. 35144.
Scudi 127. Differ. gior. 249. Suo comp. 31623.
Scudi 368. Differ. gior. 439. Suo cõp. 161552.

Scudi 802. Diu. 802 - 228319 - Quot. gior. (2814 $\frac{551}{802}$.
160

.6791. G. 310 - 9. Mes. (G. 14 $\frac{551}{802}$.
6416.

3759.
3208.

.551.

Di quel rotto di giorno $\frac{551}{802}$, non se ne tien conto. Ma chi volesse vedere il pello nell'vouo, lariano mesi 9. giorni 14. hor. 16, min. 29, e $\frac{262}{802}$ di minuto. La prima partita non

non forma composto: perche non hà differenza di tempo, essendo essa il fondamento dell'operatione. Hò posto parimente due modi d'operare: acciò vno testifichi la verità dell'altro.

COME SI TIRI IN RESTO,

Sì in tempo, come in Denari vna ragione di due, ouero più partite di meriti, ò altro simile.

CAP. XVI.

QVei, che si esercitano in dare, ò riceuere à Censo, se spesso non saldano le partite in vn sol resto; à longo andare, si trouaranno molto confusi, & imbrogliati: ma perche si suol dire, patto chiaro, & amicitia longa, però qui s'insegna il modo di saldare dette partite. Alla pratica.

Quesito Primo.

Vno compra vna Possessione l'Anno 1692. qual mota Scudi 4530. nel qual contratto costui sborsa scudi 2000. con obligarsi a pagare gli altri Scudi 2530. à 25. di Marzo l'Anno 1697. e se à tal tempo non potesse pagarli per qualche accidente; s'offerisce di pagarli di merito 13. per 100. all'Anno, per tutto il tempo, che oltre il detto termine, tardarà a sborsarli li sudetti scudi 2530 con patto però; che se occorresse sborsarne qualche parte auanti detto termine; ch'ancor lui il venditore sia tenuto a rifarli tal tempo nel restante; cioè allongarli il detto termine alla rata de' Denari, che li darà; e del tempo in che li darà, del che contentandosi il venditore del-

la Possessione, ne fanno scrittura. Hora mò accade, che alli 29. di Settembre 1694. il Compratore sborsa altri Scudi 1000. al Venditore. S'addimanda. In qual giorno sarà tenuto a pagare il resto, cioè scudi 1530?

Questo, e simili quesiti si mettono in chiaro così. Vedasi quanto tempo prima del patto il Compratore paghi quei 1000. Scudi. Chiara cosa è, che li paga prima del termine assegnato 2. Anni 5. Mesi, e 26. giorni. Hora mò vedasi quanto meritano li 1000. scudi sborsati in questi Anni 2, Mesi 5, e giorni 26 Il che fatto; si troua, che meritano scudi 252. Lir. 0. Sol. 17. Din. 9 $\frac{1}{2}$. a 10. per 100. (se bene si potria pigliare, che merito si vuole per 100) Doppo questo, bisogna anco vedere in quanto tempo, a 10. per 100. li restanti Scudi 1530. guadagnariano li sudetti scudi 252 $\frac{1}{2}$. (che tanto a puntino sono quei sol. 17. Din. 9. ^{1}) del che facendone proua, li guadagnariano in Anni 1 Mesi 7. e giorni 15. (lasciando il rotto de' giorni) e tanto appunto deue allongarsi il termine; cioè alli 25 di Marzo 1697. bisogna aggiongerui quell'Anno 1. Mesi 7. e giorni 15. Il che facendo, s'arriuarà alli 10. di Nouembre 1698. Adunque si conclude, che il Compratore, deue pagare li restati scudi 1530. alli 10. di Nouembre 1698 E se nō paga, per l'auuenire sarà tenuto pagare di merito 13. per 100. in risguardo solamente à quei scudi 1530. che resta debitore: come sono d'accordo.

Ma più presto, e con manco limamento di ceruello s'haurà l'intento così Moltiplica gli Anni 2. Mesi 5. e giorni 26 (fatti tutti in giorni) con li scudi 1000. e di Prodotto ne verrà 896000, e questo partito per li scudi 1530. che resta debitore, ne riusciranno 585 giorni, che fatti in Anni, e Mesi, ne risultano pure Anni 1. Mesi 7. e giorni 15. (come per l'altro) E poi s'aggionge, & opera come sopra, &c. Di questo rotto $\frac{95}{153}$, non se ne tien conto.

Diu,

Diu. 1530--896000-- Quot.gior.585.$\frac{95}{153}$.
7650 . .Anno 360 -- 360.Quot.Ann.1.

13100 Mele 30. -- 225 -- Quot.Meſ.7.
12246 210

. 8600 15 — Gior.
7560

750

Queſito Secondo.

Queſt'Anno 1692. a'24. di Febraro, vno piglia da vn ſuo amico ſcudi 800, a pagarli 6. per 100. all'Anno con patto però di poterli reſtituire in tutto, ò in parte ogni volta, che v'habbia commodo. (per diminuire l'intereſſe) Occorre, che a'18. di Luglio del medeſimo Anno ne ritorna indietro 300. ſenza pagarli però li frutti corriſpondenti alli 4. Meſi, e 24. giorni, che hà tenuto li 300. Scudi nelle mani. Hor s'addimanda, à che tempo hà da sborſare gli altri 500. Scudi, acciò con eſſi il Creditore ſi rimborſi del merito, ò frutti delli Scudi 300, che l'altro li tornò indietro?

Queſto queſito ſi riſolue come il paſſato, ſe bene è tutto contrario: perche in quello, hauendo sborſato 1000. Scudi prima del tempo conuiene slongare il termine, per la paga de gli altri; ma quì conuerrà tirarlo indietro: acciò il Creditore ſi rinfranchi cõ li 500. ſcudi del frutto delli ritornati 300. ſcudi. Adunque ſi fà così per il primo modo. Vedaſi quanto meritano li ſcudi 300. in quei Meſi 4. e giorni 24, che gl'hà tenuto in mano. Meritano ſcudi 7 $\frac{1}{7}$, cioè ſol. 16. Vedaſi parimente in quanto tempo li ſcudi 500. meritariano li medeſimi ſcudi 7 $\frac{1}{7}$. Per ſapere lo, prima ſi moltiplicano li ſcudi 300.

con li Mesi $4\frac{2}{5}$, e daranno questo composto 7200 di Mesi, e di scudi. Dopo questo, bisogna dire. Se scudi $7\frac{1}{5}$. vengono dal composto 7200. da che composto verranno Scudi 7, & $\frac{1}{5}$? In simili occorrenze, perche il primo, ed il terzo termine sono di quantità eguali, dopo l'hauer faticato, ne tornaria pur l'istesso composto 7200, però serui d'auuiso, che basta à partire quel primo composto, prima per 5. (per rispetto d'hauer conuertiti li Mesi $4\frac{2}{5}$, tutti in quinti) e verrà 1440, e sarà mò vn composto di mesi intieri, e di scudi. Finalmente diuidendo questo composto 1440. per il componente cognito, cioé per li scudi 500. di Quotiente ne verranno mesi 2, giorni $26\frac{2}{5}$, ed in tanto tempo appunto li scudi 500. guadagnaranno scudi $7\frac{1}{5}$. Finalmente sottratti questi due mesi, e giorni 26. (lasciando andare li $\frac{2}{5}$) dalli 24 di Febraro 1692. tornando all'indietro, s'arriuarà alli 28. di Nouembre 1691. Ed in questo giorno appunto il Debitore douerà pagare li scudi 500. con li loro frutti, e così sarà saldata la partita si in tempo, come in Denari.

Ma volendola risoluere per il secondo modo (sempre più facile) basta a moltiplicar li Scudi 300. con li mesi $4\frac{2}{5}$, e ne verrà questo composto di Scudi, e mesi 1440, qual partito per li scudi 500: ne verrano mesi 2, giorni $26\frac{2}{5}$. si come per l'altro modo; e poi nel resto s'opera come sopra, stracciando la prima scrittura, fatta sotto li 24. di Febraro 1692.

Se Vno sborsasse in più volte quantità di Denari, auanti, ò dopo il tempo, si meritano tutte le partite, e poi si slonga, ò s'accelera il tempo per il pagamento del residuo: quanto staria esso residuo a meritare quello hanno meritato quelle partite tutte insieme. Non porto esempio per fuggire la longhezza. Da passati esempi, bene intesi, s'imparará &c.

DEL

Del Meritare, e Scontare à capo d'Anno detto frutto, de frutti, ouero Vsura.

CAP. XVII.

SE bene frà Christiani sono prohibiti, nè per alcun modo si deuono fare contratti vsurarj: tuttauia la scienza virtuosa è sempre laudabile. Meritare a capo d'Anno non è altro, che dare, ò riceuere quantità di Denari, a pagare vn tanto per 100. all'Anno, e se non si paga in capo all'Anno, l'Anno seguente si sia tenuto a pagare non solamente li frutti del capitale; ma anco li frutti del frutto dell'Anno passato: (però proportionalmente.) Per esempio, Se vno pigliasse scudi 100. à 10. per 100. all'Anno, e far a capo d'Anno; se'l primo Anno nó pagasse quel tale li Scudi 10, meritati dalli Scudi 100 l'Anno seguente ne doueria pagare 21. Vinti per il capitale, & 1 per frutto di quel 10. Scudi, che per frutto doueua pagare. L'Anno terzo ne doueria pagare $33\frac{1}{10}$. L'Anno quarto $46\frac{41}{100}$, &c. O veniamo alla pratica.

Quesito Primo.

Vno piglia impresto Scudi 500. a pagarli a capo d'Anno 10 per 100 all'Anno, e costui gli tiene Anni 3. senza pagarli mai frutto alcuno. S'addimanda, in capo a questi Anni 3 quanto sarà tenuto di pagare?

In più modi si possono risoluere simili quesiti, ma questo sia il primo. Già sappiamo, che scud. 100. meritando, ò fruttando in capo ad vn Anno di 100 diuentano 110. Hora nel caso nostro diciamo così. Se 100. diuentano 110, che mi diuentaranno 500, diuentaranno 550.

Per

Per il secondo Anno si dice. Se 100. mi diuenta 110, che diuentaranno 550? Diuentaranno 605. Finalmente per il terzo Anno si dice. Se 100. mi dà 110, quanto mi daranno 605? Daranno scud. 665 $\frac{1}{2}$. e tanto appunto douerà pagare quell'amico frà merito, e capitale, e merito di merito per li scudi 500. pigliati impresto.

Secondo modo.

Si potria anco schisare per 10 il 100, ed il 110. e ne veria 10. e poi opera con questo 10, & 11, come s'è operato di sopra col 100. e 110 dicendo cosi. Se 10. mi da 11. che mi darà 500? Operando s'hauranno pure in capo a 3. Anni scudi 665 $\frac{1}{2}$.

Terzo modo.

Ne potria anco far cosi. Moltiplicar tre volte il 500 per 11. e ne veranno 665500, il quale diuiso per la moltiplicatione del 10. tre volte, che sono 1000. ne veranno pure scudi 665 $\frac{500}{1000}$, cioè $\frac{1}{2}$. Dico tre volte perche tre sono gli Anni, che gode li scudi 500 Tante volte si fanno le moltiplicationi, quanti sono gli Anni &c.

Quarto modo.

Quando il merito è parte del 100. come nel caso nostro, che a 10. per 100. ne viene per merito $\frac{1}{10}$ del suo capitale, si può far cosi. Diuidansi li scudi 500 per 10. e ne veranno 50, e questi gionti col 500. fanno 550. per il primo Anno. Per il secondo Anno mò diuidansi per 10. questi scudi 550. e ne verranno 55. che congionti con li 550, fanno scudi 605. Finalmente diuidansi li scudi 605 per 10, e ne veranno 60 $\frac{1}{10}$, quali vniti con li [illegible]. per il terzo Anno, saranno come sopra scudi 665 [illegible] cioè $\frac{1}{2}$.

Quin-

Quinto modo.

Vltimamẽte si potria ancor far cosi. Meritare 100 scudi per trè Anni (ò per quanto tempo occorre secondo la proposta) che nel caso nostro ne verriano $133\frac{1}{10}$, e poi dire. Se 100. mi danno $133\frac{1}{10}$, che mi daranno 500. Daranno pure, come per gl'altri modi, scudi 665. $\frac{50}{100}$, cioè $\frac{1}{2}$.

Scontare.

Il scontare a capo d'Anno è vn atto contrario all'istesso meritare à capo d'Anno, e questo è tanto differẽte dal scontare semplicemente, quanto è differente il meritare a capo d'Anno, dal meritare semplicemente. Per tutti quei modi, che si può meritare a capo d'Anno per gl'istessi si può anco scontare. Possedendo bene il precedente quesito, è sua risolutione s'arriuarà al punto.

DELLE COMPAGNIE.

CAP. XVIII.

LA natura del mercantare in compagnia è questa: che concorrendo più persone con varij capitali al trafficare, tutti parimente si sottopongono tanto al guadagno, quanto alla perdita, non egualmente, ma alla rata portione del capitale, che ciascuno vi hà posto. Alla pratica.

Quesito Primo.

Tre Mercanti fanno compagnia. Il primo vi mette scudi 235, il secõdo scudi 430, ed il terzo vi mette scudi 500. Finito il negotio si trouano hauer guadagnato sopra il capitale 515. hor s'addimãda, quanto toccarà per ciascu-

ciascuno à proportione del capitale, posto da principio?

Questi quesiti facilissimamente si risoluono per la Regola del trè, tante volte replicata, quante sono le persone della compagnia cosi. Si sommano insieme le trè partite del capitale, che fanno scudi 1165, e perche questo corpo di tutto il capitale hà guadagnato li scudi 515, si dice. Se scudi 1165. hanno guadagnato Scudi 515. Di questi, quanti n'haueranno guadagnati, li scudi 235 del primo Mercante? Operando al solito, li toccaranno scud. 103. lir. 3. sol. 10. den. 8 $\frac{176}{233}$. Dipoi si dice. Se 1165. guadagnorono 515. Di questi quanti n'haueranno guadagnati li scud. 430. del secondo Mercante? Ne guadagnorno scud. 190 lir. 0. sol. 6. den. 10. $\frac{94}{233}$. Finalmente si dice. Se 1165. guadagnorno 515 Di questi quanti ne guadagnorno li scudi 500. del terzo Mercante? Ne guadagnorno Scudi 221. Lir. 0. Sol. 2. Den. 4 $\frac{196}{233}$. E che sia il vero, sommando insieme ciascun guadagno di questi trè mercanti, faranno pure scud. 515. E così s'opera, se fossero bene 50. Compagni.

In quel modo, che si parte il solo guadagno: nell'istesso si partiria anco il guadagno, e capitale insieme.

Se occorresse perdere in cambio di guadagnare, s'opera pur nell'istesso modo. Per esempio. Se li sudetti trè Mercanti hauessero perso 150. Scudi, si diria così. Se Scudi 1165. hanno perso Scudi 150. Quanti n'haueranno perso li Scudi 235. del primo Mercante, e così si farà per altri gli due. Ouero operarà con la massa della perdita, e capitale.

Quesito Secondo.

Vno deue dare, & è debitore a trè persone. Al primo deue dar scudi 205. Al secondo scudi 436. & al terzo deue dar scudi 180. Occorre, che costui muore, ò si và con Dio, nè si troua hauer più; che per scudi 480. S'addimanda. Quanto deue toccare à ciascun creditore?

Ope-

Operando, come sopra. Al primo toccaranno Scudi 119 $\frac{701}{1}$, Al secondo 254 $\frac{746}{821}$: e al terzo 105 $\frac{195}{821}$.

Quesito Terzo.

Trè fanno compagnia. Il primo mette Scudi 100, Il secondo Scudi 200; & il terzo vi mette 20. Moggia di Formento: & hauendo guadagnato Scudi 400. al primo toccorno Scud. 66. $\frac{2}{3}$; al secondo 133 $\frac{1}{3}$; & al terzo toccorno Sc. 200. Hora mò questo terzo compagno vorria sapere, quanto li fù prezato il Formento per Moggio.

Si fà così, e si dice. Se Scudi 66 $\frac{2}{3}$ di guadagno vengono da Scudi 100 di capitale, Scud. 200 pur di guadagno, da che capitale vennero? Vennero da Scud. 300. di capitale, e tanto valsero le 20. Moggia di Grano; (che viene ad essere Scudi 15. per Moggio.) L'istesso verrà a farne la proua per il guadagno, e capitale del secondo compagno.

Quesito Quarto.

Trè altri compagni hanno guadagnato Lir. 460. Il primo pose nella Compagnia Lir. 380 Il secondo Lir. 420. & il terzo tanto pose, che dal guadagno li toccorno Lir. 200. S'addimanda, che toccò a gli altri due: e che pose il terzo compagno?

Per sapere quanto pose il terzo, si fà così. Sottraganfi Lire 200. dalle Lir. 460. guadagnate: e ne restano Lir. 260. (guadagno degli altri due; li capitali de' quali vniti insieme sono Lir. 800.) Dicasi poi così. Se Lir. 260. di guadagno vengono da Lir. 800. di capitale. Da che capitale verranno Lir. 200. pur di guadagno? Operando, si troua, che vengono da Lir. 615. Sol. 7. Den 8. $\frac{4}{13}$; E tanto pose il terzo. Per saper mò quanto toccò a gli altri due in particolare di quelle Lir. 260. si dice per la Regola ordinaria delle compagnie; Se Lir. 800 hanno

gua-

guadagnato Lir. 260, che toccacarà a Lir. 380. e che toccarà a Lir. 420? Operando, toccaranno Lir. 123. Sol. 10. al primo; & al secondo Lir. 136. sol. 10.

Quesito Quinto.

Trè persone si trouano a mangiare insieme all'Osteria, vn Spagnuolo, vn Francese, & vn Italiano. Finita la cena. Il Spagnuolo dice, Io voglio pagare il doppio del Francese; & il Francese dice; & Io voglio pagare il doppio dell'Italiano: e l'Oste deue hauere sol. 56. S'addimanda. Quanto pagarà ciascuno di loro?

In questo, e simili quesiti bisogna imaginarsi per capitale dell'Italiano 1. Per capitale del Francese 2; e per capitale del Spagnuolo 4; li quali vniti insieme fano 7. Di poi per la Regola commune si dice. Se 7. paga 56. che pagarà 4 del Spagnuolo; 2. del Francese; & 1. dell'Italiano? Operando, al Spagnuolo tocca il pagare sol. 32. al Francese 16; & all'Italiano 8. solamente.

Quesito Sesto.

Trè fanno compagnia: Mà, ò perche vno ponesse più dell'altro nel negotio; ò per altri fini occulti; non si sà, quanto ciascuno v'habbia di capitale: appariscе solamente per scrittura, che il primo habbia la metà di quello, che tocca al secondo; & il secondo la quarta parte di quello, che tocca al terzo. Nel fine del negotio si trouano hauer guadagnati scudi 120. Quanti ne toccano a ciascun di loro?

In questo, e simili quesiti bisogna trouare trè numeri (*ad libitum*) che il minimo sia la metà del mezano; e che il mezano sia la quarta parte del maggiore: (& Io per il presente quesito piglio questi trè, cioè 2. 4. 16. li quali sommati insieme fanno 22.) Di poi per il modo commune si dice. Se 22. mi guadagna 120. ch' hauerà guadagnato 2. per il primo? e 4 per il secondo? e che

16.

16. per il terzo? Operando, al primo toccano Scudi 10. $\frac{10}{11}$. Al secondo 21. $\frac{9}{11}$. Et al terzo toccano Scud. 87. $\frac{3}{11}$. E se ne faremo la proua, la trouaremo buona; non solo, perche vnite insieme le trè partite faranno Scudi 120, ma anco perche la prima partita sarà la metà della seconda: e la seconda sarà la quarta parte della terza. Il che si deue bene auuertire per casi simili.

Quesito Settimo.

Trè altri hanno pur guadagnato Scudi 500, e frà loro sono d'accordo, che il primo n'habbia la metà; Il secondo vn terzo; Et il terzo n'habbia solamente $\frac{2}{4}$. Hor s'addimanda; quanti Scudi toccaranno a ciascuno?

Prima di rispondere, bisogna sapere, che questo, e simili quesiti non si possono risoluere, come sono proposti: perche, se di questi Scudi 500. il primo ne pigliasse 250 per la metà; e l'altro ne pigliasse 166 $\frac{2}{3}$ per vn terzo; non vi restariano poi Scud. 125. per vn quarto del terzo compagno; anzi a questo li mancariano Scudi 41. $\frac{2}{3}$. A. dunque, acciò tutto l'errore non caschi sopra d'vn solo: ma tutti li compagni concorrino proportionalmente al mancamento (come vuole la ragione) si fà così. Si pigliano per capitale quella metà, quel $\frac{1}{3}$, e quel $\frac{1}{4}$ de guadagnati Scudi 500, che vniti insieme sono Scud. 541. $\frac{2}{3}$. Dipoi per la Regola commune si dice. Se Scud. 541 $\frac{1}{3}$ guadagnorno Scudi 500. Quanti ne toccano a 250 del primo? Quanti à 166 $\frac{2}{3}$ del secondo? E quanti a 125. del terzo compagno? Operando, al primo toccano Scud. 230 $\frac{10}{13}$; al secondo 153 $\frac{11}{13}$, & al terzo 115 $\frac{5}{13}$. E che sia il vero; sommando insieme quel che tocca a ciascuno fà pure Scud. 500. Anzi dupplicando quel 230 $\frac{10}{13}$, che per la metà toccò al primo, fà 461. $\frac{7}{13}$; (del qual numero li Scudi 153 $\frac{11}{13}$ del secondo sono $\frac{1}{3}$; e li 115 $\frac{5}{13}$ del terzo sono $\frac{1}{4}$) Adunque il primo hà la metà, il secondo

hà

hà, $\frac{1}{3}$; & il terzo hà $\frac{1}{4}$, come sono d'accordo.

Quesito Ottauo.

Vno fà testamento, e lascia per il valore di Scu. 120, con quest' ordine: che vn suo figliuolo n'habbia la metà; Vn suo Nepote $\frac{1}{3}$; Et vna sua Nepote n'habbia solamente $\frac{1}{4}$. Ma perche il buon Vecchio non s'intende de'numeri, & il Notaio scriue, come gli vien dettato; nè l'vno, nè l'altro s'accorge, che questo testamento non si può esequire, come canta: e così se ne muore il buon Vecchiarello. Hor s'addimanda. Quanto deue hauere ciascuno di ragione?

Questo quesito è in tutto, e per tutto simile al passato, e però si risolue, come si fece quello. Anzi qui voglio insegnare vn altro modo più maestrale, e che porta manco fattura, per suiluppare il passato, il presente, e qual si voglia simile quesito: & è questo. Trouasi primieramente per la Regola dell'Accattare vn Numero, c'habbia le parti di $\frac{1}{2}$, di $\frac{1}{3}$, e di $\frac{1}{4}$, che nel caso nostro per il minimo sarà 12. Secondo, di questo 12 per la metà se ne piglia 6; per $\frac{1}{3}$ se ne piglia 4; e per $\frac{1}{4}$ se ne piglia 3. Adunque questo 6. 4. 3. sono come capitale, che vniti insieme fanno 13. E poi per la Regola commune si dice: Se 13 guadagna 120, che guadagnarà, ò toccarà a 6, a 4, & a 3? Operando, al 6. del primo toccaranno Scud. 55 $\frac{5}{13}$. Al 4. del secondo 36 $\frac{12}{13}$. Et al 3. del terzo toccaranno Scud. 27 $\frac{9}{13}$; La proua come la passata. (Non ti partì da questo modo col quale si scansano li rotti.

Quesito Nono.

Vn altro per occasione pur di morte lascia parimente per testamento Scud. 120, e vuole, che la sua Donna di gouerno n'habbia $\frac{1}{2}$, vn suo seruitore $\frac{1}{4}$, & $\frac{1}{5}$ si dia a poueri. S'addimanda. Quanto tocca di ragione a ciascuno?

Questo quesito è contrario alli due passati; perche in quel-

quelli, se il primo, & il secondo hauessero pigliato la metà, & vn terzo: non vi restaua il quarto per il terzo compagno: ma in questo, e simili quesiti dopo ch'ognuno de'trè hà pigliato quello gli viene lasciato: vi sopranauanzano anco Scudi 26. e perche ognuno di loro li vorriano, ne salta in piedi vna gran lite. Ma per acquietare il rumore; s'opera in tutto, e per tutto, come ne due passati esempij: che per esser chiaro, non replico altro; se non che alla Donna di gouerno toccano Scudi 51 $\frac{5}{47}$. Al seruitore 38 $\frac{14}{47}$. Et a poueri 30 $\frac{30}{47}$.

Quesito Decimo.

Vn Gentilhuomo viene a morte; e facendo testamento lascia il valore di Scudi 14000, e la moglie grauida con queste conditioni. Se fà vn maschio, due terzi della robba deue hauere il figlio, & vn terzo la madre. Se fà vna femina, due terzi alla madre, & vn terzo alla femina; Ma che? La fortuna porta, che la moglie fà vn maschio, & vna femina; Quanto toccarà di ragione a ciascuno secondo la mente del Padre?

In questo, e simili quesiti sempre bisogna hauer l'occhio all'intentione del Padre, la quale nel nostro caso è che il figlio habbia il doppio della madre; e la madre il doppio della figlia. Siche la figlia deue hauere 1. La madre 2, & il figlio 4; che vniti insieme fanno 7, e poi si dice: Se 7. hà da partire scudi 14000. Quanti ne toccarà al 4. del figlio? Quanti al 2. della madre? E quanti all' 1. della figlia? Operando, come si fà nelle compagnie. Al figlio toccano Scud. 8000. Alla madre 4000. Et alla figlia 2000. (Or torniamo alle compagnie mercantesche.)

Quesito Vndecimo.

Tre cõpagni fanno compagnia; Vno pose nel negotio scudi 160. e stette nella compagnia Mesi 6. Il secondo pose scu. 200. e vi stete mesi 4. & il terzo vi pose scu.

90. e durò nella compagnia vn Anno intiero: in capo del quale si trouorno hauer guadagnato Scudi 150. S'addimanda. Quanto toccarà a ciascuno di ragione?

Per far questa, e simili ragioni si moltiplicano li Scudi di ciascun compagno, con li Mesi proprij, ne' quali s'è trattenuto nella compagnia; e quel composto di Scudi, e di Mesi sarà il loro capitale. Si che nel caso nostro il composto del primo compagno sarà 960. Quello del secondo sarà 800. E quello del terzo sarà 1080, che uniti insieme, fanno in tutto vn composto di 2840. Di poi per la Regola commune si dice. Se 2840. hà guadagnato Scudi 150, quanti ne toccarà a 960. del primo, a 800. del secondo; & a 1080. del terzo compagno? Operando; al primo toccaranno Scudi $50\frac{30}{71}$; al secondo $42\frac{18}{71}$; & al terzo $57\frac{3}{71}$.

Quesito Duodecimo.

Trè altri fanno compagnia per spatio di due Anni, e guadagnorono scu. 350. Il primo mise scu. 180. e dopo 6. Mesi per certo suo bisogno leuò dalla compagnia scu. 40. Il secondo mise scu. 205, e dopo Mesi 9. leuò scudi 30, & il terzo mise scudi 290, & in capo al primo Anno leuò ancor lui scudi 90. Hor s'addimanda. Nel partire il guadagno; quanto toccarà a ciascun di loro?

Per prima operatione si moltiplica il capitale di ciascuno con li 24. Mesi, che durò la compagnia; si che il cõposto del primo sarà 4320. Quello del secondo 4920, e quello del terzo 6960 Per seconda operatione bisogna moltiplicare quei Scudi, che ciascuno leuò dalla cõpagnia, con li Mesi, che l'istessa compagnia stette senza di essi; & il Prodotto di ciascuno sottrarlo dal proprio cõposto (detto di sopra,) e quello, che restarà, sarà il cõposto germano, per risoluere il quesito. Il che fatto; per il primo resta vn composto di 3600. Per il secondo di 4470, e per il terzo di 5880. quali sommati insieme, fan-

no

no 13950. Dipoi si dice al solito. Se 13950. hà da partire scudi 350 Quanti ne toccarà a 3600. del primo: Quanti a 4470 del secondo: E quanti hà 5880. del terzo compagno? Operando, al primo toccaranno scudi 90 $\frac{30}{31}$. Al secondo 112 $\frac{14}{31}$. Et al terzo 147 $\frac{29}{31}$. Fanne la proua, e la trouarai buona. Ma qui bisogna auuertire: che se oltre a Mesi vi fossero giorni; bisognaria in tal caso conuertire ogni cosa in giorni; e poi fare le sopradette moltiplicationi.

Si potria anco far così, (& è più chiaro) Si moltiplichi ogni quantità del capitale con li mesi, che di mano in mano restò incõparato nella compagnia; e li Prodotti s'vnischino insieme. Per esempio. Nel precedente quesito il primo compagno pose nella compagnia Scudi 180, e dopo 6. mesi leuò 40. si che per mesi 6 la compagnia hebbe il beneficio di tutti li scudi 180. e per mesi 18, hebbe l'vtile solo di 140. Hora mò dico; che si moltiplichino li scudi 180. con li mesi 6, e li scudi 140. con li mesi 18, e s'haueranno questi due compositi 1080. e 2520. quali vniti insieme, s'haurà vn cõposto di 3600. per il primo compagno; come per l'altro modo. Con l'istesso ordine si troui il cõposto vero, e reale de gli altri due cõpagni. (Anzi questo medemo ordine si tiene, ogni volta, che qual si voglia compagno leuasse, ouero aggiongesse; & anco se leuasse, e poi aggiongesse quanto li piace.)

Quesito Terzodecimo.

Due fanno compagnia per vn Anno solamente, e per capitale ciascuno di loro pose in essa scu. 10000. e guadagnorno scu. 5000. Il primo compagno stette sodo col capitale; mà il secondo, vn mese, e mezo dopo l'hauer cominciato il negotio, leuò dalla compagnia scu. 1000. Trè mesi dopo ne leuò altri 500. Ma dopo quattro mesi ne incorporò nella compagnia 800. S'addimanda. Nel

partire, che faranno il guadagno; quanto toccarà a ciaſcuno?

Si può operare per qual ſi voglia de' due modi, inſegnati di ſopra. Mà qui metto in figura l'operatione del ſecondo compagno, per il ſecondo modo inſegnato.

Meſi 1 $\frac{1}{2}$ con Scud 10.000. fà vn compoſto di 15. 000.
Meſi 1 $\frac{1}{2}$ con Scud. 9. 000. fà vn compoſto di 13. 500.
Meſi 1 $\frac{2}{3}$ con Scud. 8. 500. fà vn compoſto di 14. 166 $\frac{2}{3}$
Meſi 7. $\frac{1}{3}$ con Scud. 9. 300. fà vn compoſto di 68. 200.

Compoſto del ſecondo compagno 110,866. $\frac{2}{3}$

Per hauere il compoſto del primo compagno, ſi moltiplicano li Scu. 10-000. con li Meſi 12, e s'hauerà —— 102. 000.

Somma de compoſti 230. 866 $\frac{2}{3}$

Si dice mò; Se 230. 866 $\frac{2}{3}$ hà da partire ſcudi 5000, quanti ne tocca à 120. 000. Operando, li tocca ſcudi 2598. $\frac{3126}{3463}$; & al ſecondo 2401. $\frac{337}{3463}$.

Queſito Quartodecimo.

Trè compagni fanno compagnia. Il primo vi poſe ſcudi 800. per Meſi 6. Il ſecondo ſtette nella compagnia meſi 8, & il terzo meſi 10. nè ſi sà preciſamente il loro capitale: ben sì guadagnorno frà tutti trè ſcud. 2100. Quanto toccò a ciaſcuno del guadagno: e quanto fù il capitale del ſecondo, e terzo compagno?

Queſto, e ſimili queſiti facilisſimamente ſi riſoluono così. Per ſapere il capitale del ſecondo, e terzo compagno; ſi moltiplica il capitale del primo compagno per li meſi 6, che ſtette nella compagnia, & il Prodotto 4800 diuiſo ſeparatamente per li meſi del ſecondo, e terzo compagno, di Quotiente s'haueranno ſcud. 600. per il capitale del ſecondo: e ſcu. 480. per il capitale del terzo. Quanto poi al guadagno di ciaſcuno baſta a partire

in

in tre parti eguali li scud. 2100. siche a ciascun cõpagno toccaranno scud. 700. Per farne la proua basta à multiplicar li Mesi di ciascun compagno con li scudi del suo capitale, e ne veranno questi tre composti eguali 4800. 4800. 4800. quali sommati insieme fanno 14400. Di poi si dice. Se 14400 hà da partire scud. 2100. quanti ne tocca a 4800. Operando gli trouarà scud. 700. Però stà bene.

Quesito Quintodecimo.

Vno si mette a far Bottega di varie cose, e al principio di quest'Anno spende Lir. 800. per rinfranco della Bottega. Occorre, che vn suo amico vorrebbe incorporare ancor lui nella Bottega Lir 1200, mà in tempo tale, che in capo all'Anno hauessero da partire, e gli toccasse precisamente la metà di tutto il guadagno. S'addimanda. A che tempo deue mettere nella compagnia le Lir. 1200?

Si fà così. Moltiplica le Lir. 800. del primo cõ li Mesi 12. di tutto l'Anno, e faranno 9600, e questo Prodotto parti per le Lir. 1200, che vuol mettere l'altro, e ne verrà di Quotiente 8. E così 8. Mesi auanti, che finischi l'Anno cioè al principio di Maggio douerà impiegar le Lir. 1200.

Quesito Sestodecimo.

Vn altro pure al principio di quest'Anno spende Lir 800. e dopo 3. Mesi vn suo amico, lo prega a pigliarlo nella cõpagnia dell'Oglio, che pretende di mercantare. Il che facendo, promette di sborsare tanti Denari, che in capo dell'Anno hauessanno da partir il guadagno egualmente per metà. S'addimanda, quanto hà da sborsar l'amico?

Questo è tutto contrario al passato. Fà così. Moltiplica le Lir 800 del primo con li Mesi 12 dell'Anno, e ne verrà 9600, il qual Prodotto diuiso per li Mesi 9, che l'altro deue stare nella compagnia, ne verrà di Quotiente 1066 $\frac{2}{3}$, e così l'amico deue sborsare Lir 1066 $\frac{2}{3}$.

Quesito Decimosettimo.

Tre fanno compagnia, nella quale egualmente hanno posto vn tanto per vno di capitale. Vero è, che il primo vuole, che il suo capitale li guadagni 24. per 100. (essendo stato lui, ch'hà trouato il guadagno.) Il secondo si contenta à ragione di 16. per 100, ma il terzo (per esser vn pouerazzo di poca habilità,) si contentò, che il suo capitale guadagnasse solamente a ragione di 10 per 100. Costoro guadagnorono scudi 3600. S'addimanda. Quanto tocca a ciascuno?

Fà così. Somma insieme quel 10. 16. 24. che per 100 pretende ciascuno, e fanno 50. Dicasi poi. Se 50. hà da spartire scud. 3600, quanti ne toccarà a 24. a 16. & a 10? Operando al solito: al primo toccaranno Scud. 1728. al secondo 1152. & al terzo 720.

Quesito Decimottauo.

Due altri fanno compagnia. Il primo mise scudi 120. e del guadagno ne vuole a ragion di 24. per 100. del capitale; e il secondo mise scud. 90, e del guadagno si contenta di 18 per 100, del capitale. Hanno guadagnato 40. scudi. S'addimanda. Quanti ne toccarà à ciascuno?

Questa, e simili proposte si risoluono così. Si mutiplica il capitale di ciascuno cõ quello che pretendono di guadagnar per 100. siche moltiplicando li scud. 120 del primo col 24. fanno 2880. e questo sarà il suo capitale. Il capit. del secondo sarà la moltiplicatione de scud. 90. col 18. che fanno 1620. Vniti poi insieme questi dué capitali fanno 4500. Il che fatto, si dice Se 4500. guadagna 40. quanti ne toccarà a 2880 del primo, e quanti a 1620. del secondo? Al primo toccano scud. 25 $\frac{3}{5}$, & al secõdo 14 $\frac{2}{5}$.

Que-

Due fanno compagnia. Il primo mette scud. 80. & il secondo mette solamente scud. 20. ma per esser il secondo huomo esperto, e di negotio, sono frà loro d'accordo, che il primo habbia li $\frac{2}{3}$ del guadagno, ed il secondo n'habbia $\frac{1}{3}$. (Non ostante, che il suo capitale sia solamente la quarta parte del capitale del primo) fatto il patto. Vn terzo entra nella Compagnia con scud. 120, e stà all'accordo fatto frà loro. Nel fine del negotio si trouano di guadagno scud. 500. Quanti ne toccarà a ciascun di loro?

Questo quesito è proposto da varij Scrittori: ma solo il Tartaglia Lib. 12 quest. 86. ritrouò il vero modo di risoluerlo (seguitato da quei, che dopo di esso propongono simili quesiti, al che mi sottoscriuo ancor Io,) ed è come siegue.

Se li due primi con li scud. 100. di capitale hauessero guadagnato altri scud. 100. al primo ne toccariano 66 $\frac{2}{3}$, e al secondo 33 $\frac{1}{3}$, e senza patto a buon guadagno 80. al primo, e 20. al secondo. Siche in vigor del patto il primo dona al secondo scud. 13 $\frac{1}{3}$, ciò, cioè $\frac{1}{6}$ del guadagno, (oltre al guadagno delli scud. 20, che pose il secondo nella compagnia.) Hora mò, il terzo compagno deue darli ancor lui la sesta parte del semplice guadagno del suo capitale di scud. 120, che sono scud. 20. E per esser meglio inteso. Se frà tutti trè hauessero guadagnato scu. di 220. (eguali al loro capitale) alli due primi saria toccato a buon guadagno, come sopra 80, e 20, e al terzo 120, ma perche il primo, ed il terzo deuono dare al secondo $\frac{1}{6}$ del guadagno schietto, ne siegue, che in vigore del patto il primo ne deue hauere solamente 66 $\frac{2}{3}$. Il secondo 53 $\frac{1}{3}$, & il terzo 100. Si dice mò. Se di scud. 220 ne toccano 66 $\frac{2}{3}$ al primo, 53 $\frac{1}{3}$ al secondo, e 100. al terzo. Di scudi 500. quanti glie ne toccaranno? Operando, al primo coccano scudi 151 $\frac{17}{33}$, al secondo 121 $\frac{7}{11}$, ed al

terzo 227 $\frac{5}{17}$, che frà tutti fanno 500. E però sta bene.

Quesito Vigesimo.

Due fanno compagnia. Il primo mette scud. 130, e del guadagno ne deue hauer li $\frac{2}{3}$. Il secondo mette solamẽte scud 50, ma per esser buon praticone, deue hauer li $\frac{3}{4}$, del guadagno. Si fà inanzi vn terzo, e con scud. 200. entrando nella cõpagnia, stà all'accordo fatto frà li due primi. Nel fine del negotio si trouano hauer guadagnato scudi 800. S'addimanda. Quanto toccarà a ciascun di loro?

Questo quesito non si può sciogliere, come canta; perche se il primo pigliasse li $\frac{2}{3}$ del guadagno, non vi restariano poi li $\frac{3}{4}$ del secondo, (& è contra) Però ci vuol giuditio, e discorso, come siegue.

Se li due primi hauessero guadagnato solamente scudi 180, ne frà loro vi fosse stata conuentione, ò patto alcuno, certo è, che al primo sariano toccati scud. 130. ed al secondo 50, mà alla rata portione dell'errore, (come hò insegnato nel quesito 8) al primo toccarà solamente scud. 84 $\frac{12}{17}$, ed al secondo 95 $\frac{5}{17}$. Siche in vigore del patto il primo dona al secondo scud. 45 $\frac{5}{17}$ del suo semplice e real guadagno, (che sono li $\frac{77}{221}$ pur del suo guadagno) e perche il terzo stà all'accordo fatto: bisogna, ch'ancor lui dia al secondo compagno li $\frac{77}{221}$ pur del suo semplice guadagno. Attento. Se frà tutti tre hauessero guadagnati scud. 380. (eguali alla somma del capitale di tutti tre) senza patto alli due primi ne toccariano come sopra; cioè scud 130. e 50, e al terzo 200; mà perche il terzo ne deue dare ancor lui li $\frac{77}{221}$ del suo puro guadagno al secondo (che sono scud. 69 $\frac{151}{221}$) esso resta solamente con scud. 130 $\frac{70}{221}$. Si che in vigore del patto di scud. 380. il primo ne doueria hauere 84 $\frac{12}{17}$, il secondo 164 $\frac{3672}{3757}$. Ed il terzo 130 $\frac{70}{221}$. Si dice mò. Se di 300 ne toccano 84 $\frac{12}{17}$ al primo; 164 $\frac{3672}{3757}$ al secondo, e 130 $\frac{70}{221}$ al terzo. Di 800 quanti n'haueranno, &c, Operando, al primo toccano

scud.

scud. 178 $\frac{106}{123}$, al secondo 347 $\frac{1347}{4196}$, ed al terzo 274 $\frac{1474}{4196}$ che sommati insieme fanno a punto 800. Però stà bene.

Quesito Vigesimoprimo.

Due fanno compagnia. Vno mette scud. 50. e l'altro 30. con patto di partir per metà il guadagno, e capitale. Per accidente occorso, accadde, che ciascun di loro non pose nella compagnia altro che scud. 20. S'addimanda, A star al primo accordo, quanto tocca a ciascuno di quanto possono guadagnare?

S'haueßero messo nella cõpagnia secondo l'accordo 50, e 30. e haueßero guadagnato solamente scud. 80. certa cosa è, che trà guadagno, e capitale ne sariano toccati a ciascuno 40. Siche il primo dona al secondo dieci Scudi del suo capitale, cioè $\frac{1}{4}$, e così d'ogni guadagno, e capitale il secondo n'hà d'hauere $\frac{1}{4}$ più del primo. La quinta parte di 20. è 4. qual sotratto da 20, (capitale del primo) resta 16, e aggionto a 20. (capitale del secondo) fà 24. Hora mò bisogna vedere, che parte sia il 16. & il 20 di scud. 40. (capitale, e guadagno di ciascuno secondo il supposto.) Il 16. è li $\frac{2}{5}$, & il 24. li $\frac{3}{5}$; e però si conclude, che il primo deue hauere li $\frac{2}{5}$ di quanto si trouano hauere nel fine della compagnia, & il secondo ne deue hauere li $\frac{3}{5}$, *& sic de alijs &c.*

Quesito Vigesimosecondo.

Quattro vogliono comprare vna pezza di panno. Nissuno di loro hà Denari a sufficienza, ma frà tutti quattro n'hanno a puntino, e niente di più. Li trè senza il primo hanno Scudi 18. Li trè senza il secondo n'hanno 20. Li tre senza il terzo 22. E li trè senza il quarto n'hanno 24. S'addimanda, quanti scudi hà ciascuno, quanti frà tutti, e quanto valse la pezza del panno?

Attento. Li Denari di ciascuno sono computati vna volta meno de' compagni, cioè trè volte; e così sommati 18, 20, 22, 24, fanno 84 (treppio di quello, ch'hanno frà

tutti

tutti, e valuta della pezza di panno) Diuiso mò 84. per 3. ne viene 28. Valuta vera del panno, e quantità reale de scudi, ch'haueuano frà tutti. Da 28 cauandone 18. resta 10 del primo. Cauandone 20, resta 8. del secondo. Cauandono 22 resta 6 del terzo; e cauandone 24. resta 4 del quarto. Fanne proua, e la trouarai buona.

Quesito Vigesimoterzo.

Ò finiamo con vn quesito bizzarro. Tre compagni hanno da partir Lir 180 egualmente frà di loro; mà (nó sò come) nel spartirli vennero à parole, e così ognuno sgrafegnò quella quantità de detti Denari, che gli fù possibile; per buona fortuna sopraggiunse vn amico di tutti trè; (che pur tuttauia stauano contrastando,) qual disse al primo compagno, che metteſſe giù la $\frac{1}{2}$ di quello, ch'haueua buscato; al secondo, che deponeſſe $\frac{1}{3}$, e all'altro disse, mettete fuori $\frac{1}{4}$. Il che facendo prontamente ognun di loro, diuisero egualmente in terzo tutto quello, che fù depoſto; in modo tale, che con questa portione, e con quello, che gli era restato nelle mani; ciascuno si trouò hauer la sua parte di quelle Lir 180. cioè Lir 60. che sono $\frac{1}{3}$. Hor s'addimanda. In quella diuisione, (fatta a rampino) quanto buscò ciascun di loro?

Per scioglier questa, e simili queſtioni bisogna eleggersi vn numero qual si voglia, (ma per fuggire rotti sono di proposito il 12, & 24.) Io m'eleggo il 12. Hora mò, Io m'imagino, che il primo buscaſſe 12, e mettendone giù la $\frac{1}{2}$, ne restaſſe 6. nelle sue mani. Bisogna mò trouare vn numero, che mettendone giù $\frac{1}{3}$, ne reſti in mano del secondo pure 6, e questo sarà 9. Adunque m'imagino, che il secondo sgrafegnaſſe 9. Finalmente bisogna trouare vn numero, che deponendone $\frac{1}{4}$, ne reſti parimente 6. e questo sarà 8. Adunque m'imagino, che il terzo grapiſſe 8. Hora mò dico, ch'hauendo tutti trè in mano egualmente 6, non possono far di meno di

non

non restar parimente eguali con qualsiuoglia quantità; che deposta, sia diuisa egualmente in terzo. Si fà adunque così. Si sommano insieme questi tre numeri 12. 9. 8. che fanno 29. e poi per la Regola delle compagnie si dice. Se 29. fosse Lir 180, che saria 12, che 9. & che 8? Operando si trouarà, che il primo buscò Lir 74. sold. 9. Den 7 $\frac{25}{29}$. Il secondo Lir 55. fold. 17. den. 2. $\frac{26}{29}$. & il ter, zo Lir. 49. sold. 13. den. 1. $\frac{7}{29}$.

DELLE COMPAGNIE RVSTICANE, Dal volgo chiamate Sócide.

CAP. XIX.

Quesito Primo.

VN Cittadino diede in Socida ad vn suo Contadino Pecore 180. per Anni 5. e con patto frà di loro, che nel fine si douessero partire per metà tanto li nascenti, quanto il capitale. Occorre, che in capo a tre Anni, (per accidenti occorsi) bisogna far la diuisione, e si trouano hauere in tutto Pecore 320. S'addimanda, quante ne deuono toccare a ciascun di loro?

Per risoluere simili quesiti non bisogna partirsi dalla Regola insegnata dal Zucchetta; (ragioneuolmente lodata dal Dottor Bassi Piacentino, alla quale totalmente mi sottoscriuo) & è come siegue. Quanto a nascenti, certo è, che in ogni tempo si deuono partir per metà; perche, se il Padrone vi mette il capitale, il Contadino lo alimenta, e vi mette la sua fatica &c. Mà circa la metà del capitale, il Contadino non lo può pretendere fin doppo il pattuito tempo, mà solo deue hauerne la tata portione. Per risoluere adunque il quesito, bisogna prima cauare il capitale dalle Pecore 320, e ne restaranno 140. la metà delle quali (cioè 70.) saranno del

Pa-

Padrone, & altre 70. saranno del Contadino. Quanto al capitale. Se la società fosse arriuata in capo alli Anni 5. certissimo, che il Contadino n'haueria la metà, (cioè 90) mà per non esser passati li trè Anni, non può pretendere se non la rata portione di quelle 90. Pecore: però bisogna dire. Se Anni 5. pretendono Pecore 90. Quante ne pretendono Anni 3? Operando, ne pretendono 54, e tante pecore del capitale deue hauer il Contadino; che gionte con l'altre 70. fanno 124. per tutta la portion del Contadino. Il resto sarà del Padrone, cioè Pecore 196.

Quesito Secondo.

Vno dà in società ad vn Pastore Pecore 250. Il Pastor ve ne pose 60. delle sue. La società deue durare 4 Anni, e per metà si deuono partir li nascenti dell'vno, e l'altro capitale. In capo a Mesi 18. bisogna far la diuisione, e si trouano in tutto Pecore 700. Quante ne toccano à ciascun di loro?

Questo quesito nõ è punto differente dal passato, se nõ che per esserui due capitali, questi fanno contraposition ò temperamento; laonde conuerrà esercitar due volte la Regola Aurea, come siegue. Leuando li due capitali dalle Pecore 700. ne restano 390. da partirsi per metà. Si che de nascenti l'vn, e l'altro hauerà Pecore 195. Se la società fosse arriuata in capo a 4. Anni, il Pastore hauria hauuto la metà del capitale del suo Padrone (cioè Pecore 125) di casi; se Mesi 48. hanno da partir Pecore 125. Quante ne toccano a Mesi 18. del Pastore? Operando ne deue hauer 46 7/8, che con l'altre 195. fanno 241 7/8, (al Padron resta del suo capitale Pecore 203 1/8, che cõ l'altre 195, fãno 398 1/8) Quãto poi al capital del Pastore, se la società fosse arriuata al douuto termine, il Padron hauria hauuto Pecore 30 però si dice. Se Mesi 48. pretendono 30 Pecore, Quante se ne cõuengono a Mesi 18. del Padrone? Operãdo, il Padrone deue hauere del capitale del Pastore pecore 11 1/4, che

vnite

vnite con l'altre 398 1/8 in tutto fanno 409 3/8 (Al Pastore resta del suo capitale Pecore 48 3/8, che vnite con l'altre 241 7/8, fanno in tutto 290. 5/8,) Si conclude, che al Padrone toccano pecore 409 3/8, & al Pastore 290 5/8. Vniscansi insieme queste due partite, e ne ritornaranno le pecore 700.

Quesito Terzo.

Vn Cittadino diede pecore 200, ad vn Pastore per Anni 4, acciò le gouernasse: nel fin de' quali si douesse partir il tutto in modo, che il Pastore n'hauesse li 2/7, & il Cittadino li 5/7. Accade, che dopo mesi 20. rompono la socida; e si trouano solamente pecore 180. S'addimanda. Come deuono far tal diuisione?

Questo precisso quesito propone il Zucchetta, qual dice: che in questo caso il danno deu'essere pagato, da chi douea riceuer l'vtile. Voglio dire; che il mancamento delle pecore 20 deu' esser risarcito dal Pastore per li 2/7, essendo che dell'vtile ne douea participare similmente li 2/7. Ma perche quei 2/7 douevano maturare in capo a 4. Anni; però bisogna pigliarne la proportione, douuta alli mesi 20, dicendo per la Regola Moltiplice, Se in mesi 48. s'hauerianno da risarcire pecore 20, & all' hora d'ogni 5. il pastore ne douerìa dare 2. Quante ne deue dare in capo a mesi 20? Operando, ne deue dare 3 1/3, quali vnite con le 180, in tutto fanno 183 1/3. E tante pecore appunto deue restituire il Pastore al Cittadino.

Vn simil quesito in sostanza mette vn Scrittor moderno: e seguita la conclusione del Zucchetta. Io non posso però alla cieca sottoscriuermi a sì grosso sbaglio. Se fra'l Pastore, & il Cittadino fosse conuentione, ch'intatto, & intiero restasse sempre il capitale al Padrone: e che d'ogni mancanza il pastore douesse concorrere all' integrità per la rata portione, &c. Sarei con essi; e la loro risolutione sarìa ottima; ma se la socida è commune,

co-

come canta il quesito: resto amirato: che chi hà trouato il vero modo di risoluere quelli quesiti di Socide, nel presente si lia perso. Se il Zocchetta insegna, che in ogni tempo li nascenti si deuono partire per metà; & il capitale alla rata portione, che dura la socida; e chi non vede, che d' vna sol Pecora, che fosse restata, il Pastore v'hà la sua parte? Hà d'hauer gouernate, & allimentate le Pecore 180. vinti mesi gratis, &c. La vera risolutione del quesito è questa. Se la Socida fosse arriuata in capo alli 4. Anni, e le Pecore fossero 200 certo è, che il Pastore per li $\frac{2}{9}$ n'haueria 80. si che per li mesi 20. bisogna dire. Se in mesi 48. s'haueriano Pecore 80. In mesi 20. quante se n'haueranno? Operando, se n'haueranno $33\frac{1}{3}$. Ma perche le Pecore sono solamente 180. bisogna tornar a dire. Se di Pecore 200. in mesi 20. il Pastore n'haueria $33\frac{1}{3}$, di Pecore 180. pur in mesi 20. quante n'haurà? Operando, n'hauerà 30. Però concludo, che il Pastore deue hauere Pecore 30; & il Cittadino 150. Per farne la proua dico cosi. La proportione di 200. a 180. è $1.\frac{1}{9}$; (poiche partendo il 200. per 180, ne viene $1\frac{1}{9}$) e perche a partire $33\frac{1}{3}$ per 30, ne viene pur $1\frac{1}{9}$, però la ragione è ben concluſa.

Quesito Quarto.

Vno dà Pecore 160. in socida ad vn suo amico per Anni 5. a partire per metà capitale, e nascenti. Dopo Anni 2. li dà altre Pecore 80. anco per cinque Anni con l'istesso patto. Volendo ridurre queste due socite ad vn sol termine; in che tempo si douerà fare la diuisione?

Prima di venire alla solutione del quesito, bisogna sapere; che il termine di partire in vna sol volta le due socide stà situato trà il termine della prima socida, e quello della seconda: e tal termine sarà sempre distante da essi termini, (che dal Filosofo termini *ad quem* sono chiamati in quella proportione, che ne dà la quantità del-

delle Pecore, e la differenza del tẽpo, nel quale comincia ciascuna delle due socide, (che termini *a quo* si chiamano pur dal Filosofo.) Ma perche il maggior numero delle Pecore rende maggior l'vtile del Pastore; & il tempo più longo li diminuisce il guadagno: però le proportioni del tempo si deuono pigliare con vso contrario, (come siegue.)

Questo, e simili quesiti si risoluono a modo di compagnia. S'vnischino insieme le Pecore de' capitali 160, e 80. (che fanno 240) e poi si dichi. Se 240 hà mesi 24. (differenza del tempo trà il principio della prima alla seconda socida) quanti Mesi n'hauerà 80? (Pecore della seconda socida) Operando ne vengono mesi 8. d'aggiongersi a gli Anni 5. della prima socida. Si che in capo ad Anni 5, e mesi 8. si douerà fare la diuisione di tutte due le socide, cominciando a contare dal principio della prima socida. Diciamo di più. Se 240. hà mesi 24 Quanti n'hauerà 160? (Pecore della prima socida) Operando ne vengono Anni 1, e mesi 4. da sottrarsi mò da Anni 7. (distanza dal principio della prima socida fino al fine della seconda) e ne restaranno pur Anni 5, e mesi 8 (come sopra.)

Ma quì notate (per vita vostra) che quei mesi 8. sono la portione del tempo conueniente alla maggior quantità delle Pecore 160, e corrispondenti a gli altri mesi 16, (che mancano per arriuare alli mesi 24.) e corrispondenti al minor numero delle Pecore 80. Voglio dire, che si come il 160. è in proportione duppla con l'80, così li Mesi 16. sono in proportione duppla con li mesi 8. però, come vedete, il termine della seconda socida s'è scortato il doppio di quello, s'è slongato il termine della prima: poiche al maggior numero delle Pecore deue corrispondere minor tempo: & al minor numero deue corrispondere maggior tempo.

Per

Per vn altro modo.

Quando cominciò la seconda Socida, erano già passati due Anni della prima Socida. Or moltiplichiamo gli altri trè Anni, che restano, col suo capitale di Pecore 160. & haueremo questo composto 480. Moltiplicansi parimente gli Anni 5. della seconda socida col suo capitale di Pecore 80. e s' haurà quest'altro composto 400; quali vniti insieme fanno 880. Diuidendo mò questo 880. per 240. (somma delle Pecore de' due capitali) di Quotiente ne verranno Anni 3, e Mesi 8. a quali aggiongendoui gli Anni 2. trascorsi, quando cominciò la seconda socida, farà (come per gli altri due modi) Anni 5, e mesi 8. (e questo modo è il più sbrigato, & il più facile.)

Quesito Quinto.

Vno dà in Socida Pecore 150. per Anni 4. à partir per metà capitale, e guadagno. Passati due Anni, ne diede altre 70. con l'istesso patto per Anni 6. Volendo ridurre le due socide ad vn sol termine, a che tempo si farà la diuisione?

Questo, e simili quesiti si risoluono, come il precedente. Non v'è altro d'auuertire, se non che alli due Anni della differenza ne' principij delle socide, bisogna aggiongerui li due Anni, che la seconda tira più auanti della prima, e faranno Anni 4. E poi dire al solito. Se 220. hà 4. Anni. Quanti n' hauerà 70?) Pecore della seconda socida) Operando, in tutti trè li modi si troua, che la diuisione delle due socide insieme si douerà fare in capo ad Anni 5. $\frac{3}{11}$, cioè mesi 3. gior. 8. h. 10. $\frac{10}{11}$ d'hora.

Se le Socide fossero trè, si troua il termine di mezo frà la prima, e la seconda socida: poi di nuouo frà questo termine trouato, & il termine della terza socida si troua il termine medio; quale sarà il tempo da partirsi communemente le trè socide (E tanto basti in questa materia.)

DE

DE BARATTI.

CAP. XX.

FRà Mercanti s'vsa a far pagar più cara la robba quãdo si baratta, che quando corre il Denaro contato. E' però vero, che non stanno a specificare di voler più a baratto, che a contanti. Laonde bisogna, che l'altro stia auuertito; acciò nel barattare non discapiti. Pongo alcuni esempij: perche non v'è cosa tanto pericolosa di pregiudicare a sè stesso ne'contratti, quanto ne' baratti: e però non bisogna fidarsi del proprio giudicio, ma con far la ragione venire in chiaro.

Quesito Primo.

Vno hà vna pezza di meza lana, che a Denari cõtanti vale sol. 16. il Brazzo; ma a baratto ne vuole 18. L'altro si troua hauere vna quantità di Garzollo, quale a Denari contanti vale Lir. 5. il Peso. Questi vorriano barattare. S'addimanda. Quanto s'hà da far pagare il secondo il suo Garzollo per Peso, per non discapitare; & acciò il baratto sia eguale? E per 50. Brazza di meza lana, quanto Garzollo deue dare?

Per risoluere il primo quesito si dice. Se quello che val sol. 16, mi vien fatto pagare sol. 18. quello, che val Lir. 5. quanto si doueria far pagare? Operando secondo la Regola del trè ordinaria; il Peso del Garzollo si douerà far pagare Lir. 5. sol. 12. Den. 6. Ma per risoluere il secondo quesito, bisogna vedere quanto costino le 50 Brazza di meza lana a sol. 18. il Brazzo. Costano Lir. 45. Di poi si dice. Se con Lir. 5. Sol. 12. Den. 6. comprò Lib. 25. di Garzollo, con Lir. 45. quante Lib. se ne compraranno? Operando, se ne compraranno Lib. 200. Oncie $10\frac{5}{7}$.

Quì rinfresco alla memoria, che quando la prima, e seconda cosa della Regola del 3. sono di simil parte, e natura, la quarta, che si cerca non riesce simile alla se-

conda (come per regola generale douerìa) ma della natura della terza; come nel presente quesito si vede essere accaduto. E questo serue grandemente, per sapere, che cosa siano quei rotti, che dalla prima diuisione restano: a fine di ridurli in altre minutie di proposito.

Quesito Secondo.

Due altri barattano Panno, e Lana. Il Brazzo del panno a contanti val Lir. 7, & a baratto lo fece pagare Lir. 8. Il Cento della lana a contanti val Lir. 20, & a baratto fù messa Lir. 24. S'addimanda. Chi meglio barattò?

Di così. Se di 7. lui fà 8, che douerò far Io di 20? Douerò far 22 $\frac{6}{7}$: e tante Lir. vale il Cento della Lana a baratto eguale: ma perche li fù messa Lir. 24. adunque barattò meglio quello della Lana; poiche per ogni Lib. 100. di Lana guadagna Lir. 1. $\frac{1}{7}$. per saper mò quanto guadagnaria per ogni Lir. 100 impiegate in tal baratto, si dice così. Se Lir. 22 $\frac{6}{7}$ guadagnano Lir. 1. $\frac{1}{7}$, che guadagnaranno Lir. 100? Operando, guadagnaranno Lir. 5. E se questo guadagna Lir. 5. per cento, quanto perderà l'altro? Molti coriui, e poco pratici diriano, che perde parimente Lir. 5. ma non è così: perde solamente Lir. 4. $\frac{16}{21}$, perche, si come quello, che guadagnò Lir. 5. fece di 100. 105: così quello, che perdè, fà di 105. solamente 100. (Come altroue s'insegnò.

Quesito Terzo.

Due altri vogliono far baratto. Vno hà del Lino, che a contanti vale Lir. 5. il Peso, & a baratto Lir. 6. L'altro hà del Formaggio, che a contanti val Lir. 7. il Peso. S'addimanda. Quanto lo deue mettere a baratto, per guadagnarui 10. per cento?

Primieramente bisogna vedere, quanto deue mettere il Formaggio a baratto eguale, dicendo (come più volte si disse, nè più lo starò a replicare) Se 5. si fà pagare 6, quanto si douerà far pagare 7? Si farà pagare Lir. 8. $\frac{3}{5}$.

cioè

cioè Sol. 8. Adunque il Formaggio a baratto eguale varà Lir. 8. $\frac{2}{7}$ il Peso. Ma perche d'ogni Lir. 100. ne vuole guadagnar 10. si dice mò così. Se 100 mi dà 110, che mi darà $8\frac{2}{7}$? Opera, che ti darà Lir. 9. Sol. 4. Den $9\frac{3}{7}$, e tanto appunto si deue vendere vn Peso di Formaggio; volendo guadagnarui 10. per 100. Et auuertiscasi, che questo 10. per 100. s'intende di capitale, ò Denari, e non di baratto.

Quesito Quarto.

Altri due vogliono far vn baratto in questa forma. Vno si troua Lib. 2640. di Lana, che a contanti valeria Lir 40. il 100; ma in baratto ne vuole 48, e vuole anco la metà in Denari contanti. L'altro hà vna quantità di Panno, che a contanti vale Sol. 20. il Brazzo. Hor s'addimanda. Quanto si deue far pagare il panno a baratto: e per le sudette Lib. 2640. di lana quanto panno, e Denari contanti haverà l'altro?

Ogni volta, che vno de' barattanti sopramette la sua mercantia, e vuole anco vna parte de' Denari in contanti: bisogna in tal caso cauar sempre quella tal parte dal prezo pretesto a baratto. Si che nel caso nostro, volendone la metà, n'haueremo 24. Hora mò, questo 24. (metà del 48.) cauaremo prima dall'istesso 48. (prezo a baratto) e ne restarà pur anco 24. Parimente cauaremo quel 24. dal 40. (prezo a contanti) e ne restarà 16. Fatto questo, si dice. Se Lire 16. si fanno essere Lir. 24, che si doueranno far essere Sol. 20? Doueranno farsi Sol. 30. Adunque il panno si deue far pagare a baratto Sol. 30. il Brazzo.

Per saper mò quanto panno haverà per le Lib. 2640. di lana, già si sà, che detta lana a ragion di Lir. 48. il Cento costaria Lir. 1267. $\frac{1}{7}$: ma perche ne vuole la metà in contanti, (che sono Lir. 633 $\frac{3}{7}$) per l'altra metà si dirà. Se con Sol. 30. s'hà vn Brazzo di panno; con Lir. 633 $\frac{3}{7}$,

quante Brazza le n'haueranno? Se n'haueranno Brazza 422 2/7. Adunque per le lib. 2640. di lana douerà hauere lir. 633 3/7 in contanti, e Brazza 422 2/7 di panno. La proua di queste ragioni è questa; bisogna, che a prezo in cõtanti vno dia all'altro tanto quanto esso da quello riceue. Fanne la proua, ch'Io l'hò fatta, e parmi facile. Le Lib. 2640. di lana a lir. 40. il Cento costano lir. 1056; e le Brazza 422 2/7 di panno, che l'altro hà hauuto a ragion di Sol. 20. il Brazzo costano Lir. 422. Sol. 8, a quali aggiongendo le lir. 63 3/7, cioè Sol. 12. hauuti in contanti, fanno parimente lir. 1056. Adunque non v'è inganno.

Quesito Quinto.

Due parimẽte barattano. Vno hà 30. pezze di Zãbellotto, che a contanti vale scu. 5. la pezza; & a baratto scu. 5 2/7, e vuole scu. 50. alla mano. L'altro hà nel Pepe, che a contanti vale scu. 60. la soma (per vna soma s'intende lib. 400.) S'addimanda. Quanto si deue far pagar il Pepe; acciò il baratto sia eguale, e per le dette 30. pezze di Zãbellotto quanto Pepe, e quanti Denari s'haueranno?

Prima bisogna vedere, quanto costino le 30. pezze di Zambellotto all'vno, & all'altro prezo. A contanti val scu. 150, & a baratto scu. 170. Fatto questo, si cauano li scu. 50. dalli scud. 150, e dalli 170. si che restaranno scu. 100. a contanti, e scud. 120. a baratto. Di poi si dice. Se scu. 100. si fanno 120. Scu. 60. quanti si doueranno fare? Si doueranno fare scudi 72. Adunque il Pepe si douerà far pagare a baratto scudi 72. il cargo, ò soma. Nel resto della propositione s'opera, come nella passata.

Quesito Sesto.

Due altri barattano Zucchero, e Garofani. Il Zucchero a cõtanti val scu. 15. il 100, & a baratto scu. 20. Di Garofani a cõtanti vagliono sol. 11. l'oncia, & a baratto si mettono sol. 13. Hor s'addimãda, chi meglio barattò: e quãto si douerà dare in cõtanti a quello, che peggio barattò, come sono d'accordo? Sen-

Senza inuestigare, chi meglio barattò (come insegnai nel quesito secondo) più leggiadramente si saprà così. S'assettino li prezi de' due barattanti vno sotto l'altro (come di sotto si vede) e moltiplicandoli in croce, li Prodotti si colocano a dirimpetto d'essi, e quello, ch' hauerà maggior Prodotto; esso meglio barattò, ed è tenuto a rifare il compagno. Per saper mò di quanto l'habbia da rifare, si fà così. Si caua il Prodotto minore dal Prodotto maggiore, e la differenza, partita per la differenza de' due prezi di chi meglio barattò, lascierà nel Quotiente di quanto l'habbia da rifare.

	In contanti.	A baratto.	
Zucchero Scud.	15	20	220 Prod. per il Zucchero.
Garofani Sol.	11	15	195 Prod. per li Garofani.
		Resto	25.

Meglio barattò quello dal Zucchero. La differenza da scud. 15. a scud. 20. (prezo a contanti, & a baratto di chi meglio barattò) è 5 2. per il quale diuidendo il restato 25 di Quotiente ne viene pur 5. e così concludo, che quello dal Zucchero deue dare in contanti a quello de Garofani sold. 5. per ogni Oncia de Garofani: per il resto tanto Zucchero. Voglio dire, che vendendo a baratto li Garofani sold. 13. l'Oncia, di questi n'hà d'hauere $\frac{5}{13}$ in contanti, & $\frac{8}{13}$ in tanto Zucchero, se li Garofani si fossero venduti scud. 11. il 100. a contanti, e 13. a baratto; quel 5. sariano scud. 5, da darli in contanti per ogni cento Libre di Garofani, (il che s'auuertischi bene)

La proua si fà col voltar il quesito dicendo. Due barattano Zucchero, e Garofani: li Garofani in contanti costano sold. 11. l'Oncia, & à baratto 13. e ne vuole 5. in Denari. Il Zucchero in contanti val scud. 15. il 100. S'adi. dimanda. Quanto si deue far pagare a baratto? Per saperlo s'opera, come hò insegnato nel quarto quesito,

cioè, si caua quel 5. (che per Oncia di Garofani pretende in denari) da 11. e da 13. e ne resta 6. & 8. E poi si dice. Se quello, che in contanti val 6, a baratto si fà pagar 8. Quello, che in contanti val 15. Quanto costarà a baratto? Operando costarà 20. come fù proposto. Adunque la risolutione fù buona.

Quesito Settimo.

Vno vēde ad vn suo amico vna quantità di Formento, che a contanti si paga Lir 8 la Corba: ma perche il compratore domanda 10. Mesi di tempo a sborsare il Denaro; l'amico lo mette Lir 9 la Corba. Ma che? Occorre, che il compratore non molto dopo vendè a quello del Formento vna quantità di lana fina, a ragione di Lir 32. il 100. se bene a contanti non valeua, se non Lir 30. S'addimanda. Quanto tempo douerà dare al compratore della lana per osseruare quel medesimo ordine, che lui tenne in farsi pagare il Formento?

Già cōsta chiaro, che le lir 8. in Mesi 10. guadagnano lir 1. hor vedi in quanto tempo le lir 30. (prezo della lana in contanti) guadagnariano quelle lire 2. che lui sopramette la lana: e per tutto quel tempo, che staranno a guadagnarle; tanto tempo douerà stare il compratore della lana a sborsare il Denaro. E perche s'è insegnato altroue il modo nel trattato de censi, qui non replico altro, se non che douerà hauer tempo a pagare Mesi 5 $\frac{1}{3}$.

Quesito Ottauo.

Finalmente. Vn Mercante vende vna quantità di pāno a scud. 10. la pezza in cōranti: ma perche fà tempo 12. Mesi, ne vuole scud. 11. la pezza. Non molto dopo, quello, che cōprò il panno, vendette vna quantità di Canella all'altro, a ragion di scud. 36. il 100. a pagarla in contanti. Ma perche il compratore vorria termine 8. Mesi a pagare. S'addimanda. Quanto deue alterare il prezo della Canella per rispetto di quel tempo, che richiede,

vo-

volendo offeruare con lui quello, che esso offeruò seco nella vendita del panno?

Facciasi cosi. Moltiplicansi li scud. 10. d'vna pezza di panno con li Mesi 12, e faranno vn composto di 120, qual composto guadagna scud. 1. Moltiplicansi parimente li Mesi 8. con li scud. 36, che vale il 100. della Canella, e s'haverà vn altro composto di 288. E poi si dice. S'vno composto di 120 guadagna scud. 1, vn composto di 288. quanti ne guadagnarà? Operando, si troua, che guadagna scud. 2 $\frac{2}{5}$, e questi si deuono aggiongere alli scud. 36, che faranno scud. 38 $\frac{2}{5}$. Adunque la Canella si deue far pagare a ragione di scud. 38 $\frac{2}{5}$ il Cento, con che saranno ambedue egualmente sodisfatti.

DEGLI AFFITTI.

CAP. XXI.

L'Vso de gli affitti tanto delle Possessioni, quanto delle Case (che pigioni si chiamano) è costume vniuersale in tutti li paesi; (abenche con altro termine, ò vocabolo le chiamassero.) Per ammaestramento di chi non sà, in questo capitolo pongo alcuni pochi quesiti, ch'apriranno l'intelletto ad altri &c.

Quesito Primo.

Vn Gentilhuomo affitta vna Casa per scud. 60. all'Anno. L'Affittuario anticipatamente sborsa scud. 200, con patto, che 10. per 100. all'Anno li siano scontati. S'addimanda. Quanto tempo deue stare in Casa?

Questo quesito per lettera mi fù proposto dal Manelli, e questa è la risolutione di simili quesiti. Perche il Fittaiuolo pretende l'vtile del 10. per 100. in capo al primo Anno li scudi 200. diuentariano 220. da' quali sottratti li Scudi 60 per il fitto del primo Anno, ne restano 160. Questi scudi 160. meritandoli per vn'Anno à

10. per 100. diuentariano 176, da quali leuando l'affitto del secondo Anno, ne restano 116. Questi scud. 116. meritandoli pure per vn Anno (come sopra) si fariano 127. $\frac{3}{11}$, da quali sottratto l'affitto del terzo Anno, ne restano 67 $\frac{3}{11}$. Finalmente meritando questi scudi 67 $\frac{3}{11}$, anco per vn Anno diuentariano 73 $\frac{19}{121}$; da quali cauandone l'affitto del quarto Anno, ne restano solamente 13 $\frac{19}{121}$. Ma perche si vede, che per questi scudi 13 $\frac{19}{121}$, il Fittaiuolo nó può star più vn Anno intiero in Casa, per saper quanto vi deue dimorare, si dice così. Se per scud. 60 vi stò vn Anno. Per scud. 13 $\frac{19}{121}$, quanto vi starò? Operando, vi starà Mesi 2. gior. 2. hor. 10. min. 20. $\frac{48}{77}$ di minuto. Concludo, che l'Affittuario deue star in casa Anni 4. Mesi 2. gior, 2. hor. 10. m. 20. $\frac{48}{77}$ (cioè poco più d'$\frac{1}{3}$ d'hora.)

Quesito Secondo.

Vno piglia in affitto vna Casa per 3. Anni, à pagarli scud. 90. all'Anno. Il Pigionale s'offerisce di pagare tutti trè gli affitti anticipatamente, all'intrar, che fà in Casa, se il Padrone vuol scontarli il 10. per 100. all'Anno. Se dice di sì. Quanto deue sborsare?

Questo quesito si risolue al contrario del passato. Quello col meritare li Denari anticipatamente pagati, e in questo col scontare. Adunque per il primo Anno si dice così. Se 110. viene da 100. da che verrà 90? Operando verrà da 81 $\frac{9}{11}$, e tanti scudi deue sborsare per il primo Anno. Per il secondo si dice. Se 110 era 100. che farà 81 $\frac{9}{11}$? Sarà 74 $\frac{45}{121}$, e tanti scudi deue sborsare per il secondo Anno. Per il terzo si dice. Se 110. viene da 100, da quanti verranno scud. 74 $\frac{45}{121}$? Veranno da scud. 67 $\frac{823}{3311}$, e tanti ne deue sborsare per il terzo Anno, quali partite vnite insieme fanno scud. 223 $\frac{45}{121}$, e tanto appunto ne deue sborsare il Fittaiuolo nell'entrar in Casa, ed haurà sodisfatto per tutti trè gli Anni,

Que-

Vno piglia a pigione vna Casa per vn Anno, e paga scudi 60. Al principio di Maggio, vn altro entrò ancor lui nella Casa, e quattro Mesi dopo ne pigliò vn terzo. Quanto deue pagar ciascun di loro alla rata portione del tempo, che stettero in casa, e secondo l'accordo dell' affitto?

Il vero modo di risoluere simili quesiti fù insegnato da Gio: Battista Zucchetta Genouese, approuato dal Dottor Bassi, ed al quale (come fedelissimo) mi sottoscriuo. Il modo è questo. S'vniscono insieme tutti li Mesi, che di tempo in tempo a ciascun compagno tocca di pagare alla rata portione la pigione, e poi s'opera à modo delle compagnie; Come in figura si vede.

Al primo compagno tocca il pagare quel tempo, che solo stette in Casa: cioè Mes. 4
Per li Mesi 4, che stette col secondo compagno, n'hà da pagare Mes. 2
Per li Mesi 4, che stette col secondo, e terzo compagno hà da pagare Mes. 1 1/3.

Portione del primo compagno Mes. 7. 1/3.

Il secondo compagno per li Mesi 4, che stette in Casa col primo compagno n'hà da pagare 2
E per li Mesi 4, che stette col primo, e terzo compagno n'hà da pagare 1 1/3.

Portione del secondo comp. Mes. 3 1/3.

Il terzo compagno hà da pagare solamente la terza parte di quei Mesi 4, che stette in Casa col primo, e col secondo, cioè —— Mesi 1 1/3.

Frà tutti Mesi 12.

Si

Si dice mò. Se Mesi 12. pagano Scud. 60. Quanti ne pagaranno Mesi $7\frac{1}{3}$ del primo. Mesi $3\frac{1}{3}$ del secondo, e Mesi $1\frac{1}{3}$ del terzo compagno? Operando. Il primo deue pagare scud. $36\frac{2}{3}$. Il secondo $16\frac{2}{3}$ & il terzo $6\frac{2}{3}$. che sommati fanno giusto 60.

Li nostri Antichi haueriano posto per il primo compagno Mesi 12. per il secondo 8, e per il terzo 4, non auuertendo, che se bene in quanto al tempo v'è la conueniente proportione, non v'è però quanto all'obligatione di pagare, &c. Però per il loro modo è falsissimo.

Quesito Secondo.

Pietro affittò vna Possessione a Francesco per scud. 300. all'Anno, e Francesco affittrò vna Casa a Pietro per scud. 80 pur all'Anno. Hauendo posseduto Francesco la Possessione Anni $5\frac{1}{2}$. Quanto tempo deue possedere Pietro la Casa; acciò restino del parro?

Il quesito si risolue per la Regola del trè semplice rouersciа cosi dicendo. Se scud. 300. furono posseduti Anni $5\frac{1}{2}$. Quanti si deuono possedere scud. 80? Operando, si deuono possedere Anni $20\frac{5}{7}$. E tanto tempo deue star Pietro in Casa.

PER TROVAR L'AVANTAGGIO DELLE MONETE.

CAP. XXII.

IL saper ritrouare per regola l'auantaggio delle Monete, che in paesi stranieri accade di spendere; certissimo, che non solo a Mercanti, ma anche à chi si sia apporterà grande vtilità: poiche non v'è alcuno, ch'habbia maneggio, che con occasione di compra, o di vendita, di ba-

baratto, o di cambio, non habbia parimente da spendere varie sorti di Monete; le quali non corrono per tutto con proportionata differenza; ma chi con più, e chi con meno. Questo negotio è facilissimo, e per la Regola Aurea presto si sbriga. Alla pratica.

Vn Mercante Ferrarese vuol sapere qual sia più vantaggioso per spenderlo a Venetia: il Reale di Spagna, ò pure il Ducatone: poiche il Reale in Ferrara val Paoli 8, ed in Venetia val Lir 8. Il Ducatone in Ferrara val Paoli 10, e in Venetia val Lir 9 - 6. Dirò dunque così. Se quello, che in Ferrara val Paoli 8. val in Venetia Lir 8. Quello che in Ferrara val Paoli 10, quanto valerà in Venetia? Operando valerà Lir 10, e tanto doueria valer a Venetia il Ducatone a proportione del Reale: ma perche non vale se non Lir 9 — 6, il Ducatone vi perde Sol. 24 Venetiani. Adũque sarà più vãtaggioso il Reale.

Di più.

La Dobbla d'Italia val in Ferrara Paoli 30, ed in Venetia lir 28 L'Ongaro in Ferrara val Paoli 17, ed in Venetia val Lir 15 $\frac{1}{2}$. Qual sarà più vantaggioso? Dico così. Se Paoli 30. della Dobbla in Ferrara val in Venetia Lir 28. Paoli 17 dell'Ongaro in Ferrara, quanto valerà in Venetia? Operãdo, doueria valer Lir 15 $\frac{13}{15}$: ma perche val solamẽte Lir 15 $\frac{1}{2}$, a proportione della Dobbla perde $\frac{11}{30}$ di Lira Venetiana. Siche sarà più vãtaggiosa la Dobbla.

In oltre.

La Dobbla di Spagna in Modona val Lir 31, e in Bologna val Lir 15 -5. L'Ongaro in Modona val Lir 17-5. e in Bologna val Lir 8 -10. Qual sarà più vantaggioso? Dico così. Se quello, che in Modona val Lir 31, in Bologna

logna lir 15 -- 5. Quello che in Modona val Lir 17 -- 5, quanto valerà in Bologna? Operando valerà Lir 8--9--8 $\frac{19}{31}$: mà perche in fatti val Lir 8--10 si vede, che l'Ongaro vi perde a proportione della Dobbla di Spagna. Adunque sarà più vantaggiosa la Dobbla.

Notabile.

Con quest'occasione di trouar l'auantaggio delle Monete, (in gratia di chi abita nel Ferrarese) qui voglio insegnare il modo di conuertire la moneta vecchia nella nuoua, (& è contra) senza Tariffa. Ma per maggior intelligenza di chi non è capace, bisogna sapere; che (pochi Anni sono) la Moneta Ferrarese fù conuertita in Moneta Romana: Siche doue prima si parlaua à Bolognini, Lire, e Scudi di quattro Lire; adesso si negotia a Baiocchi, Paoli, & à Scudi di Paoli. Baiocchi 10. fanno vn Paolo, e Paoli 10 fanno vn Scudo: ma prima Quatrini 6. (cioè Den. 12 faceuano vn Bolognino. (Bolognini 20.) (che anco soldi si nominauano) componeuono vna Lira, e Lir 4 vn Scudo. In questa mutatione n'è seguitato, che quello, che prima era 110. di Moneta vecchia, resta solamente 100. di Moneta nuoua: ouero 11. resta 10.

Per venir mò all'intento nostro, Io dico; che Bolognini 11 restano Baiocchi 10. Lir 11. restano scudi 2. di Paoli, e scud. 11. vecchi restano scud. 8. pur di Paoli, ed è infallibile. Siche sopra questo fondamento per la Regola del Trè può ciascuno intelligente senza Tariffa conuertire ogni data quantità di Moneta vecchia nella noua (& è contra.) Per esempio; voglio saper quanti scudi di Paoli siano scud. vecchi 275. Lir 3. Per risoluere il quesito in vn sol colpo, conuerto li scud. 275. in Lire, che sono Lir 1103, e poi dico. Se Lir 11. restano scud. 2. di Paoli, Quanti restaranno Lir 1103? Operando restaranno Scud. 700. Paoli 6. Baioc. 4 $\frac{6}{11}$. Ma per esser negotio tanto chiaro, e facile non stò à particolarizare d'auantaggio, se non

che

che parlando a Bolognini si dice. Se Bolognini 11. restano Baiocchi 10. Quanti restaranno Bolognini, &c. Parlando a Lire. S'opera, come nel precedente proposto esempio. Se si parla a Scudi si dice. Se scudi vecchi 11. restano scudi 8. di Paoli. Quanti restaranno scudi vecchi, &c. Se poi si volesse conuertire la Moneta nuoua nella vecchia: basta a voltare li termini della Regola (dicendo per esempio). Se Baiocchi 10. diuentano Bolognini 11. Quanti Bolognini si faranno Baiocchi, &c.

DELLE

LEGATVRE MERCANTILI

Dell' Oro, & Argento.

CAP. XXIII.

TRà Merçanti si costuma alle volte di comprare diuersità di Mercantie tutte insieme, sotto vn prezo solo; benche siano di varij prezi. Laonde gli Aritmetici hanno filosofato questa Regola; detta legamento; perche si legano propriamente insieme vn prezo, con l'altro per arriuare al preteso disegno: & Io ne pongo alcuni pochi esempj, che appunto seruiranno per esempio in altri casi, &c.

Quesito Primo.

Vno si troua hauere cinque sorti di Formento. Il Staro della prima sorte vale Sol. 54. Quello della seconda Sol. 58. Quello della 3. Sol. 62. Quello della quarta Sol. 70. e quello della quinta sorte vale Sol. 76. Hora mò. Viene vn Mercante, e ne vuole comprare tanto di ciascuna sor-

sorte, che in tutto siano stara 100, a ragione di Sol. 66. il staro (prezo fuori di prezo). S'addimanda. Quante stara ne deue pigliare di ciascuna sorte? (Quesito veramente curioso.)



Primieramente, per aiutare la memoria, si mette in figura il quesito, come si vede. Li numeri superiori sono li prezi del Formento. Quel 66. nel fondo della figura è il prezo, che il Mercante pretende pagare le richieste Stara 100. di Formento. Fatto questo: si legano li prezi minori con li maggiori in questa maniera. Io domando: il 54. quanto è lontano dal 66? E' lontano 12. Or mettiamo questo 12. sotto il 76. Et il 76. quanto è lontano dal 66? E' lontano 10. Or mettiamo questo 10. sotto il 54. (e questi due prezi saranno legati) Nell'istesso modo si legano gli altri due prezi 58, e 70. Ma perche il 62. non hà numero corrispondente sopra il 66; si può legare col 70, ouero col 76. Io lo lego col 76, (come s'è fatto con gli altri dicendo.) Il 62. quanto è lontano dal 66? E' lontano 4. Or questo 4 si metti sotto il 76. Et il 76. quanto lontano dal 66? E' lontano 10. Or questo 10. si metti sotto il 62, e così saranno legati tutti li prezi. Il resto dell' operatione si fà come le compagnie. Adunque unite insieme tutte le differenze 10. 4. 10. 8, e 16. (cioè quel 12, e 4 posto sotto il 76.) fanno 48. Di poi si dice. Se 48. mi dà 100, che mi darà 10, che 4, che 10, che 8, e che 16? Si potria dire anco così. Se 48. mi dà 10, mi dà 4, mi dà 10, mi dà 8, e mi da 16; che mi darà 100? In qual si voglia modo, che si operi; di quello da Sol. 54. se n'ha-

ue-

uerãno Stara 20, Quarte $4\frac{1}{6}$ (à ragion di 5 Quarte il Staro) Di quello da Sol. 58. Stara 8, Quarte $1\frac{4}{6}$ Di quello da Sol. 62, Stara 20, Quarte $4\frac{1}{6}$. Di quello da Sol. 70, Stara 16, Quarte $3\frac{2}{6}$. Di quello da Sol. 76, Stara 33, Quarte $1\frac{4}{6}$.

La proua di queſta, e ſimili ragioni è queſta, che tanto deuono coſtare le ſudette Stara tutte inſieme, quanto montano le Stara 100. à Sol. 66. il ſtaro.

Le ſtara $20.4\frac{1}{6}$ a ſol. 54 il ſtaro coſtano L. 56. ſ. 5. Dē. 0
Le ſtara $8.1\frac{4}{6}$ a ſol. 58. il ſtaro coſtano L. 24. ſ. 3. Dē. 4
Le ſtara $20.4\frac{1}{6}$ à ſol. 62. il ſtaro coſtano L. 64. ſ. 11. Dē. 8
Le ſtarà $16.3\frac{2}{6}$ à ſol. 70. il ſtaro coſtano L. 58. ſ. 6. Dē. 8
Le ſtara $33.1\frac{4}{6}$ a ſol. 76. il ſtaro coſtano L. 126. ſ. 6. Dē. 8

Lir 330 — 0 0

Tutte queſte Starà, Quarte, e rotti vnite inſieme conſtituiſcono le richieſte ſtara 100.

Parimẽte le Stara 100. a Sol. 66. il Staro mõtano Lir. 330. Adunque ſtà bene. Li ſopradetti prezi ſi potriano legare ancora diuerſamente da quello s'è fatto. Per eſẽpio il 54. col 70. Il 58. col 70. & il 62. col 76. Ouero ſi può legare il 54. col 76. Il 58. col 76. & il 62. col 70. Ouero cosi. Il 54. col 70 Il 58. col 76, & il 62 col 76. In qual ſi voglia modo, che ſi leghino, il compratore ſempre haueràle ſtara 100. di Formento con le medeſime Lir. 330. per ogni verſo: ſe bene d'alcuna ſorte ſe n'haueràpiù, e d'alcune meno di quello s'è hauuto di ſopra (Mi ſon diſtattato in queſto primo queſito, per eſſer più ſcarſo ne ſeguenti.)

Queſito Secondo.

Vn Commune fà gettare, ò fondere vna Campana, qual peſa Lib. 2325. e coſta di materia ſolamẽte Lir. 488 Sol. 5. In queſto getto vi ſono cinque ſorti di metalli. Il primo coſta, ò val Lir 16 il 100. il ſecõdo Lir 18. il terzo

Lir

Lir 20. Il quarto Lir 27. e il quinto Lir 31. S'addimanda, in quella Campana quanto Metallo v'è d'ogni sorte?

Si dice così. Se Lib. 2325 di Metallo in confuso costano Lir 488 $\frac{1}{43}$, che valeranno Lib. 100? Valeranno Lir. 21, e questo 21. si mette nel fondo della figura. E poi operando, e legando al solito hauerai 10 6. 6. $\frac{3}{17}$. 5, che in tutto sono 31. E poi dirai. Se 31 mi dà 2325, che mi darà 10, che 6, che 6. che $\frac{3}{17}$, & che 5? Operando della prima sorte n'haurai Lib. 750. Della seconda Lib. 450. Della terza Lib. 450. Della quarta 300. Della quinta Lib. 375, che in tutto sono Lib. 2325.



Però stà bene. Vn altra proua; Vedi quanto costano le sudette Lib. a ragion del loro prezo, e tutte insieme fanno Lir 488. $\frac{1}{43}$, &c.

Quesito Terzo.

Vn Droghiero frà gli altri Aromati hà del Pepe, che val Sol. 40. la Libra. Della Canella a Sol. 50. la Libra. De Garofani à Sol. 55. la Libra. E del Zaffaranno à Sol. 90. la Libra. Và vn Mercante per comprare per la somma di Scud. 70. delle sopranominate 4. spetie d'Aromati, a ragion di Sol. 60. la Libra, S'addimanda, Quante Libre n'haurà d'ogni sorte?

Si

Si legano li prezi del Pepe, &c. come si vede in figura, e ne verranno 30. 30. 30. $\frac{20}{10}$, che in tutto sono 5. 125. Dipoi si dice. Se 125. danno lib. 1. Quãte ne daranno 30. 30. 30. 35? Ne daranno $\frac{30}{125}$, $\frac{30}{125}$, $\frac{30}{125}$, $\frac{30}{125}$. Per saper mò quante Libre se n'haueranno d'ogni sorte, si dice. Se con sol. 60. hò hauuto $\frac{30}{125}$ di Pepe: $\frac{30}{125}$ di Canella: $\frac{30}{125}$ di Garofani: e $\frac{35}{125}$ di Zaffaranno. Con Scudi 70. (cioè sol. 5600.) quante libre n'haverò? Operando haverai lib. 22. $\frac{3}{5}$ di Pepe. Lib. 22. $\frac{2}{5}$ di Canella lib. 22. $\frac{2}{5}$ di Garofani, e lib. 26 $\frac{2}{15}$ di Zaffaranno che in tutto sono lib. 93. $\frac{1}{3}$. Per farne la proua, si dice così. Se vna lib. costa soldi 60. lib. 93. $\frac{1}{3}$. Quanti soldi costaranno? Costaranno sol. 5600. che fanno scudi 70. Adunque stà bene. E tanto basti.



Nell'istesso modo s'operaria, s'vno volesse spendere vna determinata quantità in tanto Vino, Marzaria, ò altra mercanzia, ch' hauesse più prezi: e quello, che compra la volesse a vn prezo solo.

Due cose particolari bisogna osseruare in questa Regola del legare, (e sono essentiali.) La prima è, che il prezo medio, (cioè di quello, che compra) non sia minore, nè maggiore del prezo minore, ò maggiore della mercantia. La seconda è, che il prezo di quello, che compra sia al suo luogo: come nel passato quesito si vede, che il 60. è dritto frà il 55, & il 90; e che quando

non vi sono prezi egualmente da ogni parte del prezo medio; in tal caso si leghi al meglio, che si può. Si che nel passato esempio non essendo dopo il 60. se non il 90. col 90. s'è legato il 40, il 50, & il 55.

LEGATVRE DELL' ORO, ET ARGENTO.

ESsendo, che questa Regola del legare l'Oro, e l'Argento serue a Zecchieri, a gli Orefici, & altri, per comporre li metalli, ò semplice con semplice; ò semplice con composto: ouero composto con composto; bisogna sapere, che se bene sette sono li metalli: cioè Oro, Argento, Rame, Stagno, Piombo, Ferro, & Argento viuo: nondimeno l'Oro, e l'Argento solamente (& anco il Rame, come seruo dell'vno, e dell'altro) si pesano con due spetie di pesi delicati. Il primo (costumato in Venetia) si chiama Marca, la quale è d'onc. 8. Ogni onc. è 4. quarti. Ogni quarto è 36. caratti. Ogni caratto è 4. grani; e ciascun grano pesa quanto pesa vn grano di Formento. Il secondo peso è detto Libra, la quale si diuide in onc. 12. Ogni oncia si diuide in 24. Denari a peso, ò Scrupoli, & ogni Denaro, ò Scrupolo è diuiso in 24. grani. E' però vero, che tanti grani contiene vna di quelle onc. delle quali 8. fanno vna Marcar quanti ne contiene vna di quelle; dodici delle quali fanno vna libra. Altri fanno di 24. grani vn scrupolo. Di 3. scrupoli vna drama, & 8. drame fanno vn onc. (che tutto è vno) Si che gran. 576. fanno vn onc. e gran. 6912. fanno vna libra.

Di più bisogna sapere, che l'Oro si pesa a oncia; e l'Argento a lib. La maggior finezza dell'Oro si diuide in 24. gradi, che caratti, ò denari si chiamano; & il caratto in 24. grani: Laonde dicendo Oro di 24. s'intende

de Oro finissimo senza alcun mescuglio: ma dicendosi Oro di 20 -- 4. vuol dire, che per ciascun onc. di peso vi sono caratti 20, e gran. 4. d'oro fino, & il resto Rame, ouero Argento. La maggior finezza dell'Argento si diuide in 12. gradi, quali (in vece d'oncie) alcuni le chiamano leghe. La lega si diuide in 24. den. & il den. in 24. gran, come sopra. Si che dicendo Argento di leghe 12. s'intende per Argento puro: ma dicendosi Argento di leghe 9 -- 4 -- 7 vuol dire, che in ciascuna lib. di peso vi sono leghe, ouero oncie 9. den. ò scrupoli 4, e gran. 7. d'Argento puro: il resto Rame. Or veniamo alla pratica.

Quesito Quarto.

Con quattro qualità d'Oro, cioè da 24, da 23, da 19, e da 16 voglio comporne onc. 25. che siano di finezza 20. Quanto ce ne vorrà di ciascuna sorte?

Questo, e simili quesiti, si risoluono come li Mercantili. Le differenze delle finezze vnite insieme sono 12. Si dice adunque. Se 12. vuol onc. 25. Quante ne vorrà 4, quante 1, quante 3, e quante 4? Operando, del primo ingrediente da 24 ce ne vogliono onc. 8. caratti 8. Del secõdo onc. 2. carat. 2. Del terzo onc. 6, e carat. 6. Del quarto onc. 8, e carat. 8. (come del primo) (sommali insieme, e fanno appunto onc. 25.)



Per farne la proua, bisogna, che in quest'oncie 25. da 20. vi sia la finezza dell'Oro, che contengono insè le quattro qualità dell'Oro legato, ò composto, concor-

renti alla loro formatione. L'Oro della prima qualità, per esser puro, non hà bisogno d' esser proportionato. Per l'Oro della seconda qualità si dice. Se vn onc. d'Oro legato hà caratti 23. d'Oro puro. Quanti n'haueranno oncie 2 -- 2, che concorsero al composto d'onc. 25? Per quello della terza qualità si dice. Se vn onc. hà 16. Ch' haueranno onc 6--6? E per quello della quarta qualità si dice. Se vn onc. hà 16. Ch' haueranno onc. 8--8? Operando, ciascuna' delle sudette quattro qualità d'oro hanno in sè l'oro puro, che quì di sotto in figura si vede.

Della prima qualità	onc. 8.	caratti 8.	
Della seconda qualità	onc. 1.	carat. 23.	gran. 22.
Della terza qualità	onc. 4.	—— 22.	—— 18.
Della quarta qualità	onc. 5.	—— 13.	—— 8.
In tutto	onc. 20.	Car. 20.	—— 0.

Hora mò. Se l'operatione è buona, bisogna, che le oncie 25. da 20. contenghino parimente in sè le sudette onc. 20 -- 20. d'oro puro; e per saperlo si dice. Se onc. 1. hà caratti 20. d'oro fino. Quanti n' haueranno onc. 25? operando, n' haueranno pur onc. 20.-20. Adunque stà bene.

Quesito Quinto.

Vn Contadino troua lauorando nel suo Campo trè pezze d'oro di diuerse leghe, ò qualità. Le porta a vendere; e troua, che il primo pezzo valeua Scud. 50. la Marca. Il secondo ne valeua 60, & il terzo valeua scu. 80. Per cauarsi mò lui di briga, le vendette sottosopra scù. 70. la Marca. S'addimanda. Quanto pesaua ciascun pezzo da per sè?

Que-

Questa, e simili si legano, come la passata, e ne verano questi numeri differentiali, posti sotto li prezi, cioè 10. 10. $\frac{20}{70}$. Non si passa più oltre per esser finita l'operatione. Adunque.



Il primo pezzo pesaua Marche 10. a scud. 50. l'vna,
Il secōdo pezzo pesaua March. 10. a scud. 60. l'vna,
Il terzo pezzo pesaua Marche 30. a scud. 80. l'vna;

Marche 50.
Valeuano Scud. 500.
Valeuano Scud. 600.
Valeuano Scud. 2400.

Scud. 3500.

Se ne vuoi la proua, moltiplica le Marche 50. per li Scudi 70. che il Contadino vendette l'oro sottosopra per Marca; e fanno pure Scud. 3500.

Quesito Sesto.

Vn altro hà 2. Verghette d'oro, che tutte due insieme furono vendute Scud. 150, e tutte due parimente insieme pesauano oncie 12. Vna di esse, per esser d'oro fino, fù giudicata valere Scud. 100. la Libra; e l'altra non tanto buona, fù stimata, che valesse a ragion di Scud. 70. la Libra. Hor s'addimanda, Quanto pesaua ciascuna di dette Verghette?

Legãdo li due prezi al solito, ne viene 50,& 80.che vniti insieme fanno 130. Di poi si dice. Se 130.mi da 80. Che mi daranno onc.12? Daranno onc.7 $\frac{5}{13}$, e tãto pesaua la Verghetta da Scudi 100.la Libra. E poi. Se 130. mi dà 50. Che mi daranno onc. 12? Daranno onc.4 $\frac{8}{13}$, e tanto pesaua la Verghetta non tanto fina da Scud. 70. la Libra.



Altra sorte di questi propongono li Scrittori di questa Scienza, pertinenti alla compositione dell'oro, e dell'Argento: quali (senz'altra instruttione) da chi possiede bene la Regola de proportionali si sapriano risoluere: nondimeno, per non degenerare da gli altri, ne proporrò alcuni pochi: acciò facendo strada, &c. non mi parti contutto. ciò dal mio supposto Ristretto.

Quesito settimo.

Mi trouo hauer Lib.15 d'Argento di Leghe 10 $\frac{1}{3}$. Volendolo abbassare, e farlo di 9. quanto Rame ci vorrà?

Leua 9.da 10 $\frac{1}{3}$, e restarà 1 $\frac{1}{3}$. E poi dirai. Se 9. vuoi crescere 1 $\frac{1}{3}$. Quanto cresceranno Lib. 15? Operando, cresceranno Lib. 2 $\frac{2}{3}$. per il Rame, che deui aggiongere.

Quesito Ottauo.

Lib.20.d'Argento di Leghe 9 -- 10, voglio farlo di Leghe 11, con aggiongerui Argento puro. Quanto Argento ci vorrà?

Dalla finezza 12, bisogna leuare la Legha, che si pretende di fare, cioè 11, e restarà Leg. 1. Parimente dalle Leg.11 si leuino le Leg.9--10, e restaranno Leg.1.--Dē. 14. E poi si dice. Se Leg.1 -- 14. vuol Leg.1. Quanto voran-

ranno Lib. 20? Voranno Lib 12. Den. 15. Gran. 3 $\frac{13}{19}$.

Quesito Nono.

Vn Zecchiero hà Lib. 12. d'Oro da 22. 22. Lo vorria ridurre da 21. 21. con l'aggiongerui oro da 18 -- 15. Quanto ve n'hà d'aggiongere?

La solutione di questo quesito non è molto dissimile dal precedente. Troua la differenza della finezza, che hà l'Oro, che vuoi aggiongere con l'oro, che vuoi comporre, e con le Lib 12. La differenza da 18. 15. a 21 -- 21 è Carat. 3. gran. 6. e la differenza da 18. 15. a 22. 22. è Carat. 4. gran. 7. Fatto questo, si riducono li Caratti in Grani, che sono Gran. 78. & 103, e poi si dice. Se 78. vuol 103. quanto vogliono Lib. 12? Operando, ne vengono Lib 15. Oncie 10. Carat. 3. Gran. 16 $\frac{24}{19}$ per il peso, che sarà il composto, che pretendi di fare da 21. 21. dal quale leuandone Lib. 12. ne restano Lib 3 -- 10 -- 3 16 $\frac{24}{39}$, per la quantità dell'Oro da 18. 15, che deui aggiungere alle Lib 12, da 22. 22. acciò diuenghi in finezza da 21. 21. Quì di passaggio bisogna auuertire, che la differenza dell'Oro, che voi aggiongere a quello che pretendi comporre, serue per il primo termine della Regola Aurea. Di più in simili quesiti; il Quotiente è della natura del terzo termine per la ragione allegata a cart. 45. Finalmente sij auuertito, che nell'operare il primo auanzo si moltiplica per 12, per cauarne le onc. Il secondo auanzo si moltiplica per 24, per hauerne li Caratti, ò Den. & il terzo auanzo si moltiplica pur per 24. per cauarne li grani, come in figura si vede, (E ciò serui d'auuiso.)

78 -- 103 -- 12
12

78 -- 1236 -- Lib. 1
78.

456
390

66, Primo auanzo.
12

78 -- 792 -- onc. 10.
78

12. Secondo auanzo.
24

78 -- 288 -- Carat. 3.
234

54. Terzo auanzo.
24

78 -- 1296 -- Gran. $16\frac{24}{78}$
78

516
468

48

Quesito Decimo.

Vn Orefice hà onc. 15. d'oro da 16, & onc. 10. da 18. Volendolo ridurre alla finezza da 20, con aggiongerui oro

oro fino (cioè da 24.) Quanto ve n'hà d'aggiongere?

Primieramente si moltiplica il peso di ciascun Oro cõ la sua finezza, e la somma de Prodotti, diuisa per la sõma de pesi, nel Quotiente lasciarà la finezza del cõposto de due pesati Ori. Come qui di sotto in figura si vede.

Onc.15 da 16--Prod.Comp.ouer potẽza 240.
Onc.10 da 18--Prod. Comp.ouer potẽza 180.

Diu.25. Somma de Prodotti--420 Quot.16 4/5.

Siche le Onc.15.da 16.e le Onc.10.da 18.incorporate insieme, la massa sarà in finezza da 16 4/5. Voglio dire, che saranno Onc.25.da 16 4/5.

Per saper mò quant'oro fino da 24. bisogni aggiongere alle onc.25 da 16 4/5, acciò la massa diuenghi in finezza da 20. si caua da Caratti 24, li caratti 20. e ne restano Caratti 4. Parimente da Caratti 20 si caua li Caratti 16 4/5, e ne restano Caratti 3 1/5, è poi si dice. Se 4 vuol 3 1/5 Che vorranno Onc 25? Operando ne vorrãno Onc.20, e tant'oro puro bisogna aggiongere alle Onc. 25. da 16 4/5, ed hauerai poi onc.45. da 20. La proua si fà, come hò insegnato nel quarto quesito.

Quesito Vndecimo.

Vno si troua hauere onc.10.d'oro da 16, & onc. 6.da 20. Volendolo abbassare, e ridurlo à finezza solamente da 18. Quanto Argento, ò Rame ci vorrà?

Moltiplica ciascun peso con la sua finezza, ed hauerai quelli due Prodotti, ò forze 160, e 120, quali vniti Insieme fanno 280, e poi dirai; se Caratti 18 (finezza, che pretendi) vuol onc.1, d'oro legato; Quanto ne vorrà 20? Operando ne vorrà onc.17 1/2, dalle quali leuando le onc. 8, e 6. che da principio proponesti, ne restaranno solamente onc. 1 1/2 per l'Argento, ò Rame d'aggiongersi. La proua come nel quarto quesito.

Que-

Quesito Duodecimo.

Voglio fondere, e vnir insieme trè qualità d'Oro; cioè onc.8 da 20. onc.6. da 18, & Onc.10 da 22. Di che finezza sarà tal compositione?

Prestissimo lo sopraì. Basta à moltiplicare insieme (al solito) ciascun peso con la sua finezza, e li Prodotti vniti insieme, partirli per la somma de pesi; perche il Quotiente sarà la cercata finezza.

Onc. 8 da 20--Prodotto,ò forza 160
Onc. 6 da 18--Prodotto,ò forza 108
Onc.10 da 22--Prodotto,ò forza 220

Diu. 24 Somma de Prodotti 488-Quot.20 $\frac{8}{24}$ per la (cercata finezza

Notabile.

Qui auuiso chi legge, che l'oro, e l'Argento legato, si può ridurre a maggior perfettione,ò leuandoli cõ acquà forte la lega; ò purificandolo col fuoco nel Capello. E questo atto si chiama Saggio, cioè far esperienza quanta finezza acquisti l'Oro capellando. Quanto più cala di peso,tanta maggior finezza, e perfettione acquista, &c. intorno al che si può proporre nuoua sorte di quesiti, che con vn poco d'ingegno ancor loro si risoluono per via di proportione.

Quesito Terzodecimo.

Mi ritrouo hauere Onc. 12. d'Oro da 20. lo fondo, e affino in tanto, che mi resta Onc. 10. di che bontà sarà restato?

Per la Regola del tre Rouersciа dirò. Se 12 hà la bontà di 20. Che bontà mi darà 10? Operando ne viene 24, siche sarà restato Oro fino da Caratti 24 l'Oncia.

Que-

Quesito Quartodecimo.

Hauendo purgato Denari 14. d'Argento è restato Den. 14. Di qual finezza era; quando congionto staua con la massa?

Per la Regola Dritta si dice. Se Car. 16 restorno 14. Che restariano Legh. onero Onc. 12? Restariano 10 $\frac{1}{2}$. Si conclude, che la massa dell'Argento, dalla quale ne furono leuati, e purificati Den. 16, è di finezza Leghe, onero Onc. 10, Den. 21. E tanto basti.

DELLE POSITIONI FALSE SEMPLICI.

CAP. XXIV.

QVesta Regola si chiama anco Regola del Cattaino; inuentata da gli Arabi, & è l'istesso, che falsa positione in lingua Italiana. Si chiama parimente Regola del falso: ò perche con falso supposto, o figurato si troua la verità: ò pure perche ella medesima mai risponde con verità alla domanda, mà sempre dice più; ò meno del vero. Ben è vero, che la di lei falsità dà entrata, per riportarne la pretesa verità. Questa Regola serue per risoluere li quesiti, quando mancano di qualche termine, senza il quale è impossibile il sottoporli alla Regola di proportione; e per consequenza il risoluerli. Queste positioni sono di due sorti, cioè semplici, che con vn sol figurato, si risoluono li quesiti, e doppie, che ne ricercano due. Per mezo delle doppie si risoluono molti quesiti, che per la sola semplice non si potriano tirar in luce. Vero è, che non si può dar mò certa regola, per conoscere quando per l'vno, e quando per l'altro modo s'habbia da operare: ma posto in dubbio: s'operi prima per la sem-

semplice (come di men fatica) e se non basta, si ricorri alla doppia. Alla pratica.

Quesito Primo.

Tre compagni di Mercantia deuono sborsare Scudi 1000. con quell'ordine, che il secondo, ne sborsi il doppio del primo, & il terzo tre volte più del secondo. S'addimanda. Quandi Scudi per vno deuono sborsare?

Si fa così. M'immagino, che il primo sborsi scud. 100. e per consequenza il Secondo 200, & il terzo 600, che vniti insieme fāno scud. 900. ma perche ne vorrei 1000, adunque la mia positione, ò figurato è falsa. Per cauarne mò la verità, si dice per la Regola del tre. Se scud. 900. vengono da scud. 100. da scud. 200. e da scud. 600. Da quanti veranno scud. 1000? Veranno da scud. 111 $\frac{1}{9}$. per il primo; da 222 $\frac{2}{9}$ per il secondo, e da 666 $\frac{6}{9}$ per il terzo. Somma insieme queste tre partite, e faranno di punto scud. 1000. Questo quesito si potria risoluere per la Regola delle Compagnie, immaginandosi 1 per il primo; 2. per il secondo, e 6 per il terzo; che in tutto fariano 9 per capitale, &c.

Quesito Secondo.

Interrogato vn Caualiere quanto spendese all'Anno in casa sua, rispose. Io spendo $\frac{1}{3}$ delle mie entrate per il vito; $\frac{1}{4}$ per il vestito; & $\frac{1}{8}$ in seruitù, Carrozza, &c. ed in queste tre cose vi spendo scud. 6750? S'addimanda. Quanta entrata haueua questo Caualiere all'Anno?

A capriccio m'immagino, ch'haueße scud. 12000 d'entratta all'Anno; $\frac{1}{3}$ de quali sono 4000. vn quarto 3000. & vn festo 2000 che vniti insieme fāno 9000. Ma perche nō ne voglio se non 6750; la mia positione è falsa. Diciamo dunque così. Se scud. 9000. prouengono da scud. 12000.

Da

Da quanti verranno ſcu. 6750? Vengono da ſcud 9000. E tale è l'entrata del Caualiere. Cauane $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$, che faranno di garbo ſcud. 6750. Però ſtà bene.

Queſito Terzo.

Vn amico dice ad vn ſuo confidente Per gratia del Signore hò fatto buona raccolta, ho hauuto in mia parte tante Moggia di Formento; che ſe n'haueſſi la metà, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ di più n'haurei 36 Moggia. S'addimanda. Quante Moggia n'hà?

In queſto, e ſimili queſiti, oue ſono rotti, ancorche ſi poſſi pigliare, ò immaginarſi vn numero di capriccio: tuttauia per fuggire li rotti, è bene pigliar ſempre (per la Regola dell'Accattare) vn numero, ch'habbia le parti de'propoſti rotti: che nel caſo noſtro per il minimo è 125. al qual 12. aggiongendoui le parti d'eſſi rotti, cioè 6 per la metà; 4 per $\frac{1}{3}$, e 3. per $\frac{1}{4}$; fanno 25. Et io vorrei, che foſſero 36. E perciò dico. Se 25 viene da 12. Da che verrà 36? Verrà da $17\frac{7}{25}$. E tante Moggia di Formento hà l'amico.

Queſito Quarto.

Vn altro in tal propoſito riſpoſe: Hò tante Corbe di Formento, che $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{7}$ d'eſſe gionte inſieme, fanno in tutto 72. Quante corbe n'hà?

Il 60. hà le parti de'propoſti rotti, che ſono 20. 15. 12; quali vniti inſieme fanno 47. Et io ne vorrei 72. però dico. Se 47. viene da 60. Da quanto verrà 72? Verrà da $91\frac{43}{47}$. E tante Corbe hà, &c.

Queſito Quinto.

Vn altro riſpoſe. Hò tanto Grano, che poſtone $\frac{1}{5}$ da banda per la caſa; $\frac{1}{4}$ per ſeminare; e $\frac{1}{6}$ per altri riſpetti; me ne auanzano poi anco 150. Moggia da vendere. Quanto Grano hà?

Il minimo numero de' sudetti rotti è 12; dal qual cauatone 9 per $\frac{1}{3}$, per $\frac{1}{4}$, e per $\frac{1}{8}$; ne restano 3. Ma perche ne vorrei 50, dirò. Se 3. viene da 12. Da che verrà 50? Verrà da 200? E tante Moggia hà in tutto quel tale. Fanne la proua cauando da queste 200. Moggia $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, e restaranno appunto 50. Moggia.

Quesito Sesto.

Vn altro dice. Haueuo tante Bestie Bouine, ch'hauendomene mangiato il Lupo $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$. Il resto poi cresciuto, e moltiplicato in sè stesso, m'hà dato il numero di prima. Quanti capi n'haueua?

Il numero de' rotti è 12; dal quale cauatone 7 per $\frac{1}{3}$, e per $\frac{1}{4}$, ne resta 5: quale moltiplicato in sè stesso, fà 25: ma perche ne vorrei solamente 12, dirò. Se 25 viene da 12. Da che verrà pur 12? Verrà da 5 $\frac{12}{25}$. E tanti capi n'haueua.

Quesito Settimo.

Vn disse ad vn suo confidente. Hò tanti Vngari, che s'io n'hauessi solamente 6 delli vostri n' hauerei tanto, quanto hauete voi. L'altro rispose. E s'io n'hauessi pure 9 de' vostri, n'hauerei poi due volte più di voi. Quanti Vngari haueua ciascun di loro?

Se il primo riceuesse li 6 Vngari dall'altro: chiara cosa è, che n'haueria poi la metà di quello, ch' hanno frà tutti due: e se l'altro parimente riceuesse li 9. Vngari dal primo, esso n'haueria $\frac{2}{3}$ di quello, c' hanno frà tutti due. Ma perche $\frac{1}{2}$, e $\frac{2}{3}$ sono più d'vn tutto; e quel più del tutto necessariamente deue essere la somma di quello, che vicendeuolmente l'vno domanda all'altro, (che nel caso nostro sono 15) però bisogna trouare vn numero, che la metà, e $\frac{2}{3}$ facciano 15. Potrei pigliarlo a capricio, mà (come dissi) per scansar rotti m' appi-

glio

glio al 6, (minimo numero de preſenti rotti.? Per la $\frac{1}{2}$ ne piglio 3. = per li $\frac{2}{3}$ ne piglio 4. che vniti inſieme fanno 7. Vn ſolo più del tutto. Ma perche biſognaria, che foſſero 15, dirò. Se 1. viene da 6. Da quanto verrà 15. verrà da 90. E tâti Vngari hâno frà tutti due. Cauane 6 dalla metà, e ne reſtano 39 per il primo. Cauane parimente 9 dalli $\frac{2}{3}$, e ne reſtano 51. per il ſecondo. Fanne la proua coſi. Fà che il ſecondo dia 6 Vngari al primo, che queſto con li 39, che hà, ne farà 45. e quell'altro, (che dì 51 ſe ne priua di 6) reſta ancor lui con 45. Parimente, ſe il primo dà 9 Vngari al ſecondo; lui reſtarà con 30, e l'altro con li ſuoi 51 ne faria 60; cioè due volte di più del primo. Adunque ſtà beniſſimo. Adunque il primo ha in borſa Ongari 39, & il ſecondo 51.

Queſito Ottauo.

Vn capo di famiglia per ſuo biſogno hà cõprato Moggia 6 di Formentone. Moggia 8. di Faua, e Moggia 12. Formento. Non ſi ricorda quanto lo habbia pagato il Moggio. Sà bene, che hà ſpeſo Scud. 250. e la Faua li coſtò il doppio del Formentone, ed il Formentone vna volta, e meza più della Faua. Quanto ſpeſe per ciaſcuna ſorte de propoſti Grani. E quanto per Moggio?

Io ſuppongo a mio capricio, che il Formentone vaglia ſcudi 6 il moggio. La Faua per ragione 12, ed il Formẽto 18 (cioè vna volta è meza di quello coſtà la Faua.) Fatto queſto, biſogna vedere quanto coſtariano le propoſte moggia di robbe a ragione del ſuppoſto prezo. Le 6 moggia di Formentone coſtariano ſcu. 36. Le 8. Faua 96, e le 12 di Formento 216. che vniti inſieme ſono ſcud. 438. ma perche non ne vorrei altro, che 250, hauendo errato nella mia elettione, dirò; ſe 348. viene da 6. Da quanto verrà 250? Verrà da $4\frac{2}{29}$. E tanto vale il moggio del Formentone. La Faua il doppio, cioè Scud. $8\frac{18}{29}$, & il Formento ſcud. $12\frac{27}{29}$. Adunque (facendone il conto) le

mog-

moggia 6 di Formentone costano scud. 25 $\frac{25}{29}$. Le moggia 8. di Faua Scud. 68. $\frac{28}{29}$, e le Moggia 12 di Formento scud. 155. $\frac{5}{29}$, che in tutto sono Scud. 250. Però stà bene la ragione.

Quesito Nono.

Vn altro interrogato, quanti Anni hauesse, rispose. N'hò tanti, che, se n'hauessi altri tanti; la metà di tanti; & in oltre $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{7}$, e di tanti 1. di più, hauerei Anni 100. Quanto tempo hà costui?

Perche questi rotti si contengono in 60. Io m'immagino ch'habbia 60. Anni, e 60. per altri tanti; e 30. per la metà; e 20. per il terzo; e 15 per il quarto: e 12. per il quinto; che vniti insieme fanno 197, & 1 di più sono 198, & Io vorrei, che fossero 100. Però dico. Se 198. fossero 100. Che sariano 60? Sariano anni 30, mesi 3, giorni 19, hore 2, $\frac{2}{11}$. E tanti anni l'hà amico.

Quesito Decimo.

Vn Fattore porta lir. 60. al suo Padrone, per certe colarelle vendute, & il Padrone rispose, che se le teneste per $\frac{1}{7}$, e per $\frac{1}{6}$ del suo salario. Sarei curioso di sapere, quanto salario habbia all'Anno detto Fattore.

Si fà cosi. Il numero di $\frac{1}{7}$, e di $\frac{1}{6}$ sono 30. da questo numero 30. cauane 11. per $\frac{1}{7}$, e per $\frac{1}{6}$, e ne restarà 19. mà perche ne vorressimo 60; Dirò. Se 19 viene da 30. Da che verrà 60? Verrà da lir. 94. sol. 14. den. 8, e $\frac{16}{19}$, e questo è il salario del Fattore.

Quesito Vndecimo.

Vn Mercante compra tre pezze di panno: nè si ricorda per quanto: sà bene che spese lir. 360, e che la seconda costaua lir. 23. più della prima; e la terza lir. 15. più della seconda. Vorrei sapere. Quanto costò ciascuna pezza da sè?

Sup-

Suppongo, che la prima pezza costasse lir. 1. La seconda lir. 24. e la terza lir. 40. che vnite insieme fanno lir. 65. quali si deuono cauare dalle lir. 360. Il che fatto, restano lir. 265. da partire in 3. parti eguali; perche 3. sono le pezze di panno; (cioè lir. 98 sol. 6. den. 8. per pezza.) Per la prima aggiongi lir. 1, e faranno lir. 99. sol. 6. den. 8. Per la seconda aggiongi lir. 23, e faranno lir. 122. sol. 6. den 8. E per la terza aggiongi lir. 16, e faranno lir. 138. sol. 6. den. 8. E questo è il prezo delle 3. pezze di panno. Somma insieme le trè partite, e faranno di punto lir. 360.

Quesito Duodecimo.

Vn Mercante và ad vna Fiera con certa quantità di Scudi; oue d'ogni 4 fece 5. Si partì poi; & altroue con tutti li denari, che si trouaua hauere, nuouamente di 6 fece 9. Vltimamente ad vn altra Fiera moltiplicò tanto tutti li Scudi: che d'ogni 9 fece 12, & in tutto si trouò hauere scudi 600. Vorrei sapere con quanti scudi si partì da Casa questo Mercante?

In questo, e simili quesiti, si comincia di dietro, cioè dall'vltimo guadagno; e però dirò. Se 12 era 9. Che fù 600. Fù 450. E con tanti scudi si partì dal secondo luogo: e perche iui di 6 fece 9, dirò. Se 9 era 6. Quanto fù 450? Fù 300. E con tanti scudi si partì dalla prima Fiera: ma perche iui di 4 fece 5, dirò. Se 5 era 4. Che fù 300? Fù 240. E con tanti Scudi si partì da Casa il Mercante. Fanne la proua voltando la ragione. Se 4 era 5. Che 240? e così con le altre poste, e la trouarai buona.

DELLE POSITIONI FALSE DOPPIE.

CAP. XXV.

Quesito Primo.

TRè compagni hanno da spartirsi frà di loro scudi 200. con queste conditioni. Il secondo n'hà d'hauere il doppio del primo, e 10 di più. Il terzo n'hà d'hauere quanto hà il primo, & il secondo insieme, e 20 di più. Quanti Scudi hauerà ciascun di loro?

Prima di rispondere, ammaestrando chi legge, dico: che li quesiti da risoluersi per questa Regola, mancano sempre d'vn termine nel supposto: senza la cui notitia è impossibile il rispondere alla domanda. Questo termine incognito nel proposto quesito è la quantità de' Scudi, che deue hauere il primo compagno: il che saputo; la risolutione del quesito non porta difficoltà alcuna. State attento. Ma si come il Pittore, per formare in piano vna figura irreprensibile, si fà far modello, per hauere li panneggiamenti, li gesti, li scurtij, &c. e secondo li quali và poi operando: così conuiene, che noi ci facciamo vn modello per hauerne l'intento. Per fondamento mò, e per base di questo modello si batte sempre l'occhio adosso a quel termine, che manca: assegnando noi, e determinando tal quantità a nostro capriccio: e poi di mano in mano operando con tal fondamento, secondo che richiede la proposta. Vero è, che le conclusioni delle nostre due positioni, ò modelli daranno tutte due alle volte più: alle volte meno: &. alcune altre volte vna darà più, e l'altra meno di quello, che vorressimo. E però tutto il punto di questo negotio consiste principalmente in sapere, & hauere sem-

pre

pre alla memoria, che quando tutte due daranno più, ò tutte due meno: in tal caſo ſi caua la differenza degli errori per la ſottratione d' vno dall' altro: & vn Prodotto dall'altro: ma quando l' errore d' vna poſitione ſarà più, e l'altro meno, all' hora ſi ſommano tanti gli errori, quanti li Prodotti. Et acciò meglio s' imparino queſti termini, qui li metto in figura.

Si che { Più, e Più / Men, e Men } Si ſottra.
Si che { Più, e Men / Men, e Più } Si ſomma.

Due modi d'operare inſegnano li noſtri Antichi Scrittori: ma quì (per fuggire la confuſione) inſegno il modo di che mi ſeruo, come più facile, e di manco operatione. O riſoluiamo il queſito.

Prima poſitione, ouer Modello.	Seconda poſitione, ouer Modello.
Habbia d' hauere il primo compagno Scud. 40	Habbia d'hauere il p. ſc. 30
Il ſecondo n'hauerà 90	Il ſecondo n' hauerà 70
Et il terzo 150	Et il terzo 120
Riuſcita. Scud. 280	Riuſcita. Scud. 220
Si che hò d' auãtaggio ſcudi 80	Si che hò d'auantag ſc. 20.

Fatto queſto: ſi mette in ordinanza ciaſcun principio delle poſitioni con il sbaglio, ò differenza loro, (come quì da canto in figura ſi vede, e moltiplicando-

Concluſione.
Per 40 × più 80. Pro. 2400
Per 30 × più 20. Pro. 800
Diuiſ. 610. 1600
Quot. ſcud. 26 3/5

li in croce, si colocano li Prodotti vno sotto l'altro. Finalmente, perche tutti due gli errori sonó più, bisogna, (come di sopra hò auuertito) sottrare vn Prodotto dall'altro; & vna differenza dall'altra; e poi partendo per il resto delle differenze, il resto de' Prodotti; nel Quotiente s'haueranno li Scudi, che deue hauere il primo compagno. E perche il nostro Quotiente è $26\frac{2}{3}$. Concludo, che al primo compagno toccano scudi $26.\frac{2}{3}$. Al secondo $63.\frac{1}{3}$ & al terzo 110, che vniti insieme fanno appunto scudi 200.

Di più.

Habbia d'hauer il primo scud. 20	Habbia d'hauere il primo scud. 25
Il secondo n'hauerà 50	Il secondo n'hauerà 60
Il terzo 90	Et il terzo 105
Riuscita della positione sc. 160	Riuscita della positione scud. 190
Si che mi mancano scu. 40	Si che mi mancano scu. 10

In questa secónda operatione notate, che in tutto, e per tutto s'è operato, come nella prima risolutione: perche tutti due gli errori, ò differenze delle positioni sono meno del douere, e con tutto ciò di Quotiente ne vengono pure li scudi $26\frac{2}{3}$, per il primo compagno &c.

Conclusione.

Per 20 men 40 Pro. 1000
Per 25 ⋈ men 10 Pro. 200

Diuis. 310 — 8010
Quotien. Scud. $26\frac{2}{3}$

In oltre.

Habbia d'hauere il primo ſcud. 28	Habbia d'hauer il primo ſcud. 24
Il ſecondo n'hauerà 66	Il ſecondo n'hauerà 58
Ed il terzo 114	E il terzo 102
Riuſcita delle poſitioni Scud. 208	Riuſcita delle poſitioni ſcud. 184
Si che hò di più Scud. 8	Siche hò di meno ſcud. 16

In queſta terza operatione in tutto, e per tutto s'è operato, come per gl'altri due modi: eccetto che in vece di ſommare ſi ſono ſottrati li Prodotti, e le differenze, ouero gli errori, e pure anco per queſta operatione ne vengon li ſcud. 26 $\frac{2}{7}$ per il primo compagno. Chi hauerà mò ben inteſo quanto di ſopra, per l'auuenire ſi contentarà di poche parole.

Conclusione.

Per 28 × più 8. Prod. 192.
Per 24 × mẽ 16. Prod. 448.

Diuiſ. 24. -- 640.
Quotiente Scud. 26 $\frac{2}{24}$.

Queſito Secondo.

Vn Caualiere fà far certi lauori a giornata, e col Maſtro è d'accordo, che il lauoro ſia finito nel termine di 40 giorni. Che quando lauorarà li darà ſoldi 25 il giorno, e quando occorreſſe, che non lauoraſſe, egli perdi Sol. 30 pur il giorno. Il Maſtro fece il lauoro nel preſcritto termine; ma non guadagnò ſe non ſold. 18. Domando, Quanti giorni lauorò, e quanti non lauoro?

Habbia lauorato giorni 25, ne quali guadagnò ſold. 625, e per giorni 15, che non lauorò, perſe ſold. 450. quali ſottrati da ſold. 625, che guadagnò, ne reſtano 175, ma perche ne vorrei ſolamente 18. hò errato di ſol. di 157, di più. Si che biſogna far nuoua poſitione.

Habbia lauorato gior. 20, ne quali guadagnò Sol.500,e per altri giorni 20, che non lauorò perse Sol 600. da quali leuãdo li Sol.500,che guadagnò, viene a perder soldi 100. ma perche ne deue guadagnare 18, hò errato di sold. 118. di meno. Nel resto, operando secondo l'accennato auuertimẽto del più,e meno, e come nella conclusione si vede, il Maestro lauorò giorni 22 $\frac{8}{11}$, ne quali guadagnò sol.553 $\frac{7}{11}$;e per giorni 17 $\frac{47}{55}$,che non lauorò, perse sol.537 $\frac{7}{11}$, quali sottrati da sol. 553 $\frac{7}{11}$, che guadagnò,restano S.18,come fù proposto. Adũque,&c.

Conclusione.

Per 25 più 157.P.3 140
Per 20 mẽ 118.P.2950

Diuis.275 — 6090.22 $\frac{8}{11}$
550.

Quot.scud.22 $\frac{8}{11}$ 590
550

40.

Quesito Terzo.

Sacchi 20 di Formento costano tanto più di Lir 400 quanto che Sacchi 12.costano meno di Lir 300.Quanto val il sacco?

Il termine,che manca nel supposto di questo quesito, è la valuta del sacco. O questo sia il fondamento, & il Modello della mia positione, & il Formento costi Lir 30. il sacco. Se così è li sacchi 20.costariano Lir.600.e li sacchi 12 Lir 360, ma perche li sacchi 20. superano di valuta Lir 200 più del proposto 400. ne siegue, che li sacchi 12 doueriano ancor essi costare Lir 200 meno di 300.siche bisognaria,che li sacchi 12 costassero solamẽte Lir 100.ma perche ne costano 360, hò errato il modello, per la valuta di Lir 260.di più. Facciamone vn altro.

Costi il sacco Lir 25.anche sacchi 20.costaranno Lir. 500. e li sacchi 12,Lir 300, ma si come li sacchi 20. costano

ſtano Lir 100 più del noſtro 400. così li ſacchi 12 doue-riano coſtare Lir 100. meno di 300. cioè doueriano coſtare ſolamente Lir 200, mà perche ne coſtano 300. anco in queſta ſeconda poſitione hò errato di Lir 100 più del douere. Operando mò ſecondo la regola del più, e più, il ſacco del Formento coſta Lir 21 $\frac{7}{8}$, come nella concluſione ſi vede. E che ciò ſia la verità, moltiplicando li ſacchi 20 per Lir 21 $\frac{7}{8}$, ne vengono Lir 437 $\frac{1}{2}$ (cioè Lir 37 $\frac{1}{2}$ più di 400) e moltiplicando li ſacchi 12. anco per Lir 21 $\frac{7}{8}$, ne vengono Lir 262 $\frac{1}{2}$, (che appunto ſono Lir. 37 $\frac{1}{2}$ meno di 300.) Però ſtà bene.

Concluſione.

Per 30 — più 260. Prod. 6500
Per 25 — più 100. Prod. 3000

Diuiſ. 1610 — 3500
Quotiente Scud. 21 $\frac{7}{8}$.

Queſito Quarto.

Vno vende vna Poſſeſſione di Tornature 180. Nouanta di Prato, e 90. d'aratiuo. Vna Tornatura di Prato, ed vna d'aratiuo inſieme coſtano frà tutte due ſcudi 200. Mà ſe il Prato concedeſſe all'aratiuo $\frac{1}{5}$ del ſuo valore per Tornatura: e l'aratiuo ne donaſſe $\frac{1}{5}$ al Prato; con queſta reciproca donatione, e col proprio valore la Tornatura dell'vno, e dell'altro ſeparatamente haueria ſcudi 100. Quanto coſta la Tornatura del prato; quanto quella dell'aratiuo, e quanto fù venduta la poſſeſſione?

In queſto queſito, perche vna Tornatura di prato, & vna d'aratiuo coſtano ſcud. 200, biſogna far di queſti ſcudi 200, due parti, rappreſentanti il prezo di ciaſcuna Tornatura: auuertendo (per fuggir rotti) che ſiano diuiſibili per $\frac{1}{5}$, e per $\frac{1}{8}$, ſecondo la propoſta. Suppongono dunque, che la Tornatura del prato coſti ſcudi

80. e quella dell'aratiuo scud. 120, che vniti insieme fanno 200. Adesso mò posso applicarmi col Modello a qual si voglia di questi due pezzi. (Io m'appiglio però al prezo del prato, e dico così) Se il prato dà all'aratiuo $\frac{1}{7}$ del suo prezo; esso di scud. 80. la Tornatura, restarà solamente con scud. 64. ma riceuendo poi dall'aratiuo $\frac{1}{6}$ la Tornatura del Prato viene à costare scud. 84. & io hò detto, che dopo la reciproca donatione l'vna, e l'altra Tornatura haueria scud. 100. Adunque hò errato nel meno di scud. 16. O facciamo la seconda positione.

Vaglia la Tornatura del Prato scudi 50, e quella dell'aratiuo 150, che vniti insieme fanno 200. Se la Tornatura del prato si priua d'$\frac{1}{7}$ del suo valore, e poi riceui $\frac{1}{7}$ dell'aratiuo, haurà *ad sumum* scud. 65 e io vorrei, che fossero 110. Si che anco la seconda volta hò errato nel meno di scud. 35. Operando secondo la regola della conclusione, la Tornatura del Prato costa a prezo reale scud. 105 $\frac{5}{19}$, e quell'aratiuo il resto sino a 200. cioè scud. 94 $\frac{14}{19}$: Per farne la proua, ciascuno dia all'altro secondo l'accordo, & haueranno 100 per vno.

Conclusione.

Per 80 ✕ men 16. Pr. 800
Per 50 ✕ men 35. Pr. 2800

Diuis. 19 -- 2000
Quotiente Scud. 105 $\frac{5}{19}$

Proua.

Prezo del prato scu. 105 $\frac{5}{19}$	Prezo dell'aratiuo sc. 94 $\frac{14}{19}$
Per vn quinto scud. 21 $\frac{1}{19}$	Per vn sesto scud. 15 $\frac{15}{19}$
Priuo d'vn quinto sc. 64 $\frac{4}{19}$	Priuo d'vn sesto scud. 78 $\frac{18}{19}$
Per $\frac{1}{6}$ riceu. dall'arat. 15 $\frac{15}{19}$	Per $\frac{1}{7}$ riceu. dal Prato 21 $\frac{1}{19}$
somma pretesa scud. 100.	somma pretesa scud. 100.

Adun-

Adunque il queſito è ben riſolto. Per ſaper mò quanto fù venduta la Poſſeſſione: baſta a moltiplicare 200. per 90, e ne veranno ſcud. 18000 per la valuta di eſſa, e queſta è la ragione; perche il 90 è la metà delle Tornature di tutta la poſſeſſione; e li ſcudi 200. è il prezo di due Tornature inſieme: vna di Prato, & vna d'aratiuo. L'iſteſſo verrà moltiplicato le 90 Tornature di Prato, e le 90 d'aratiuo con il proprio prezo &c.

Queſito Quinto.

Vn Mercante compra alquante Centenaia di Canepa con vn tanto di tara per 100, nè d'altro ſi ricorda, ſe non che il coſto del cento era triplo, cioè trè volte tanto, quanto era la tara per 100, e 15 di più. In oltre ſi ricorda, che la valuta di tutte le Centenaia era vintupla, cioè 20. volte più che il valore del 100. e della tara inſieme, più 200, e la ſomma del tutto, arriuò alla quantità di Lir 935. Quanto coſtò la Canepa il 100. Quanto fù la tara. Quante Centenaia ne comprò, e quanto ſpeſe in tutto?

Sia la tara 3. Triplicata fà 9. più 15, fà 24, (Valuta della Canepa il cento) A queſta valuta giontoui la tara, fa 27. quale moltiplicato per 20, fà 500. Più 200. fà 740. (Valuta di tutte le Centenaia comprate.) A queſto valore giontoui il coſto del 100, e la tara; cioè 3, & 24. in tutto fà 767: ma perche ne vorrei 935. hò errato nel meno di 168. Ò facciamo la ſeconda poſitione. Sia la tara 4. Triplicata fà 12. Più 15, fà 27. (Valuta del 100.) A queſta valuta giontoui la tara, fà 31. quale moltiplicato per 20, fa 620. Più 200. fà 820 (Valuta di tutte le Centenaia comprate) A queſto prezo giontoui la tara, & il coſto del Cento, cioè 4, & 27, in tutto s'hauerà 851, ma perche ne vorrei 935, anco la ſeconda volta hò errato nel meno di 84. Operando, la tara fù 5.

Pro-

Proua.

Se 5. fù la tara : triplicata, ed al Prodotto giontoui 15, la Canepa costò Lir 30. il Cento. Se a 30. s'aggionge la tara 5, e poi si moltiplichi per 20, s'haurà 700, al quale giontoui 200, fa 900, per la valuta di tutte le Centenaia. Finalmente sommando insieme 5. per la tara, 30 per il costo del Cento, e 900. per il costo di tutte le Centenaia, s'haurà 935. come fù proposto. Adunque stà bene; Adunque la tara fù 5. Il Cento costò Lir 30. Trenta furono le Centenaia, e Lir 900. fù la spesa.

Conclusione.

Per 3 ⋈ men 168.Pro.672
Per 4 84.Pro.252

Diuil. 84. -- 420-Quot.5.
420

...

Quesito Sesto.

Vno dà ad vn altro scud. 100. acciò li goda solamente per trè Anni, e con patto, che ogni Anno li rendi indietro scud. 36. trà frutto, e capitale. S'addimanda. Quello, che tenne trè Anni li scudi cento quanto viene a pagare all'Anno per cento; poiche in capo alli trè Anni li scudi 100 diuentano 108?

Habbia pagato 4. per Cento. In capo al primo Anno rendendo al Padrone scud. 36, ne viene a restituire 32 di capitale, e per l'Annò secondo ne conserua 68. Dico mò. Se Centò guadagnano 4. Che guadagnaranno 68? Operando, guadagnano scudi $2\frac{18}{25}$, quali cauati da 36, ne restano $33\frac{7}{25}$. E tanti ne rende al Padrone di capitale in capo al secondo Anno. Cauando mò questi scudi $33\frac{7}{25}$. da scud. 68 (capitale del secondo Anno) ne restano solamente $34\frac{18}{25}$ per capitale del terzo Anno: e poi dico di nuouo. Se 100. guadagnano 4. che guadaranno $34\frac{18}{25}$? Operando, guadagnaranno scudi 1. $\frac{243}{625}$

$\frac{243}{831}$. Ma perche restituendo al Padrone in capo al terzo Anno trà frutto, e capitale anco scud. 36, li sopranza $\frac{68}{831}$ di Scudo, ne siegue, che la nostra positione è troppo gagliarda. O facciamo la seconda.

Habbia pagato 3 per 100. In capo al primo Anno rendendo al Padrone Scudi 36, ne viene à restituire 33. di capitale, sicche per l'Anno secondo ne conserua 67 Dico mò. Se 100. guadagnano 3 che guadagnaranno 67? Operando, guadagnano Scud. 2 $\frac{1}{100}$, quali cauati da 36, ne restano 33 $\frac{99}{100}$. E tanti scudi del capitale rende al Padrone in capo al secondo Anno. Cauando mò questi scud. 33 $\frac{99}{100}$ da scud. 67 (capitale del secondo Anno) ne restano solamente 33 $\frac{1}{100}$ per capitale del terzo Anno, e poi dico. Se 100. guadagnano 3. Che guadagnaranno 33 $\frac{1}{100}$? Operando, guadagnaranno Scudi $\frac{9993}{10000}$: qual frutto vnito col suo capitale di scud. 33 $\frac{1}{100}$ fa scud. 34 $\frac{3}{000}$: ma perche ne vorrei 36, anco in questa seconda positione hò errato: mancandomi scud. $\frac{9997}{10000}$.

Conclusione.

A pagare 4 per cento — più $\frac{68}{831}$ Prod. $\frac{204}{831}$

A pagare 3 per Cento — men. 1 $\frac{99}{100}$ $\frac{7}{00}$ Prod. 7 $\frac{2497}{2100}$

Moltiplicando in croce, sommando, e diuidendo secondo la regola del più, e meno, s'haurà Scud. 3 $\frac{19}{31}$ $\frac{997}{000}$. E tanto paga all'Anno per 100, quello, che riceuette li scud. 100, e se fossero scud. di Paoli, sariano scudi 3. Baioc. 94. Den. 10 $\frac{16}{31}$ $\frac{70}{000}$.

Quesito settimo.

Vno si troua hauere vn pezzo d'Oro, mescolato con Argento, qual pesa Lib. 12. ne sà quanto Argento vi sia. Si ricerca per ciò la quantità precisa dell'vno, e dell'altro senza separarli.

La

La risolutione d'vn simile quesito fù ritrouata d'Archimede; ed è questa. Primieramente bisogna hauer vn pezzo d'Oro, ed vn pezzo d'Argento d'egual peso (se fossero d'inegual peso, anco s'haueria l'intento.) Secondariamente si prepara vn Vaso di proposito, e pieno d'Acqua quanto mai sia possibile. Fatto questo: con gran delicatezza separatamente s'infonde nel vaso ciascun pezzo dell'Oro, e dell'Argento, e del proposto pezzo di Lib. 12. pesando per ciascuna infusione l'Acqua, che ciascun pezzo fà vscir dal Vaso: perche certa cosa è, ch' essendo l'Oro più peso dell'Argento, occupa manco luogo, e per consequenza mandarà fuori del Vaso manc'Acqua, &c. Alla pratica.

Sia l'Oro, e l'Argento separatamente vna Lib. per pezzo. Di più. Infondendo nel Vaso il proposto pezzo di Libre 12, faccia vscir fuori Onc. 68 d'Acqua. Infondendo la Lib. d'Oro, ne faccia vscire Onc. 5; & infondendo la Lib. d'Argento ne faccia vscire Onc. 7. Fatto questo; per l'Oro si dice. Se Lib. 1. ricerca Onc. 5. d'Acqua. Quante ne vorranno Lib. 12? Per l'Argento si dice. Se Lib. 1. pretende Onc. 7. Quante ne vorranno Lib. 12? Operando, per le Lib. 12 d'Oro hauerai Onc. 60 d'Acqua, e per l'Argento n'haurai 84. Adunque si conosce chiaramente, che il proposto pezzo di Lib. 12. non è Oro schietto, perche se ciò fosse, non haueria versato se non 60. Onc. d'Acqua. Per saper mò precisamente la quantità dell'Oro, e dell'Argento, che si contiene in esso, bisogna ricorrere alla Regola delle positioni doppie, come siegue.

Sia nel proposto pezzo Lib. 7. d'Oro, e 5. d'Argento. Per le 7. Lib. d'Oro haurò Onc. 35. d'Acqua sparsa, e per le 5. Argento n'haurò Onc. 35. che vnite insieme fanno 70. & Io ne vorrei solamente 68, Adunque n'hò due Oncie d'auantaggio. O facciamo la seconda positione.

Sia

Sia l'Oro onc. 9. e l'Argento onc. 3. Per quello haverò onc. 45. d'acqua effusa, e per questo n'haverò onc. 21, che vnite insieme fanno onc. 66. & Io ne vorrei 68. Operando al solito s' haverà 8. Si conclude adunque, che nel proposto pezzo vi sono lib. 8. d'Oro, e 5. d'Argento. Che ciò sia il vero; per le lib. 8. d'Oro haueremo onc. 40. d'Acqua sparsa; e per le 4. d'Argento n'haueremo onc. 28, che vniti insieme fanno appunto 68. (come sparse il proposto pezzo.) Adunque stà bene.

Conclusione.

Per 7. d'Oro più 2. Prod. 18
Per 9. d'Oro mẽ 2. Prod. 14

Diuis. 4 — 32
Quotiente onc. 8

Quesito Ottauo.

Vn Rè mette insieme vn grosso Esercito, per andare contro il suo nemico. Per il viaggio ne morì $\frac{1}{3}$. Vn quinto s'amalò, $\frac{1}{4}$ fuggì, e 23000. ne restarono sani, e fedeli al suo Rè. S'addimanda il numero di tutto l'Esercito da principio.

Simili quesiti si potriano risoluere per la Regola delle Positioni falsе doppie; ma più leggiadramente si risoluono così.

$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ Denominatore 60 $\frac{37}{60}$ Residuo $\frac{23}{60}$.

Per $\frac{1}{4}$ 15
Per $\frac{1}{5}$ 12
Per $\frac{1}{6}$ 10

Numeratore 37

Soldati restati 23000
60
Diu. 23.1380000 Quo. 60000
138
...

Per la Regola dell'Accattare alla longa, ouero alla cur-

curta si troua vn numero, ch' habbia le parti di quarto, di quinto, e di sesto: e questo per il minimo nel caso proposto hà il 60. Di questo 60. ne piglio $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$, quali sommati insieme fanno 37. Si che $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ di tutto l'Esercito è $\frac{37}{60}$. E se così è; il resto di necessità (cioè $\frac{23}{60}$) sarà la quantità de' Soldati, che furono fedeli; ma perche detti Soldati (dal supposto) erano 2300; per sapere la quantità di tutto l' Esercito, basta a partire per $\frac{23}{60}$ le 23000: perche il Quotiente sarà la conclusione del quesito. Rispondo adunque, che l' Esercito era di 60000. E che sia il vero di questi 60000 Soldati leuandone 15. milla per $\frac{1}{4}$, 12. milla per $\frac{1}{5}$, e 10. milla per $\frac{1}{6}$ ne restano precisamente 23. milla. Però stà bene.

Innumerabili sono li quesiti, che si potriano proporre: poiche innumerabili bizzarie può partorire l' intelletto humano: ma certo ogni mediocre ingegno mediante li precedenti, bene intesi, da sè saprà farsi honore.

Auuertiscasi, che ogni volta, che nella prima, ò seconda positione, occorresse d' incontrarsi in quello si cerca, non occorre passar più auanti: ma sarà risoluto il quesito. Per esempio. Se in vna delle due positioni del penultimo quesito hauessi supposto, che nel proposto pezzo vi fossero state lib. 8. d' Oro, e 4. d' Argento, perche l'acqua scacciata dal Vaso da queste due quantità, fà onc. 68. hò l'intento però, &c.

QVESITI CVRIOSI, E DILETTEVOLI.

CAP. XXVI.

Quesito Primo.

COme faresti a portare fuori d'vn giardino vn sol Pomo; douendo vscire per 3 porte, e douendone la-

lasciar la metà, & 1 di più per ciascuna porta? Quanti Pomi bisognaria preparare per portarne a Casa vn solo?

Di così. Vno da portare a Casa, & 1 di più fà 2. Dupplicali, che saranno 4, & 1 di più saranno 5. Raddoppiali, che saranno 10, & 1 di più fanno 11. Raddoppiali di nuouo, & in tutto saranno 22. E tanti Pomi bisogna preparare per portarne a casa vn solo. Facciamone la proua.

Di questi Pomi 22 lasciandone lá metà alla prima porta, & 1 di più, a lui ne restano solamente 10; con li quali si presenta alla seconda porta; e perche a questa ne deue lasciare anco la metà, & 1 di più: non li restano altro che 4 Pomi: de' quali lasciandone 2 alla terza porta per la douuta metà, & 1 di più; vn sol Pomo li resta da portare a Casa (come promise.)

Ma se ne volesti portare a Casa 2, ò 3, ouero 4, &c. basta aggiongere al 22. tante volte 8, quanti Pomi vorrai portare a casa più d'vn solo. Si che volendone portare 2, pigliane 30. Se 3, pigliane 38. Se 4, pigliane 46, e così in infinito.

Ma se alla prima porta si pagasse la metà, & 1 di più. Alla seconda la metà, e 2 di più. Et alla terza la metà, e 3 di più, dirai così. Alla terza porta 3, & 1 di più fanno 4. Per la seconda porta dupplicali, che saranno 8, e 2 di più fanno 10. Per la prima porta dupplicali, che saranno 20, & 1 di più fanno 21, quali di nuouo raddopiati fanno 42. E tanti Pomi ci vogliono per portarne a Casa vn solo.

Quesito Secondo.

Vno manda il suo Spenditore alla Piazza con sol. 40, acciò li compri 40 vccelli viui, cioè Quaglie a sol. 3. l'vna. Tordi a sol. 2 l'vno, e Passarotti à $\frac{1}{2}$ di soldo l'vno. S'addimanda, Quanti vccelli comprarà d'ogni sorte?

Per

Per la Regola delle positioni semplici questo, e simili quesiti si risoluono così. Bisogna sempre apporti a quela sorte d'vccelli di manco prezo, che nel caso nostro sono li Passarotti. Suppongo adunque, che il spenditore compraße 40 Passarotti, quali costariano (al tassato prezo) sol. 8. Ma perche n'hà da spendere 40, ne sopravanzano 32: fatto questo; bisogna vedere, quanto costino più de' Passarotti gli altri vccelli, che hà da comprare. Le Quaglie costano $\frac{1}{4}$ di più; e li Tordi $\frac{2}{7}$ di più. Bisogna mò conuertire li sol. 32. in quinti, e saranno 160. Vltimamente bisogna diuidere questo 160 in 2 parti tali, che l'vna partita per 14, e l'altra per 9, non vi resti rotto alcuno: (e questo è 70, e 90,) perche il Quotiente sarà il numero delle Quaglie, e de' Tordi ch'hà da comparе; e per il resto fino a 40, tanti Passarotti. Si conclude adunque, che il Spenditore deue comprare Quaglie 5, Tordi 10, e Passarotti 25. Auuertiscasi, che quando non si trouaße tal numero, che facesse le douute diuisioni senza rotto; si può rispondere, che tal quesito non si può rettamente sciogliere: & è più laudabile, che mettere insieme vn pezzo di Quaglia con vn altro di Tordo, ò di Passarotto.

Quesito Terzo.

Sono inuitati 18 persone ad vn Banchetto, nel quale frà l'altre viuande si mangiarono 18. Tordi: gli huomini ne mangiarono 2 per vno; Le donne 1 per vna; e li fanciulli ne mangiarono solamente $\frac{1}{2}$ per vno. Quanti huomini; quante donne; e quanti fanciulli vi si trouarono?

Questa, e simili si risoluono, come la passata. Suppongo, che 18. fanciulli mangiaßero 9 Tordi; ne restano altri 9. La portione de gli huomini supera quella de fanciulli di $\frac{3}{2}$; e quella delle donne di $\frac{1}{2}$. Li 9 Tordi conuer-

tiertiti in $\frac{1}{3}$, fanno $\frac{3}{15}$, quali partisco in due parti, cioè 15, e 3; il 15 partisco per 3, e ne vengono 5 huomini; & il 3. partito per 1, restano pur 3 donne. Adunque si trouarono al Banchetto 5 huomini, 3. donne, e 10 fanciulli. Fanne la proua, e riuscirà buona. Possono essere ancora 4 huomini, 6 donne, & 8 fanciulli, ouero 3 huomini, 9 donne, e 6 fanciulli, (secondo la diuisione del 18.)

Quesito Quarto.

Vn gentil huomo caraccolando col Cauallo ruppe vn cesto d'Voua a vna pouera Contadina, quale volendo riffarla del danno: domandò quanti Voua haueua nel cesto: La contadina rispose di non saperlo: ma ben sì si ricordaua, che contandole a 2 a 2, ne auanzaua 1. A 3 a 3, nè auanzaua 1. A 4 a 4, ne auanzaua 1: ma contandole a 5 a 5, non ne auanzaua alcuno. Quante Voua erano nel Cesto?

Questa è Regola infallibile, & vniuersale. Bisogna (per la Regola dell'Accattare) trouare vn numero, che sia numerato da 2, da 3, e da 4, (cioè sempre da tanti, quanti saranno li numeri proposti, eccettuandone però l'vltimo) Questo numero nel caso nostro per il minimo è 12. Ma perche bisogna, che detto numero sia di tal conditione, che partendolo per il numero maggiore (frà proposti,) ne soprauanzi precisamente il numero più prossimo al maggiore: però bisogna moltiplicare detto 12, finche si troui tal numero, che partito nel caso nostro per 5 (numero maggiore de' proposti) ne auanzi precisamente 4 Il qual numero non si troua prima della settima moltiplicatione del 12, che così si nota: 24, 36, 48, 60, 72, 84. Si che l'84 è quel numero, che partito per 5. auanza precisamente 4. Fatto questo: basta aggiongere per regola ferma l'Vnità all'84, & è fatta la ragione. Si che diremo, che 85 Voua erano nel

Cesto della Contadina. Se ne farai la proua, la trouarai buona.

Ma se la Contadina haueste detto: che contandole anco a 5 a 5, n'auanzaua 1, la ragione saria più facile: e bastaria trouare vn numero, che fosse numerato da tutti li sopradetti numeri insieme con il detto 5: & a quel tal numero aggiongendo l'Vnità, quello saria la quantità cercata, che nel caso nostro sariano Voua 61. Bisogna anco sapere, che le sudette Voua poteuano esser più: il che si può conoscere col proseguire la moltiplicatione del 12 (ò altro douuto numero) Si che nel caso nostro moltiplicato dodeci volte il 12 fà 144, e questo hà la douuta qualità, cioè che partito per 5, n'auanzano precisamente 4, come nel numero 84, e così le sudette Voua poteuano essere ancora 145: e chi proseguisse auanti con la moltiplicatione del 12, se ne trouariano degli altri; ma dalla grandezza del Cesto, si conoscerìa facilmente qual numero fosse di proposito.

Finalmente se la Contadina haueste detto, che contandole a 2 a 2 ne auanzaua 1. A 3 a 3 n' auanzano 2. A 4 a 4 auanzano 3; & a 5 a 5 n' auanzano 4. Quanto sariano? Questo modo è facilissimo. Basta a trouare vn numero, (sia mo il minimo, ò altro) ch'habbia le parti di $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, & $\frac{1}{5}$, poiche a tal numero leuandoli l'Vnità, resta finita la ragione. Nel caso nostro hò pigliato il minimo numero, cioè 60. Leuatone 1. resta 59; e tante sariano le Voua. Il 120 hà l'istessa conditione, & altri innumerabili; ma dal Cesto si conoscerìa, &c.

Non mi son partito dal proposto quesito per non moltiplicare parole; mà si come si può variare soggetto; così si può proseguire oltre al 5 quanto piace.

Quesito Quinto.

Vno domanda ad vn altro, Quant'hore sono? L'altro

tro rispose, e disse. Il terzo, & il quarto dell'hore sonate, sono tanto, quanto è il quinto, & il sesto di quelle, c'hanno da sonare Quant'hore erano?

Questo quesito non vuol dir altro, che far di 24 due parti tali, che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ d'vna sia eguale ad $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ dell'altra: ouero è vn dire. Trouami due numeri, che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ d'vno sia $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ dell'altro, e frà tutti due facciano 24. Hora mò per trouarlo si fà cosi (& è facilissimo.) Si sommano insieme $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$, che fanno $\frac{7}{12}$: sommati parimente $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ fanno $\frac{11}{30}$. Fatto questo, si moltiplicano in croce li $\frac{7}{12}$, con li $\frac{11}{30}$, e li Prodotti, colocati sotto li Denominatori, saranno li cercati numeri: come in figura si vede. Si che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ di 132 sono tanto quanto è $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ di 210: perche per l'vno, e per l'altro numero separatamente le parti sommano 77. Adunque habbiamo trouati li due numeri, che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ d'vno fà $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ dell'altro. Se questi due numeri sommati insieme facessero precisamente 24; haueressimo l'intento, nè occorreria cercar altro; ma perche fanno 342, la nostra propositione è riuscita falsa; ma da questa falsità, per la Regola Aurea ne cauaremo la verità, dicendo. Se 342 fossero 24, quanto sariano 132, e quanto 210? Operando, per il primo haueremo $9\frac{5}{19}$. E tante erano l'hore sonate, ò passate; e per il secondo haueremo $14\frac{4}{9}$, e tante erano le hore da sonare, ò fino a sera. E che sia il vero; Piglianſi $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ d'hore $9\frac{5}{19}$; & $\frac{1}{5}$, & $\frac{1}{6}$ d'hore $14\frac{14}{19}$, che per l'vno, e per l'altro verso ne verranno $\frac{308}{57}$, cioè $5\frac{23}{57}$. Però la risolutione fù buona.

	7		11
	12		30
	132		210
Per $\frac{1}{3}$	44	Per $\frac{1}{5}$	42
Per $\frac{1}{4}$	33	Per $\frac{1}{6}$	35
Somma	77	Som.	77

CAP. XXVII.

Giuoco dell'Anello.

PEr sapere indouinare frà quattro persone, chi habbia l'Anello; in qual mano; in qual dito; & in qual nodo, si fà così. Prima bisogna, che ciascuno de' 4 sappia, chi sia il primo, chi sia il secondo, chi il terzo, e chi il quarto. Secondo che le dita si cominciano a contare dal Police: cioè dal dito grosso; e li nodi si cominciano a contare dall'vngia. *His præmissis*; alla pratica così. Io dico.

Chi hà l'Anello raddoppia sè stesso. L'habbia la 4. persona. Raddoppiato 4, fà	8
Aggiongi cinque, e fà	13
Moltiplica per cinque, e fà	65
Aggiongi dieci, e fà	75
Se l'Anello è nella man destra, aggiongi due; e s'è nella sinistra, aggiongi vn solo (sia nella destra) e fà	77
Moltiplica per dieci, e fà	770
Aggiongi le dita (sia nel 4) e fà	774
Moltiplica per dieci, e fà	7740
Aggiongi li nodi (sia nel 1) e fà	7741
Sottraganſi per regola ferma	3500
Restano	4.2.4.1.

Hor sappi, che le migliaia indicano la persona, ch'hà l'Anello. Le centenaia danno segno della mano. Le decine in qual dito, & il numero in qual nodo. Adunque l'Anello lo tiene la quarta persona. L'hà nella ma-

mano destra, ò dritta: nel quarto dito: cioè nell'anullare, e nel primo nodo.

Giuocò de' Dadi.

PEr indouinare quanti punti habbia fatto vno con 3. Dadi senza vederli, dicasi così.

Raddopia il punto maggiore, fà	12
Aggiongi cinque, fà	17
Moltiplica per cinque, fà	85
Aggiongi dieci; fà	95
Aggiongi l'altro numero maggiore, fà	100
Moltiplica per dieci, fà	1000
Aggiongi l'ultimo punto, fà	1004
Sottraganſi per Regola ferma	350
Reſtano li punti fatti	.6.5.4.

SE foſſero ſolamente due Dadi, dirai.

Raddoppia il punto maggiore, fà	6
Aggiongi cinque, fà	11
Moltiplica per cinque, fà	55
Aggiongi l'altro punto, fà	56
Cauane per regola ferma	25
Reſtano li punti fatti	.3.1.

In ſimili queſiti è bene, che chi piglia à indouinare, faccia lui la ſottrattione: acciò reſti più occulto il perche, e riuſcirà di maggior merauiglia &c.

Per sapere il numero, ch'vno si sia imaginato.

SVppongo, ch'vno si sia imaginato 8
Domando. V'è mezo? Lui risponde di nò. Io replico
Ingrandite la metà il numero imaginato: Lui l'ingrandisce, e fà 12
Domando di nuouo. V'è mezo? Lui risponde di nò. E lo torno à dire.
Ingrandite anco la metà quest'vltimo numero. Lui risponde, l'hò fatto, e fà 18
Finalmente domando se v'è mezo, e lui risponde di nò.

Adesso mò siamo a segno per sapere, che numero si sia imaginato; (il che è facilissimo.) Basta il sapere quante volte entri il 9 nell'vltimo numero: (cioè nel 18.) poiche per ciascun 9 s'hauerà per regola vniuersale 4. di numero imaginato. E perche il 18 contiene due volte il 9; però concludo, che lui s'imaginò 8. Siche bastaria, che quel tale dicesse, quante volte il 9. entri nell'vltimo numero: ma non hà del buono: perche pareria, che l'intelligenza dependesse da chi s'imaginò. Adunque, acciò l'operatione rieschi più marauigliosa, quello, che fà il giuoco, faccia gettar via quanto a capriccio li piace; tenendosi a memoria tutti li 9. Dirò per esempio. Dall'vltimo numero gettatene 15. Lui risponde, l'hò fatto. E perche il 15. contiene vna sol volta il 9, e trè mi manca per hauer due volte il 9. dico di nuouo, gettatene anco 3. (per amor della Vecchia) Lui risponde, l'hò fatto. Siche hò nella Sacca due volte il 9. Mà perche non sò quanto li sia restato: torno à dire; gettatene anco 9. Lui risponde, non posso. Ed Io, senza far conto di quello, che li 9 sia auanzato, rispondo. Vi sete imaginato 8.

Mà perche può essere, ch'vno s'imagini vn numero, che vi sia il mezo ò pure, che il mezo v'entrarà nell'in-

gran-

grandirlo due volte la metà: però bisogna ricordarsi di farlo far sempre intiero; e poi tenersi anco a memoria in qual luogo sia stato il mezo. Se il mezo sarà nel numero imaginato, se ne perde $\frac{1}{2}$ da sottrarsi da quei numeri, corrispondenti alli 9 dettratti. Se il mezo sarà nel primo ingrandire, se ne guadagna vno, e se il mezo sarà nel secondo ingrandire se ne guadagna 2, d'aggiongersi a gli altri (come sopra) corrispondenti alli 9, ma perche può essere, che il mezo sia alle volte in tutti trè i luoghi: alle volte in due, & alcune altre in vn solo; però bisogna, che il ceruello stia à segno. Alla pratica.

Suppongo, ch'vno si sia imaginato $2\frac{1}{2}$

Domando. V'è mezo? Lui risponde di sì. Ed Io dico; fatelo intiero, (e poi mi ricordo, che quì ne perdo $\frac{1}{2}$) Lui risponde, l'hò fatto, e fà 3.

Io replico. Ingranditelo la metà. Lui risponde, l'hò fatto, e fà $4\frac{1}{2}$

Domando. V'è mezo? Lui risponde di sì. Et io dico; fatelo intiero, (e poi mi ricordo, che quì ne guadagno 1. Lui risponde, l'hò fatto, e fà 5.

Torno a dire. Ingrandite anco la metà quest'vltimo numero. Lui risponde, l'hò fatto, e fà $7\frac{1}{2}$

Domando. V'è mezo? Lui risponde di sì. Ed io dico; fatelo intiero, (e poi mi ricordo, che quì ne guadagno 2.) Lui risponde, l'hò fatto, e fà 8.

Fatto questo dirò a capriccio. Gettatene 12. Lui risponde, non posso. Per saper mò s'habbia alcun 9, dirò. Gettatene 9. Lui risponde; non posso Et io subito dirò. Vi sete imaginato $2\frac{1}{2}$; perche, se vi ricordate; in vigore de mezi fatti intieri, n'hauete guadagnato 3, e perso $\frac{1}{2}$. Cauando mò da 3 vn mezo resta $2\frac{1}{2}$. Se (per esempio) si fosse gettato via due volte il 9. s'haueria 8. di numero imaginato: al quale 8 si doueriano aggiungere gli altri trè, guadagnati in vigore de mezi, e fariano 11. e

poi leuarli quel mezo, perso nel primo luogo. Siche restariano 10 ½, e tanti se ne saria imaginato. Voglio dire, che se vno s'imaginasse 10 ½, vi saria il mezo in tutti trè i luoghi, ed operando l'vltimo numero saria 26, che contiene due volte il 9. quali danno 8. di numero imaginato, & al quale aggiongendo 3, e leuando ½, resta 10 ½. (Numero imaginato.)

Questa regola serue per sapere quanti Denari habbia vno in borsa, & in altre occorrenze, balta hauere vn poco di giuditio.

Giuoco frà tutti bellissimo.

CHi volesse indouinare frà 3 persone qual di loro si sia imaginato d'esser (per esempio) Papa; L'altro Imperatore, e l'altro Rè. O veramente chi volesse saper trouare chi di loro habbia leuato Oro, Argento, ò Rame; ouero trè altre cose differenti, si fà così.

Prima bisogna hauer preparate 24. Faue; o altra cosa simile. E bisogna saper questi Verfi alla mente.

bera?

Aperi. Prelati. Magister. Camille. Perina. Quid habes. Ri-

1 2 3 4 5 6 7

Preparatosi adunque così. Quello che vuole indouinare, senza far moto ad alcuno, si noti nella sua mente quale delle persone voglia, che sia il primo, quale il secondo, e quale il terzo. (ma riuscirà più facile da tenersi a memoria, procedendo per anciamità.) Dopo questo, al primo dia vna Faua, al secondo ne dia due, e al terzo ne dia trè. (ma che nissuno sappia il perche) l'altre Faue si lasciano in publico.

Prima, che nissuno lieui cosa alcuna, bisogna applicar à ciascuna di quelle 3 cose, che s'hanno da leuare vna di queste vocali, A, E, I. Perche ciascuna parola de sudetti Versi hà parimente queste tre vocali, se bene con ordine confuso,

Fat-

Fatto questo, si dice. Quello, che hà leuato la tal cosa (da te nominata per A) pigli altre tante Faue vna sol volta, quante hà in mano. Quello, che hà leuato l'altra (Nominata per E.) ne pigli due volte tanto. E quello, che leuò la terza (Nominata per I.) ne pigli quattro volte tanto.

Dopo questo, domanda quante Faue siano restate, al numero delle quali la parola nel verso ti darà le vocali, per conoscere, chi habbia le 3. proposte cose. Per esempio, se fossero restate 4. Faue, cadono sopra la quarta parola del verso *Camille*, siche il primo hà quella cosa, alla quale applicasti la vocale A. Il secondo quella dell'I, ed il terzo quella dell'E, e così si fà con l'altre parole del verso, quando occorrerà pigliarle; cioè, che la prima vocale della parola significa la persona prima. La seconda vocale significa la seconda persona, e la terza significa la terza persona, ciascuna delle quali haverà quella cosa, alla quale applicasti quella vocale, che li tocca in detta parola. Tante parole poi sono nel verso, quante sono le Faue, che possono soprauanzare.

Quanto all'indouinare chi si fosse imaginato d'esser Papa, Rè, ouero Imperatore; basta applicare à quei, ò altri nomi da indouinare, le sudette tre vocali *ad libitum*, (se bene si teranno meglio à memoria applicando l'A, al Papa, l'E al Rè, e l'I all'Imperatore; poiche detti nomi contengono le medesime Vocali; nel resto, come sopra. Chi hà giuditio troverà delle belle bizzarrie.)

Vn altro Giuoco curioso.

Se 15 Cristiani, e 15 Turchi, ouero Hebrei si trouassero in Mare, e per causa di Fortuna bisognasse gettarne la metà in mare, come faresti, a farui andar tutti li Turchi, ouero Hebrei?

Per

Per esperimentarlo sopra vna tauola per galanteria fà cosi. Piglia 15. Faue bianche, e 15. nere. Le bianche rappresentaranno li Cristiani, e le nere li Turchi. Bisogna sapere questi versi alla mente.

Populeam, Virgam, Mater, Regina Ferebat.

Et ãco bisogna esser auuertito, che le Faue si mettono in filla, ouero in giro; cominciando con le bianche, e poi proseguendo alternatamente con le nere; nõ egualmẽte, mà quanto ricerca la vocale, che gli tocca. Si distribuiscono dunque secõdo l'ordine delle vocale del sudettõ verso, ciascuna delle quali ricercano tanti grani, quanti si conuiene al luogo, che naturalmẽte tengono esse vocali, e sono queste A. E. I. O. V. per maggior chiarezza le distendo. 1. 2. 3. 4. 5.

La figura o rappresenta li Cristiani, e li ponti significano li Turchi.

Po pu le am, Vir gã, Mà ter. Re gi na. Fe re bat
oooo,....co . ooo . o .. oo .. o .. oo .

Accomodate le Faue si cominciano a contare a 9 a 9, ed oue termina, quella Faua si getta fuori di filla, (e se fosse vn Turco si gettaria in mare) Circuendo sempre contando, tutte le nere andaranno da parte. Si comincia a contare oue si principiò la distributione.

Chi volesse contar le Faue à 3 a 3 le distribuischi secondo le vocali di questi altri versi.

Ecce amata fedare amaram fecere araneam meam.

Se li vuoi contare a 8, a 8, Distribuiscele secondo questi altri.

Pater Adam ceperat merita gratie verone.

E se a 10. a 10. Secondo questi, che seguono.

Rex Anglicus certe bona flamina dederat.

Giuoco non inferiore a gli altri.

Prima filla.	Seconda filla.	Terza filla.	Quarta filla.	Quinta filla.
1	3	5	7	9
2	11	13	15	17
4	12	19	21	S. 23 Pietro
6	14	20	25	27
8	16	22	26	29
10	18	S. 24 Paolo	28	30

Habbiansi preparate 30. polize di carta. Se volete il giuoco spirituale, potete scriuerli sopra il nome d'vn Santo per ciascuna. Se lo volete di ricreatione; scriueteui sopra il nome di qualche animale, ò di qualche viuanda, ò pure seruiteui di 30. carte da giuocare. Prima d'ogni cosa si distendino sopra d'vna tauola a due a due le polize, ò carte da giuocare, & ogniuno se ne immagini due a suo piacere, ma tali, e quali si trouano accompagnate. Fatto questo, si raccogliono le polize, ò carte a due, a due, come stanno accompagnate; leuandole à capriccio quà, e là, e ponendole nel mazzo sotto, ò sopra; basta à non confonderle, ò mescolarle. Raccolte le polize, si distendino ad vna, ad vna con quell'ordine, che in figura si vede, e come insegnano li numeri, con che si sarà fatto vn quadrangolo di 5. fille, e di 6. polize per filla, ma notate, che alla prima se ne mettono due insieme nella prima filla, e poi vna di quà, & vna di là. Gionto alla margine della quadratura, se ne mettono pur anco due insieme nella seconda filla, e poi vna di quà, & vna di là. Così col resto.

Per saper mò le polize, che ciascuno s'è imaginato: basta, che ogni vno dichi in qual filla siano senza mostrarle.

Se tutte due fossero nella prima filla, sariano oue è notato 1. e 2. Se tutte due nella seconda 11, e 12. Se nella terza 19, e 20. Se nella quarta 25, e 26. Se nella quinta, 29, e 30. Se poi vna poliza fosse in vna filla, e l'altra in altra filla, prestissimo si troua così. Alla pratica.

Sopra ciascuna poliza sia scritto il nome di qualche Sãto,& vno si sia eletto per suoi Auocati S. Pietro,e S.Paolo,& vn di loro sia nella terza filla,e l'altro nella quinta: per trouarli presto, sempre si ricorre alla filla di man-

ca

ca denominatione (che nel caso nostro è la terza filla) e dico così. Se tutte due le vostre polize fossero nella terza filla certo è, che sariano que stà notato 19, e 20: ma perche vna è nella quinta, e l'altra nella terza. Io dico, che caminando lateralmente per la ragione del 19, v'incontrarete nella quinta filla con vno de' vostri Santi immaginati, cioè in S. Pietro. L'altro sarà nella terza filla calando abbasso tanto distante dal 20, quanto, che il primo è distante dal 19. Dico adunque, che vi sete immaginato S. Pietro, e S. Paolo; e si come frà il 19, e S. Pietro v' è vna sola poliza: così frà il 20, e S. Paolo v'è pur vna sol poliza. Nè vi paia strano: perche se vi ricordate; dopo d'hauer colocato nella terza filla il 19. & il 20. hauete poi posto di quà, e di là il 21, e 22: e queste polize stauano insieme nel mazzo; Dopo colocasti 23, e 24, cioè S. Pietro, e S. Paolo; e questi stauano accoppiati insieme nel mazzo, & anco nella tauola quando dà principio ve l'immaginasti; *& sic de singulis*.

Il Fine della Prima Parte.

PAR-

PARTE SECONDA.

Nella quale si tratta delle Progressioni; Estrattioni di radici: delle quantità irrationali, e Scienza maggiore del numero &c.

TRATTATO DELLE PROGRESSIONI.

CAP. 1.

LA Sesta spetie dell'Algorismo si chiama Progressione. Mà prima di trattare d'essa, parmi bene di premettere le varie diuisioni del numero, addotte da Euclide, e da altri Filosofi. Non ne parlai nel principio della prima parte, non hauendo che fare tali diuisioni con Mercanti; ma iui mi contentai di diffinire solamente, che cosa sia Numero, & Vnità: considerato sì dal Naturale, come dal Matematico,

Pri-

Prima diuisione del numero.

TVtto il numero si diuide in paro, & in disparo. Il numero paro, è quello, che si può diuidere in due parti eguali; come, 2,4,6,8,10, &c. Ma il numero disparo è quello, che diuiso in due parti, auanza sempre l'vnità: come 3, 5, 7, 9, 11, 13, &c.

Seconda diuisione.

Tutto il numero si diuide parimente in quattro spetie cioè. In parimente paro. Parimente disparo. Parimente, e disparimente paro. Et in disparimento disparo.

Numero parimente paro è quello, che tutti li numeri pari, che lo numerano, lo numerano per volte pari come 4, 8, 16, 32, 64, 128, & altri infiniti. Se vuoi diuidere (per esempio) il 64 non si può diuidere, se non per questi cinque numeri pari, 2, 4, 8, 16, 32, e non più: ma tutti con volte pari.

Numero parimente disparo è quello, che tutti li numeri pari, che lo numerano, lo numerano con volte dispari; come 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, & altri infiniti.

Numero parimente, e disparimente paro è quello, che tutti li numeri pari, che lo numerano: alcuni lo numerano per volte pari, & alcuni per volte dispari; come 24, 28, 36, 40.

Vltimamente. Il numero disparimente disparo è quello, che tutti li numeri, che lo numerano, sono dispari; e lo numerano pur anco per volte dispari; come 15, 21, 27, 33, 39, 45, & altri infiniti.

Terza diuisione.

Tutto il numero si diuide anco in altre due spetie: cioè, in numero primo, e numero composto. In nume-

ri

ri contra sè primi, & in numeri frà sè compositi. Numero primo è quello, che dalla sola vnità è numerato, come 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, & altri.

Numero composto è quello, che, (oltre l'Vnità) è numerato da qualche numero: come 15, e 21, che sono numerati l'vno da 3, e 5, e l'altro da 3, e da 7. Così altri per lo più.

Numeri contra sè primi sono quei, che dalla sola vnità sono communemente numerati, ò diuisi: come 9, e 25: quelli, se bene considerati in sè stessi, ciascun di loro saria numero composto: Il 9 composto di 3, & il 25 composto di 5 ad ogni modo comparati l'vno contra l'altro, sono detti contra sè primi: non trouandosi numero, che communemente li numeri, ò partischi.

Numeri frà loro compositi, ò communicanti sono quei, che (oltre l'Vnità) sono communemente diuisi, ò numerati da qualche numero; come 25, e 30 —— 35, e 40, & altri.

Quarta diuisione;

In oltre tutto il numero si diuide in altre trè spetie, cioè. In numero perfetto, abbondante, e scarso. Il numero perfetto, è quello, che s'eguaglia a tutte le sue parti, che lo numerano; come il 6, quale hà solamente trè numeri, che lo diuidono, cioè 3 per la metà; 2 per vn terzo; & 1 per vn sesto; che vniti insieme fanno appunto 6. L'istesso si troua nel 28, 496, 8128, & altri. Il modo di trouare questi numeri perfetti s'insegna altroue.

Numero abbondante è quello, che resta superato dalle sue parti; come il 12, quale hà tante parti, ò diuisioni, che vniti insieme, arriuano a 16. L'istesso è del 24, 36, 48, 60, & altri infiniti.

Numero scarso è quello, che hà si scarse parti, ò diuisioni; che vnite tutte insieme sono manco del suo nume-

mero; come l'8, le cui parti vniti insieme fanno solamente 7; così del 10. 14. 16, &c.

Quinta Diuisione.

Finalmente tutto il numero matematicamente inteso, per praticare, volgere, e maneggiare le figure geometriche: li spatij, e misure loro, vien diuiso in numero lineale, superficiale, e solido. Parimente in numero quadrato, e cubo. Altri v'aggiongono li numeri triangolari, pentagonali, esagonali, circolari; e parimente li numeri piramidali di varie forme, &c.

Numero superficiale si chiama qual si voglia Prodotto dalla moltiplicatione di due numeri; e quei due numeri producenti si chiamano lati di quel numero superficiale; e per consequenza saranno numeri lineali. Per esempio. A moltiplicare 7 per 5, fà 35. Hora mò questo 35. sarà numero superficiale; & il 7, e 3 saranno lineali.

Numero solido è quello, che prouiene dalla continua moltiplicatione di trè numeri: come questi 3. 4. 5. Moltiplicando 3 via 4, fà 12; e 5 via 12, fà 60. Adunque questo 60 è numero solido, e li trè numeri 3. 4. 5. saranno i suoi lati, e per consequenza numeri lineali. Così con altri.

Numero quadrato è il Prodotto di qual si voglia numero, moltiplicato in sè stesso; come a dire 2 via 2 fà 4. Questo 4 sarà numero quadrato, &c.

Numero cubo è quello che vien prodotto dalla continua moltiplicatione di trè numeri eguali: & i lati di tal cubo saranno li detti trè numeri. Per esempio, 2 via 2 fà 4, e 2. via 4 fà 8. Adunque 8. è numero cubo; e li trè 2 saranno i suoi lati; cioè numeri lineali. E così con altri.

Li numeri superficiali sono detti simili; ogni volta, che i loro lati siano proportionali cioè, che moltiplicando l'vno con l'altro, produchino vn numero quadrato: ouero partendo l'vno per l'altro diano parimente numero quadrato: come saria 2, e 8 che moltiplicati insieme fanno 16, numero quadrato: ouero partendo l'8 per 2, ne verria 4, pur numero quadrato, &c.

L'istessa cautela, & auuertenza milita anco circa li numeri solidi: cioè che si chiamaranno solidi simili tutti quei numeri, che diuisi l'vno per l'altro, l'auuenimento riuscirà numero cubo. Come saria 24, e 3. parimente 108, e 4. poiche partendo il 24 per 3 ne viene 8, numero cubo: e partendo 108 per 4, ne viene 27; pur numero cubo, &c.

Tutti li numeri quadrati sono frà loro superficiali simili. Parimente tutti li numeri cubi sono frà loro numeri solidi, e simili.

DELLE PROGRESSIONI ARITMETICHE.

CAP. II.

PRogressione Aritmetica è vn ordine di più numeri, che ordinatamente s'auanzano l'vn l'altro con auanzi eguali: le quali sono di più sorti. Progressione naturale si chiama quella, che cominciando dall'Vnità, vn numero auanza l'altro pur solamente con l'Vnità. Tutte l'altre progressioni s'auanzano chi con più, e chi con meno differenza frà l'vno, e l'altro numero, ò termine. Chi comincia, e proseguisse con numeri pari; e chi con dispari, come qui si vede.

Progressione naturale.

1.2.3.4 5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17. &c.

Altre Progressioni diuerse.

1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29.&c.

2.4.6.8.10.12.14.16.18.20.22.24.26.28.&c.

6.9.12.15.18.21.24.27.30.33.36.39.42.45.&c.

7.12.17.70.75.80.&c.

50.60.70.80 90.100.110.120.130.140.150.&c.

Proprietà delle Progressioni Aritmetiche.

La proprietà delle Progressioni Aritmetiche è quella: che la somma del primo, & vltimo termine di qual si voglia Progressione, dà la somma, & è sempre eguale alla somma di qualunque due termini di mezo, che egualmente siano distanti dalli due termini estremi: come saria la somma del secondo termine col penultimo: quella del terzo con l'antipenultimo, &c.

Quando li termini della Progressione sono dispari: perche il termine di mezo non hà compagno, ma resta solo: in tal caso si dupplica tal termine: con che s'haverà il numero eguale à qualsiuoglia copia, detta di sopra.

Modo succinto per sommare qual si voglia Progressione Aritmetica.

MOlti sono li modi, trouati da gli Antichi, per fare tutto il numero, ò somma delle Progressioni Aritmetiche: mà per non moltiplicar parole senza proposito, m'appiglio a questo modo facilissimo, & vni-

uersale. Si fà adunque così. In qual si voglia Progressione s'vnischono, ò si sommano insieme il primo, e l'vltimo termine della proposta Progressione; e poi se li termini della Progressione sono pari, si moltiplica la sudetta somma del primo, & vltimo termine per la metà del numero delli termini: ma se il numero delli termini sarà dispari: in tal caso si moltiplica la metà della somma del primo, & vltimo termine per tutto il numero delli termini: poiche ogni Progressione, ch' habbia li termini dispari, hà sempre numero paro nella somma del primo, & vltimo termine: come ne' due seguenti esempi si farà il tutto chiaro.

3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39.

4. 7. 10. 13. 16. 19. 22. 25. 28. 31. 34.

La Prima Progressione di questi due esempij è di 10. termini. La somma del primo, & vltimo termine fà 42; quale moltiplicato per 5 (metà del numero de' termini,) fà 210; e tanto appunto è la somma di tutta quella Progressione. L'istesso verria moltiplicando la metà della somma del primo, & vltimo termine per tutto il numero de' termini, ouero tutta la somma per tutto il numero, e poi pigliarne solamente la metà del Prodotto.

La seconda Progressione de' due proposti esempij è d'11 termini; e per conseguenza sono dispari. La somma del primo, & vltimo termine fà 38, numero paro; la cui metà è 19. Moltiplicando adunque questo 19 per 11 (numero intiero delli termini della Progressione) di Prodotto ne viene 209 per la sóma di tutta la Progressione. Così si procede con tutte l'altre, quali si siano, continue, ò disgiunte. Disgiunta saria questa progressione 7 12. 17--70 75. 80. nella quale basta, che li termini vltimi siano tanti in numero, e s'auancino egual-

men-

mente l'vn l'altro, come fanno li primi: e come appunto si vede nel proposto esempio; che il 70.75.80. sono tanti in numero de termini, & augumento; quanti sono il 7.12.17. E tanto basti al giudicioso Lettore.

Volendo per regola inuestigare la somma di tutti li numeri quadrati di qualsiuoglia Progressione Aritmetica; si fà cosi. Sempre si piglia il numero, che immediatamente seguiria l'vltimo termine della Progressione nell'ordinata ascensione de precedenti: li quali due numeri; cioè l'vltimo termine, e quello che doueria seguitare, si sommano insieme: il che fatto, detti numeri si moltiplicano l'vn l'altro, & il Prodotto si torna à moltiplicare per la somma, che fece quei due stessi termini. Finalmente diuidendo quest'vltimo Prodotto prima per il numero ascendente delle Progressione, e poi per regola generale per 6; il Quotiente vltimo sarà la somma cercata. Alla pratica.

Voglio trouare la somma di tutti li numeri quadrati di questa progressione 4 8.12. 16.20. 24 li quadrati de quali sono 16.64.144.256. 400. e 576. mà per trouarla magistralmente si fà cosi. Il termine, che per ordine della proposta progressione doueria seguitare è 28. Sommo adunque insieme il 24 (vltimo termine) con questo 28 (termine, che doueria seguitare,) e fanno 52. Dipoi moltiplicando l'vn l'altro questi 3. numeri; cioè 24,28, e 52, fanno 34944; e questo partito prima per 4. (numero ascendente della Progressione) e poi per regola generale per 6, ne verrà di Prodotto 1456, numero cercato per tutta la somma de sudetti quadrati Si poteua anco partire quel 34944 in vn sol colpo per 24, poiche il 4, & il 6. sono il ripiego del 24.

La somma di quanti termini si vogliono nella Progressione naturale sempre sarà numero triangolare, come qui si vede 1.2.3.4.5.&c. Mà la somma di quati termini si vogliono pur nella Progressione, che comincia dall'Vnità, ed ascende per due Vnità sempre forma numero quadrato, come 1.3.5.7.9.&c.

					15
				10	o
		6		o	oo
	3	o		oo	ooo
1	o	oo		ooo	oooo
o.	oo.	ooo.		oooo.	ooooo
					25
			16		ooooo
		9	oooo		ooooo
	4	ooo	oooo		ooooo
1	oo	ooo	oooo		ooooo
o	oo	ooo	oooo		ooooo

La sõma di quei termini che di tre in tre ascendono formano vn Pentagono. Se ascendono di quattro in quattro, formano vn Essagono, e così successiuamente. S'intende però sempre, che dette Progressioni cominciano dall'Vnità. Pentagono è vna figura superficiale, che consta di cinque angoli, e di 5. lati. L'Essagono di sei, &c. Si che per sapere (verbi gratia) quanti Soldati formariano vn Squadrone di figura Pentagonale, e che stando in filla con egual distanza ne capissero 35 per lato: basta a sommar insieme 35 termini d'vna Progressione, che cominciando dall'Vnità ascendi di trè in trè; del che facendone proua Aritmeticamente ci capiriano Soldati 5616. Mà notate di gratia per regola vniuersale, che il numero da colocare nel secondo luogo della Progressione è sempre l'Vnità manco de i lati della figura, che si pretende di Formare. Per vna figura triangolare tal numero è 2. Per vna quadrata è 3.&c. Dal che si caua subito l'ascendenza di tal Progressione.

Come

Come si trouino li termini delle progressioni.

PEr regola generale la quantità de termini di qual si voglia spetie di Progressione Aritmetica, mediante la notitia del primo, & vltimo termine, e del numero ascendente, facilissimamente si troua così. Sempre si caua il primo termine dall'vltimo, & il rimanente si parte per il numero ascendente; e così per regola generale aggiongendo l'Vnità al Quotiente di tal diuisione; quella somma sarà la quãtità de' termini ricercati. Alla pratica. Domando. Quanti termini hauerà vna Progressione, che comincia da 7 termini in 21, & ascende per 2?

Faccio così. Cauo 7 da 21, e mi resta 14. questo 14 parto per 2. (numero ascendente) e di Quotiente ne viene 7. al quale aggiongendoui l'vnità, fà 8, e tanti sono li termini di tal Progressione, come quì si vede 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21.

Se per sorte nel partire il numero sottratto per il numero ascendente vi restasse qualche rotto; ciò non pregiudica all'operatione; ma saria segno, che l'vltimo termine è imperfetto: non hauendo per auentura hauuto tempo a sufficienza, per crescere. Il che accaderia, se la proposta Progressione cominciasse con 7, terminasse con 22. e l'ascendente fosse pur 2. perche li termini sariano $8\frac{1}{2}$, *& sic de singulis.*

Come si troui il numero ascendente.

VOlendo poi trouare il numero ascendente di qual si voglia spetie di Progressione Aritmetica, questo si fà per la notitia del primo, & vltimo termine, e della quantità de' termini, così. Sempre si caua il primo termine dall'vltimo, & il restante si parte per vn manco del numero de termini; & il Quotiente sarà il cercato numero ascendente. Esempio. Qual è il numero ascendente d'vna Progressione di 13 termini, che comincia dall'Vnita. e finisce in 25. Faccio così Cauo 1. da 25, e

mi resta 24. questo 24. parto per 12. (cioè per 1. manco del numero de termini) e mi viene 2. e questo è il numero ascendente di tal Progressione 1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Mà se l'vltimo termine del proposto quesito fosse stato 26. in tutti li termini vi saria qualche rotto, eccetto nel primo, & vltimo, e stariano così.

1. 3. 5. 7. 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 26.
$\frac{1}{12}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{7}{12}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{11}{12}$

Voglio dire, che il secondo termine saria $3\frac{1}{12}$. Il terzo saria $5\frac{1}{6}$ &c.

Come si troui la quantità dell'vltimo numero.

FInalmente, se vorremo sapere la quantità dell'vltimo termine, senza hauere cognitione della qualità de nùmeri, ò termini di mezo; si fà così. Primieramente si suppone la cognitione del numero de termini; la quantità del primo termine, e del numero ascendente. Ciò saputo: dal numero de termini si caua l'Vnità, e quello, che resta, si moltiplica per il numero ascendente, ed à questo Prodotto aggiongendo la quantità del primo termine: questo aggregato sarà la quantità del vltimo termine. Mi dichiaro con vn bel quesito.

Vn Pastore, interrogato quante Pecore hauesse, rispose. Io mi trouo hauere Pecore in 15 luoghi, e per ogni 3. che n'habbia nel primo luogo, n'hò 5 nel secondo luogo, n'hò 7 nel terzo, e così successiuamente ne gl'altri. Nel primo luogo hò Pecore 9. Fate mò voi il conto &c. Hor domādo. Quante Pecore sarāno nell'vltimo luogo? Quante saranno in tutto? E quante in ciascun luogo?

In questo quesito stà registrato la nostra proposta. Li 15 luoghi sono il numero delli termini di questa Progressione. Il primo termine è noto, perche vi sono Pecore 9. Il numero ascendente si troua così nel caso nostro.

ſtro. Se nel primo luogo vi ſono Pecore 9.(cioè trè volte 3)nel ſecondo ne ſaranno trè volte 5, (cioè 15) e nel terzo trè volte 7,(cioè 21)&c.come diſſe il Paſtore.Si che il numero aſcendēte ſarà 6. Hor pratichiamo il queſito.

Per ſaper quante Pecore ſiano nell'vltimo termine di queſta Progreſſione Aritmetica, faccio così. Dal numero de termini cauo l'Vnità, cioè 1, e mi reſta 14; quale moltiplicato per 6 (differenza,ò numero aſcendente,) fà 84; al quale aggiongendo le Pecore 9 del primo luogo, ò termine, ſanno 93, e tante Pecore ſono nell'vltimo luogo, ò termine.

Quante Pecore ſiano mò in tutta la Progreſſione, già hò inſegnato il modo di ridurle: tuttauia mi piace di replicarlo. Vniſcanſi inſieme le Pecore del primo, & vltimo termine, e faranno 102; la cui metà ſono 51; e queſto 51 moltiplicandolo per 15,(numero delli termini della Progreſſione) ne produce 765, e tante Pecore hà in tutto il Paſtore.

Quante Pecore poi ſiano per ciaſcun luogo, ò termine della Progreſſione, baſta aggiongere di termine in termine 6 Pecore: come quì ſi vede il tutto regiſtrato.

9.15.21.27.33.39.45.51.57.63.69.75.81.87.93.

La ſomma delle quali ſono apunto Pecore 765.

DELLE PROGRESSIONI GEOMETRICHE.

CAP. III.

PRogreſſioni Geometriche è vn ordine di più numeri, che ſi vanno auanzando l'vn l'altro con eguale moltiplicità, ò proportione; cioè, che vn numero, ò termine

mine di qual si voglia progressione Geometrica auanza, ed è sempre maggior del termine antecedente il doppio, ò trè, ò quattro, ò cinque volte più, &c. Secondo la denominatione della Progressione, come si vede in questi esempij, & altri infiniti, che si potriano proporre.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 128. 256. 512. &c.

1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 2187. 6561. 19683. &c.
3. 6. 12. 24. 48. 96. 192. 384. 668. &c.

Il Denominatore è sempre quel numero per il quale si moltiplica ciascun termine della Progressione. Chi volesse proseguire auanti qualsiuoglia Progressione Geometrica, basta à moltiplicare sempre successiuamente l'vltimo termine per il Denominatore d'essa Progressione. Mà chi volesse tornare in dietro, e continuarla in infinito (il che si può fare) basta à diuidere il minor estremo per il Denominatore, così

512. 256. 128. 64. 32. 16. 8. 4. 2. 1. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{4}$. $\frac{1}{8}$. $\frac{1}{16}$. $\frac{1}{32}$. $\frac{1}{64}$. &c.

Proprietà delle Progressioni Geometriche.

LA proprietà delle Progressioni Geometriche è questa, che la moltiplicatione de termini estremi, ouero egualmente distanti dagli estremi, producono vn istesso numero. Voglio dire, che à moltiplicare il primo termine con l'vltimo, il secondo col penultimo, & il terzo con l'antepenultimo, &c. produrranno vn istesso numero: e se li termini della Progressione fossero dispari, moltiplicando in sè stesso il termine di mezo, lasciarà, ò produrrà parimente numero eguale al Prodotto di qual si voglia copia, detta di sopra. Per esser chiara l'operatione, non porrò esempio.

Modo

Modo ſuccinto, e facile per ſommare ogni Progreſsione Geometrica.

VOlendo raccogliere, ouero ſommare, & vnire inſieme tutti li termini di qualſiuoglia Progreſſione Geometrica, non ſolo principiante dall'Vnità, mà anco da qualſiuoglia altro numero, ſi fà così.

Sempre ſi caua il primo termine dall'vltimo, ed il reſtante ſempre ſi parte per vn manco del numero denominante tal Progreſſione: & il Quotiente aggionto all'vltimo termine, darà la ſomma cercata di tutta la Progreſſione. Alla pratica.

1. 3. 9. 27. 81. 243. 729. 2187.
4. 16. 64. 256. 1024. 4096.

Nella prima di queſte due Progreſſioni, (il Denominatore della quale è 3. perche ciaſcun termine ſi moltiplica per 3. à fine d'hauer il termine, che ſiegue,) cauando il primo termine, (cioè 1.) da 2187, ne reſta 2186. quale partendo per 2, (cioè per vn manco del Denominatore) ne viene di Quotiente 1093. il quale aggionto all'vltimo termine: frà tutti due fanno 3280, e tanto è la ſomma di tutta quella Progreſſione.

Eſempio nella ſeconda propoſta Progreſſione, il cui Denominatore è 4. Cauando il primo termine, (cioè 4) dall'vltimo 4096, ne reſta 4092, quale diuiſo per 3. (cioè per vn manco del Denominatore) ne viene di Quotiente 1364, quale vnito con 4096 (vltimo termine) fà 5460, e tale appunto è la ſomma di tutta quella Progreſſione.

Queſto iſteſſo ordine ſi tiene per ſómare q'ualſiuoglia Progreſſione ſtraordinaria, come la ſeſquialtera, che s'auanza vn tanto e mezo. La ſeſquitertia, che s'auanza vn tanto, e $\frac{1}{3}$. Parimente ſe s'auanzaſſero vn tanto, e $\frac{2}{3}$, ouero vn tanto, & $\frac{1}{4}$ &c. Come queſte qui ſotto notate, e ſimili.

Seſ-

Sesquialtera. 16. 24. 36. 54. 81.
Il suo Denominatore è $1\frac{1}{2}$.

Sesquitertia. 81. 108. 144. 192. 256.
Il suo Denominatore è $1\frac{1}{3}$.

Superpartiente. 27. 45. 75. 125.
Il suo Denominatore è $1\frac{2}{3}$.

Sapendo la somma d'vna quantità di termini di qual si voglia Progressione doppia, che comincia dall'Vnità, e volendo con prestezza trouare la somma d'altri tanti termini, quanti sono quei già noti, senza scriuerli; per regola ferma, e generale si fà così. Ecco 5 termini 1. 2. 4. 8. 16. La somma de quali è 31. Volendo mò sapere la somma di 10 termini: aggiongo alla somma di questi 5 termini l'Vnità, (cioè il primo termine) e fà 32. quale moltiplicandolo in sè stesso, fà 1024 dal quale cauando per regola ferma il primo termine, resta 1023, e questa è la somma di 10 termini. S'io volessi la somma di 20. termini, basta aggiongere l'Vnità alla somma delli 10. termini, (cioè al 1023.) e tornariano 1024, e questo moltiplicandolo in sè stesso, e poi cauandone 1, resteria 1048.575 per la somma di 20 termini, e questo basti, per dar campo all'intelletto. Vero è, che chi hauesse voluto sapere alla prima la somma di 20 termini: non occorreria cauare l'Vnità se non dall'vltima quadratura: poiche le si caua dalle quadrature di mezo: bisogna poi aggiongerla subito, per fare l'altra operatione, &c.

Bellissima qualità delle Progressioni Geometriche.

QValsiuoglia Progression Geometrica, che comincia dall'Vnità hà questa bellissima, & vtile proprietà: che qualsiuoglia termine moltiplicato in sè stesso forma vn numero, che serue per quel termine tanto

to lontano da esso; quanto fui è lontano dall'Vnità. In oltre moltiplicando vn numero, qual si sia, con vn altro maggiore, si produce vn altro numero, da colocare in quel termine tanto lontano dal numero maggiore, quanto il minore è lõtano dall'Vnità; dalla quale operatione si caua il modo di formare vna Progressione con l'aiuto d'alcuni pochi termini descritti: ma per maggior franchisia sotto la Progressione Geometrica si mette la Progressione Aritmetica naturale, che non serue ad altro, che a colocare con prestezza, e senza errore li termini della Progressione Geometrica; & acciò l'esperienza faccia chiaro il tutto; qui sotto metterò in ordinanza la propositione. La prima fila sarà la Progressione Geometrica: l'altra la naturale.

1. 2. 4. 8. 16. 32. 64. 256. 1024.
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Alla pratica. Moltiplicando (per esempio) il 16 in sè stesso, fà 256; e perche il 16 è sopra il 4 della Progressione naturale; ciò vuol significar, che si come il 16 a man manca hà 4 termini verso l'Vnità: così il suo Prodotto 256 và colocato lontano 4 termini verso man dritta, cioè sopra l'8, &c.

All'altra pratica. Voglio vn numero da mettere sopra il 10. Per trouarlo, bisogna a moltiplicare in sè stesso il 32, posto sopra il 5: ma lo voglio trouare per l'altro modo così. Bisogna, ch'io troui due numeri nella Progressione naturale, che sommati insieme facciano 10; e questi sono 4, e 6. E perche questi due numeri hanno sopra di sè 16, e 64; moltiplico questo 16 col 64, e mi danno 1024, da colocare sopra il 10: e se ne farai proua, trouarai, che detto 1024 è tanto lontano dal 64, quanto il 16 è lontano dall'Vnità; come dissi da principio. Vero è, che il più franco modo di formare qual si voglia Progressione sia il moltiplicare successi-

ua-

namente ciascun termine per la denominatione di essa.

Non hò trouato li numeri di tutta la Progressione, acciò l'operatione spichi meglio. Se vorrai li numeri da mettere sopra il 7, sopra il 9, e sopra l' 11, opera come sopra; col qual ordine si tiraria in longo la Progressione, quanto piace. Anzi questo istesso modo si tiene con qual si voglia Progressione, che non comincia dall' Vnità, purche il numero prodotto dalla moltiplicatione, si parti per il numero del primo termine della Progressione, perche il Quotiente sarà il numero, che si cerca.

QVESITI SOLVBILI

Per le Regole delle Progressioni.

CAP. IV.

PEr fine di questo trattato delle Progressioni voglio sciogliere alcuni quesiti, quali se bene pareranno superflui, e leggieri: ad ogni modo dispongono l' ingegno dell'huomo per filolofare, e per apprendere cose più alte, &c.

Quesito Primo.

Sono due huomini, che nell' istesso punto, ò tempo per andare a Roma si partono da Casa. Il primo fà ogni giorno 20 miglia, e l'altro lo và seguitando in questa forma. Il primo giorno fà vn sol miglio; il secondo giorno ne fà 2; il terzo ne fà 3; e così prosegue secondo l'ordine della Progressione naturale. Domando. In quanto tempo il secondo allongarà il primo? E se il primo facesse 25 miglia, e $\frac{1}{2}$ ogni giorno; e l'altro ne facesse vn solo il primo giorno, 3 il secondo giorno, 5 il terzo, 7 il quarto giorno, &c. In quanto tempo l'allongaria?

Questi, e qual si voglia simile quesito senza le Regole

le delle Progressioni Aritmetiche, saria quasi impossibile il poterle sciogliere; ma con l'aiuto loro facilissimamente si risoluono così. Per regola ferma sempre si radoppia il viaggio, che fà egualmente ciascun giorno il primo mobile, la qual somma viene ad essere il viaggio, che il secondo mobile fà il primo, e l'vltimo giorno; quando arriuò il compagno. Cauando adunque da questa somma il viaggio del primo giorno, vi restarà il viaggio, ò quantità dell' vltimo termine della Progressione. Per saper mò in quanti giorni l'allongarà, Io dico per regola infallibile, che l'allongarà in tanti giorni, quanti sono li termini della Progressione. O pratichiamo il primo esempio. Raddoppia le 20. miglia, che ogni giorno fà il primo mobile: e fanno 40 (Viaggio, che fà il secondo mobile per il primo, e l'vltimo giorno.) Cauo 1 da 40, e resta 39, ma perche nella Progressione naturale l'vltimo termine contiene il numero di tutti li termini; non si passa più oltre: ma si conclude, che in 39. giorni il secondo aggiõgerà il primo cõpagno.

Per l'altro esempio. Raddoppia 25 $\frac{1}{2}$, e fà 51; dal quale cauando il viaggio, che l'altro fà il primo giorno, (cioè 1.) ne resta 50; Per saper mò quanti termini siano in questa Progressione; già hò insegnato: nondimeno quì lo replico. Dal 50. cauo il primo termine, e resta 49: qual partisco per 2 (numero ascendente) e ne viene 24 $\frac{1}{2}$, al quale aggiongendo il primo termine fà 25 $\frac{1}{2}$ Adunque in 25. giorni, e $\frac{1}{2}$ il secondo allongarà il primo compagno del secondo proposto quesito: Così si procede con qual si voglia altro simile.

Quesito Secondo.

Sono due Formiche in vn piano longo palmi 100. l'vna da vn capo, e l'altra dall'altro capo. Vna di loro camina il giorno $\frac{1}{3}$ di Palmo, e la notte ne torna indietro $\frac{1}{4}$ di Palmo: l'altra Formica camina il giorno $\frac{1}{7}$ di

Pal-

Palmo, e la notte ne torna indietro $\frac{1}{6}$ di Palmo. Domando; in quanto tempo s'incontraranno insieme queste due Formiche?

Molti in simili quesiti hanno sbagliato, ed il loro errore è fatto manifesto dal Tartaglia. Par. 2. lib. 1. c. 15. quesito 27. Per regola infallibile si fà adunque così.

Primieramente s'vnisce insieme il viaggio, che frà tutte due fanno le Formiche di giorno, e quello, che fanno di notte, cauando il viaggio del ritorno, che fanno di notte dal viaggio, che all'inanzi fanno di giorno. Il viaggio del giorno è $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{5}$, e frà tutti due $\frac{8}{15}$. Il viaggio della notte è $\frac{1}{4}$, & $\frac{1}{6}$, e frà tutte due $\frac{5}{12}$. Cauando mò $\frac{5}{12}$, da $\frac{8}{15}$, resta $\frac{7}{60}$. Adunque le Formiche frà giorno, e notte s'auicinano $\frac{7}{60}$ di Palmo; ma perche all'vltimo giorno, nel quale s'incontrarāno le Formiche, non li seguirà la notte, che le faccia tornar indietro, però bisogna cauare dalli Palmi 100. quei $\frac{5}{12}$, che di notte si slontanano l'vna dall'altra, e restaranno Palmi 99 $\frac{7}{12}$. Fatto questo si dice. Se $\frac{7}{12}$ di Palmo si fanno in vn sol giorno Palmi 99 $\frac{7}{12}$ in quanti giorni si faranno? Si faranno in giorni 853 $\frac{4}{7}$. Ma perche in simili quesiti quel rotto, cioè $\frac{4}{7}$ non dice il vero, per rispetto dell'vltimo rotto, che manca: tal rotto s'aggiusta nel giorno seguente, così. Bisogna vedere quanto viaggio habbiano fatto le Formiche in quei giorni 853 intieri. Facendone prona à $\frac{7}{6}$, il giorno, haueranno fatto palmi 99 $\frac{31}{60}$, quali cauati da Palmi 100. Finalmente bisogna vedere, in quanto tēpo dette Formiche faranno questo rotto $\frac{9}{60}$ à ragion del viaggio, che fanno il giorno frà tutte due non computandoui il ritorno, che fariano la notte dicendo. Se $\frac{8}{15}$ di Palmo si fanno in vn giorno, in quanto tempo si faranno $\frac{29}{60}$? Si faranno in $\frac{29}{12}$ di giorni; quali aggionti alli 853 giorni intieri, fanno in tutto giorni 853, hore 21, minuti 45, cioè $\frac{3}{4}$ d'hora.

Que-

Quesito Terzo.

Vno piglia à far vn Pozzo nuouo fondo Piedi 24. per Scud. 60. di fattura. Hauendone cauato Piedi 18, troua l'Acqua, nè può passar auanti. Nacque gran lite frà il Maestro, ed il Padrone: perche il Maestro pretendeua d'esser pagato a proportione della profondità, & il Padrone voleua pagarlo a proportione della fatica: poiche più laborioso assai saria l'hauere a cauare qualsiuoglia de' restati piedi 6, che qual si sia de' già cauati piedi 18. Fù giudicato, che il Maestro fosse pagato a ragion di fatica. Domando, Quanto deue hauere di ragione?

Qui bisogna osseruare, che quei piedi 24 di profondità formano vna Progressione Aritmetica: in modo tale, che la Terra di ciascun piede successiuamente porta maggior tratto, e fatica nel cauarla fuori: e però venendo la fatica del primo piede con la fatica dell'vltimo: la fatica del secondo con quella del penultimo, &c. si vengono ad eguagliare tutti a due, a due. Hora mò, per risoluere il quesito, si somma la Progressione di tutti li piedi 24, che doueua hauere di profondità il Pozzo; e s'hauerà 300. Si somma anco la Progressione de' piedi cauati 18; s'hauerà 171; e poi si dice. Se 300. deue hauere Scud. 60. Quanti n'hauerà 171? Operando hauerà Scud. 34. Paoli 2. Baiocchi 9. E tanto appunto deue hauere il Maestro per li cauati piedi 18.

Simile quesito propone Fra Luca dal Borgo, & insegna il sudetto modo di risoluerlo; e se bene il Tartaglia, l'Vnicorno, & altri lo censurano, per non potersi prouare matematicamente, che il secondo piede sia di fatica doppia al primo; il terzo di fatica trippla, &c. a me pare però, che sia il più ragioneuole. Anzi, se non matematicamẽte, naturalmẽte almeno si può prouare, che la fatica sarà più che dupla: più che tripla, &c. Lo dichino li Contadini, che cauano li fossi, e quei, che ne'

Fiumi alzano gli Argini. Se la Terra si getta alto solamente vn piede, ò due si tien sodo tutto il giorno con soauità mercenaria: ma se la Terra si getta alta 5 6, ouero più piedi, è tanto graue la violenza, & agitatione del corpo, che rende impossibile il durarui. Adunque, &c.

Quanto poi alla Terra, che si tira sù con la Mastella, certo, che porta duplicata, triplicata fatica, &c. non solamente *extensiuè*, ma anco *intensiuè*, perche certo è, che la terra dell'vltimo piede non solo si tira sù 24. volte più del primo: ma quanto più è distante, tanto più aggraua le braccia, e la vita di chi fatica, e se bene quanto all'empire la Mastella pare non vi sia la douuta augumentata fatica totalmente, si può però compensare, e colla maggior fatica, che *intensiuè* si proua nel tirar sù la Terra; e per il maggior pericolo, in che si espone, cauando più sotto, &c.

Quesito Quarto.

Vn Contadino vende vn Cauallo ad vn gentil huomo per tanto Formento in questa forma. Che quando l'vno consegna il Cauallo, l'altro li dia vn sol grano di Formento: l'altro giorno ne dia 2. grani; il terzo giorno ne dia 4; e così per 30. giorni continui proseguischi secondo l'ordine della Progressione Geometrica doppia. Domãdo. Quanti grani, e quãte Corbe di Formento costarà il Cauallo, a ragione di Stara 2, e di lib. 250. per Corba, e di Quarte 5 il Staro? Di più quanti Scudi verrà venduto detto Cauallo a ragion di Scud. 3. la Corba del Formento?

Quanto al ritrouare la quantità de' grani, già hò insegnato il modo. La somma de' quali è questa: grani di Formento. 1. 073. 741. 823. Per saper mò quante Corbe facciano quelli grani: bisogna prima sapere quanti grani facciano vna lib. Nel cap. del legare l'insegnai; ma qui lo replico per più facilitar l'operatione. La libra si di-

diuide in 12. oncie; ciascun oncia in 24 Scrupoli; ciascun scrupolo in 24 grani: e ciascun grano pesa quanto pesa vn grano di Formento. Si che 6912. grani di Formento fanno vna Libra. Diuidasi adunque tutta la somma de' grani per 6912, e ne verranno Libre 155. 344; e queste di nuouo diuise per 250. (quantità d'vna Corba) ne verranno Corbe 621. Quarte 3. Lib. 19. e $\frac{4993}{8912}$; che a ragion di scud. 3. la Corba; il Cauallo saria venduto scud. 1864. lir. 0. sol. 10. den. 2. $\frac{220}{250}$ (Lasciando da parte quel rotto di Libra. Veramente il Contadino non s'ingannò.

Quesito Quinto.

Vno vuol dare ad vn altro vn million d'oro; se per giorni 64. gli vuol dare tanto Formento secondo l'ordine della Progressione Geometrica doppia, cominciando il primo giorno con vn sol grano. Domando. Si può pagare questo million d'oro?

Per venire alle curte: operando secondo l'ordine del sommare, le Progressioni Geometriche, ci vorriano tanti grani di Formento, e fariano tante moggia, che per leuarle ci vorriano tante Barche, quante qui sotto sono notate. Stara 20 fanno vn moggio. Vn Staro pesi lib. 65. Ciascuna Barca lieui moggia 4000, e ciascun moggio colti solamente scudi 10. di Paoli.

| | | |

se tãte se ne trouaſſero in tutto il Mõdo, mi rimetto &c.

2

La valuta di tutto il Formento è Scudi di Paoli nu. 20,

1

529. 229. 070. 634 ½.

Se quel dal million d' oro ſi ſia ingannato *per ſe patet*, Dico di nõ.

Altre Bagattellierie ſi potriano proporre, nelle quali non voglio perder il tempo. Col precedente, e con vn poco d'ingegno s'arriuarà al punto, &c.

TRATTATO D' ESTRATTIONE DI RADICI.

CAP. I.

LA ſettima, & vltima ſpetie dell'Algoriſmo ſi chiama eſtrattione di radici, le quali ſono innumerabili, e di varie ſpetie. E ſi come la radice delle piante, &c. è la parte più baſſa, che ſtà ſotto terra; e dalla quale deriuano li rami, le foglie, li fiori, e li frutti: cosi (per ſimilitudine) qual ſi voglia numero, moltiplicato in sè ſteſſo, viene ad eſſere la radice di quel ſuo Prodotto: ma perche quel primo Prodotto può ſucceſſiuamente andarſi moltiplicando per la medeſima radice: ne ſiegue, che li Prodotti ſaranno innumerabili, e per diſtinguere l'vno dall'altro, haueranno diuerſa denominatione, e per conſequenza la radice ancor lei (ſe bene è ſempre l'iſteſſa) nondimeno per la relatione, che hà con qual ſi voglia ſuo Prodotto, ſarà diuerſamente denominata. Mà veniamo alle curte.

Qual ſi voglia numero, moltiplicato in sè ſteſſo produce vn numero quadrato: e quel numero, che lo produce, ſarà la ſua radice. Moltiplicando poſcia detto nume-

mero col suo quadrato, produce vn numero, chiamato cubo. Moltiplicando dipoi col cubo, produce vn numero chiamato quadrato di quadrato. Moltiplicandolo col quadrato di quadrato, ne produce vn numero, detto prima relato. Moltiplicandolo in oltre col primo relato, produce vn numero, detto quadrato cubo, e così successiuamente, come qui sotto nella radice 2. si fà con esempio chiaro.

La radice quadra è la prima di tutte; e però ne siegue che ogni volta, che si dica radice (senz'altro) s'intende, e deue intendere della radice quadra; nelle altre spetie di radici si suol mettere la denominatione.

Estrattione di Radici.

2 via	2 fà	4	Quadrato.	
2 via	4 fà	8	Cubo.	
2 via	8 fà	16	Quadrato di quadrato.	
2 via	16 fa	32	Primo relato.	
2 via	32 fà	64	Quadrato cubo.	
2 via	64 fà	128	Secondo relato.	(drato,
2 via	128 fa	256	Quadrato di quadrato di qua.	
2 via	256 fà	512	Cubo di cubo.	
2 via	512 fà	1024	Quadrato primo relato.	
2 via	1024 fà	2048	Terzo relato.	(to.
2 via	2048 fà	4096	Cubo del quadrato di quadra.	
2 via	4096 fà	8192	Quarto relato.	
2 via	8192 fà	16384	Quadrato del secondo relato.	
2 via	16384 fa	32768	Cubo del primo relato.	
2 via	&c. fà	&c.		

E così procedendo in infinito. E quello si dice della radice. 2. (pigliata per esempio) si dice, e fa a proposito per qualsiuoglia altro numero. Adunque il 2 sarà la radi-

radice di tutti li suoi Prodotti soprascritti: e perciò si chiamarà radice quadra in risguardo al 4. Radice cuba in risguardo all'8. Radice quadra della radice quadra in risguardo al 16 Radice prima relata in risguardo a 32. e così in risguardo a gli altri suoi Prodotti, haverà altra denominatione, &c.

Modo di Cauare la Radice quadra da Numeri.

CAP. II.

NE numeri minori, (cioè sino a 100) se sarà numero quadrato, non porta difficoltà alcuna: & ogn'vno, che sappia le seguenti moltiplicationi, saprà cauarne da sè la radice à mente; mà se non sarà precisamente numero quadrato, e sia di qualità, ò quantità discreta: (perche il Matematico tiene l'Vnità per indiuisibile) in tal caso si caua la maggior radice ch'habbia quel numero, & il resto si nota per auanzo. Per esempio.

Vn Cittadino hà 81. Cipressi, de quali ne vorria formare vn quadro perfetto, con quantità eguale per ciascuna filla. S'addimanda: Quanti Cipressi hà da far piantare per filla?

Multiplicationi da saperſi à mente.				
1	via	1	fà	1
2	via	2	fà	4
3	via	3	fà	9
4	via	4	fà	16
5	via	5	fà	25
6	via	6	fà	36
7	via	7	fà	49
8	via	8	fà	64
9	via	9	fà	81
10	via	10	fà	100

Cauando la radice da 81, ne viene precisamente 9, e tanti Cipressi hà da far piantar per filla; ma se li Cipressi fossero 82, ò altro numero maggiore (ma non quadro) si dirria, che per filla ne deue piantar 9, e poi n'auanza 1,

non

non potendosi dar à ciascuna filla la sua portione precisa senza tagliar l'auanzo in pezzi. Il che saria sproposito.

Quando si tratta d'estrattione di radici (regolarmente parlando,) sempre s'intende di quantità continua, massime di superficie, la qui Vnità è diuisibile in infinito; e però in tal caso si caua la radice maggiore dal numero, e l'auanzo si mette sopra vna virgoletta in modo di rotto, e sotto di esso si colloca la radice medesima, ma radoppiata. Per esempio.

Vn Cittadino hà vn bel Giardino quadro perfetto; l'area superficiale del quale è piedi 86. pur superficiali. S'addimanda. Quanti piedi lineali sarà ciascun lato di detto Giardino?

La radice di 86 è 9, & auanza 5. il quale posto sopra la virgola, e sotto di essa ponendo la radice duplicata starà così $9\frac{5}{18}$. Adunque il sudetto Giardino è longo per ogni verso piedi lineali num. $9.\frac{5}{18}$, se bene non *perfette*. Il sbaglio però è insensibile nella radice, come altroue si farà manifesto.

Come si caui la radice quadra da numeri maggiori.

NVmero maggiore è qual si voglia numero, che sia più di 100. Per cauar adunque la radice da che numero si voglia, bisogna prima distinguerlo in membri: il che si fà con notare vn punto sopra tutte le figure dispari, cominciando dalla prima à man dritta. Sì che ciascun membro sarà di due figure; eccetto l'vltima verso man mancha, quale alle volte sarà di due, & altre volte d'vna sol figura. La radice poi di tal proposto numero sarà sempre di tante figure, quanti punti, ò membri haurà detto numero.

Per esempio. Volendo cauar la radice da 985. primieramente si caua la radice dal primo membro 9 verso man mancha (che nel proposto numero è d'vna figura sola)

la qual radice è 3. Questa radice 3 si moltiplica in sè stessa, e fà 9, da colocarsi sotto il membro, dal quale si cauò la radice. Dopo questo si fà la sottrattione, e si tira giù l'8 a modo del partire a danda. Dipoi radoppiando la radice 3, fà 6, col quale si diuide l'8, e si fà la sottrattione al solito, colocando il Quotiente 1 appresso la radice 3. Finalmẽte tirando giù il 5 s'haurà 25, dal quale cauando il quadrato del numero radicale 1, (vltimamẽte trouato) restarà 24, & è finita l'operatione. Adũque la radice quadra, ò almen più prossima di 985 è 31 $\frac{24}{63}$.

Numero da cauarsi la radice. Proua naturale. Pro. del 9.





Residuo 24

La proua naturale di questa operatione è moltiplicare la radice in se stessa, e se nell'operatione auanzò qualche cosa, quello s'aggionge al Prodotto, e se l'operatione sarà fatta bene, la somma darà il numero, dal quale si cauò la radice.

Per la regola del 9. la proua si fa così. Si cauano li 9 dalla radice, (che nel caso nostro è 4) Questo 4 si mette tanto sotto, quanto la croce. Fatto questo si moltiplicano insieme li due notati 4, & al Prodotto 16 s'aggionge l'auanzo, e fà 21, dal quale leuandone li 9, resta pur 4. da colocarsi a man manca della croce. Finalmente cauando la proua dal numero proposto, se l'operatione

sarà

sarà ben fatta, restarà parimente 4, (Come di sopra appare chiaro per l'vno, e per l'altro modo.)

Se nel proposto quesito hauesse bisognato procedere più auanti, per la moltitudine delle figure: per prima operatione si saria radoppiato la radice 31, & il Prodotto 62 saria il Diuisore. Pongo quì due altri esempij senza dichiaratione per specularui sopra.

Primo proposto Numero. Secondo proposto numero.

97528. Rad. $312\frac{184}{624}$		140284 Rad. $374\frac{408}{748}$	
9....		9....	
Diu. 6.7		Diu. 6.50	
6		42	5
	6		1—1—1
15	4—1—4	.82	5
1	6	49	
Diu. 62.-142		Diu. 74.338	
124		296	
.188		.424	
4		16	
Residuo 184		Residuo 408	

Vna cosa molto essentiale bisogna auuertire, & è, che in qualsiuoglia diuisione, fatta dal raddoppiamento d'vna, ò più figure radicali, è necessario, che sempre auanzi più, ò almeno precisamente quanto è il quadrato della figura radicale, proceduta da tal diuisione. Per esempio. Nel secondo numero proposto volendo partire 50. per 6, pare, che vi possi entrare 8 volte: ma perche fatta, che fosse la sottrattione, restaria solamente 2, al quale aggiõgendo l'altro 2, che si tira giù, fa solamente 22, dal qua-

le non si potria cauare il quadrato del medesimo 8, ne segue, che bisogna abbassare il Quotiento, e perciò s'è fatto 7. e ciò notisi bene.

Nel fine dell'operatione non può mai auanzar più del doppio della radice; altrimente saria errore; essendo più il Numeratore, che il Denominatore, però in tal caso bisogna alzare il Quotiento.

Secondo questo modo di cauar la radice, bisogna sapere, che in tutti li numeri, che mancano d'vna sola Vnità ad essere numeri quadrati; tal sua radice sarà senza rotto; mà moltiplicandola poi in sè stessa, farà errore d'vna Vnità. Per esempio. Il 15 manca d'vna vnità ad esser numero quadro. La sua radice è $3\frac{6}{8}$, cioè 4 (vno di più) Le radici non precisamente quadre sono dette radici sorde, e diserete le quadre.

Modo d'approssimarsi più alla verità nelle radici sorde.

TRouata la radice propinqua nel modo sudetto (la qual sempre supera il proposto numero) si quadra essa radice, e tutto quello di più, che supera il detto numero, si parte il doppio della radice medesima, e cauando il Quotiente da essa radice, quel, che resta, sarà la radice del proposto numero, assai più vicina alla verità della prima. E cosi con quest'ordine, si può sempre più approssimarsi. Per esempio. La prossima radice di 5. è $2\frac{1}{2}$. Il quadrato di $2\frac{1}{2}$ è $5\frac{1}{16}$ (cioè $\frac{1}{16}$ più del nostro 5.) Diuidasi questo $\frac{1}{16}$ per $4\frac{1}{2}$ (doppio della radice) e ne viene $\frac{1}{72}$, il quale cauato da $2\frac{1}{2}$, ne resta $2\frac{17}{72}$ per la nostra seconda radice di 5. assai più propinqua della prima. E che sia il vero, moltiplichisi questa seconda radice in sè stessa, e farà $5\frac{1}{5184}$. Doue la prima lo superaua d'$\frac{1}{16}$. Adunque sarà. Chi volesse approssimarsi più, operi con questa seconda radice, *vt supra*. E cosi in infinito. Mà tanto quel $\frac{1}{5184}$ è cosa insensibile.

Qui bisogna auuertire, che quel $\frac{1}{16}$, che superchia il pro-

proposto numero 5, non è errore nella radice, ma in tutto il quadrato: siche nella radice sarà (come s'è detto) insensibile.

Quando si tratta di cauare radice da numeri: sempre s'intende di misure superficiali. Questa linea —— supponiamo, che sia vn piede questa si chiamarà vn piede lineale, ma se sarà vn quadrato longo per ogni verso vn piede così |¯¯|, questo si chiama vn piede superficiale, e la radice, cioè ciascun lato di esso quadrato sarà vn piede lineale.

Come si cauì la radice quadra da numeri rotti, e da sani, e rotti.

PRima d'ogni cosa bisogna sempre ridurre il rotto alla sua minima denominatione. E poi. Se il rotto è formato di Numeratore, e Denominatore quadrato (come sono questi, & altri $\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{4}{9}, \frac{1}{16}, \frac{4}{16}, \frac{9}{16}, \frac{1}{25}, \frac{9}{25}, \frac{16}{25}$ &c.) basta cauar la radice dal Numeratore, e dal Denominatore, e collocare ogni radice al suo luogo sotto, o sopra la virgola. Per esempio la radice di $\frac{1}{4}$ sarà $\frac{1}{2}$; di $\frac{4}{16}$ sarà $\frac{2}{4}$; di $\frac{16}{25}$ sarà $\frac{4}{5}$, &c.

Mà se l'vno, ò l'altro numero, che forma il rotto, ouero tutti due non fossero numeri quadrati; per cauarne la radice quadra più prossima nel più sicuro, e facile modo si fà così. Si moltiplica il Numeratore col Denominatore, e la radice propinqua di tal Prodotto si parte per il Denominatore del rotto, e così il Quoziente sarà la radice cercata. Sia l'esempio in $\frac{5}{7}$. Il moltiplicato di 5 con 7, fà 35, la cui prossima radice è $5\frac{10}{11}$, cioè 6. Dividasi adunque 6 per 7, e ne verrà $\frac{6}{7}$. Si che la radice di $\frac{5}{7}$, sarà $\frac{6}{7}$, e la radice di $\frac{3}{10}$ sarà $\frac{9}{10}$, &c.

Sani, e Rotti Quadri.

SE fosse proposto vn numero sano accompagnato da qualche rotto, la radice quadra, ò più prossima

si caua così. Primo, si riducono li numeri sani alla natura del suo rotto (suppostò nella minima denominatione) e s'vniscono con esso. Fatto questo, se tanto il Numeratore, quanto il Denominatore di tal vnione sarà numero quadrato: tal numero sano, e rotto proposto sarà parimente quadrato, la cui radice si troua così. Si caua la radice dal Numeratore, e questa radice partendola per la radice del Denominatore, il Quotiente sarà la radice del proposto numero sano, e rotto. Per esempio serua $5\frac{19}{37}$. Questi sono $\frac{144}{37}$. L'vno, e l'altro numero è quadro. La radice di 144 è 12, e la radice di 25, è 5. Adunque diuidasi 12 per 5, & il Prodotto $2\frac{2}{5}$ sarà la radice quadra del proposto $5\frac{19}{37}$.

Sani, e Rotti non quadri.

MA dopò d'hauere ridotto li sani alla natura del loro rotto, se il Numeratore, ò Denominatore, ouero l'vno, e l'altro non sarà numero quadrato: questo fà manifesto, che nè anco il numero sano, e rotto proposto può esser numero quadrato; la radice sorda, ò propinqua del quale si caua, come si fà quelle de rotti semplici non quadrati; cioè, si moltiplica il Numeratore per il Denominatore, e la radice di tal moltiplicato, ò Prodotto partendola per il Denominatore, il Quotiente sarà la cercata radice propinqua del proposto numero, e rotto non quadrato. Per esempio serua $5\frac{2}{3}$. Questi sono $\frac{17}{3}$, il moltiplicato del quale fà 51, la cui radice è $7\frac{1}{7}$ (già schisato il rotto) Questo $7\frac{1}{7}$ diuidasi per 3, (Denominatore) e di Quotiente ne verrà $2\frac{1}{21}$, e questa sarà la cercata radice propinqua di $5\frac{2}{3}$.

Il modo d'approssimarsi sempre più alla verità, è quello, già insegnato.

ESTRAT-

ESTRATTIONE

Della Radice cuba.

CAP. III.

LA seconda spetie d'estrattione di radici si chiama radice cuba. Nelli numeri digiti, ò minori la radice è d'vna sol figura: & il suo cubo può esser d'vna, ò di due, ouero al più di trè figure. La radice cuba de'numeri minori, ò digiti si contiene in questa tauoletta; da saperſi alla mente, ouero da tenerſi auanti nell'operare.

Radici Cube.	Numeri Cubi.
1	1.
2	8.
3	27.
4	64.
5	125.
6	216.
7	343.
8	512.
9	729.
10	1000.

Ma se il numero non sarà precisamente discreto, ò cubo; per cauarne la radice sorda, ò più prossima, si fà così.

Si caua la radice cuba più prossima dal proposto numero e l'auanzo si mette sopra la virgola, come Numeratore. Per hauer mò il Denominatore, si quadra la trouata radice, la quale subito si triplica, & al numero triplicato s'aggionge il triplicato d'essa radice: e questa somma sarà il Denominatore del rotto. Per esempio. La radice cuba di 24 è 2, & auanza 16 per Numeratore. Il quadrato della radice 2 è 4; che triplicato fà 12; a questo 12 aggiongali 6 (triplicato dell'istesso 2) & in tutto farà 18; e questo è il Denominatore. Adunque la radice cuba propinqua di 24 è $2\frac{8}{9}$. E che sia il vero. Cubasi questo $2\frac{8}{9}$, & in fatti farà $24\frac{80}{729}$. Errore riputato insensibile nella radice.

Co-

Come si caui la radice cuba da numeri maggiori.

HAbbiasi da cauare la radice cuba da questo num.

79507 -- Rad.
64 . . . Cu. 43.

Puntate le figure, vna sì, e due nò: e cauata la radice dal 79: (primo membro) il resto dell'operatione si fà con trè attioni, ò maneggi delle figure radicali.

Diu. 48. 155
144

110
108

. . 27
27

. .

Primo. Si moltiplica per 3 il quadrato del 4 (primo numero radicale,) per hauere il Diuisore 48. col quale si parte il 155, per hauere il 3 (secondo numero radicale.)

Secondo. Si moltiplica parimente per 3 il quadrato del 3. (secondo numero radicale) & il Prodotto si moltiplica per il 4, e farà 108, da sottrarsi dal 110.

Finalmente cauando dall'vltimo residuo 27 il cubo della seconda figura radicale 3, sarà finita l'operatione. E perche non auanza cosa alcuna: il proposto numero è rationale: cioè cubo. S'auanzasse qualche cosa nell' vltima operatione; saria segno, che il proposto numero, e la radice cauata non è cubo, ma sordo. Adunque la radice cuba di 79507 è 43.

Modo d'approssimarsi sempre più nelle radici cube sorde.

1. SI cuba la radice trouata: e la differenza, cioè tutto quello, che scarseggia, ò supera il dato numero, si riserua da parte.

2. Si triplica la radice. Il triplicato si moltiplica per l'istessa radice; & al Prodotto s'aggionge il medesimo triplicato; e con questa somma si parte la differenza.

3. Vltimamente il Quotiente di tal diuisione s'aggion-

gionge alla prima radice, se manco: ouero si sottra, se superò il proposto numero; & il restante sarà la radice più propinqua della prima; e così con quest'ordine si può sempre più approssimarsi in infinito.

Intorno alli rotti.

IN qual si voglia spetie di radice il modo di cauarle è vniuersale, almeno in quanto all'ordine: e però qui sodisfarò per tutte le spetie di radici. Primieramente bisogna sempre ridurre il rotto alla sua minima denominatione, tanto se sarà solo, quanto se sarà accompagnato con sani.

Rotti soli.

SE il Numeratore, & il Denominatore saranno tutti due numeri razionali, ò discreti: si caua la radice dall'vno, e dall'altro, come si fece appunto nelle quadri; però secondo la propria spetie.

Ma se l'vno, ò l'altro, ouero tutti due saranno numeri irrationali, ò sordi; per regola vniuersale si riduce il Denominatore del rotto nella spetie di radici più prossima inferiore, la quale col Numeratore: e dal Prodotto cauandone la proposta radice, e poi diuisa per il medesimo Denominatore, il Quotiente sarà quello si cerca. Per esempio. Volendo cauare la radice cuba prossima di $\frac{5}{6}$; moltiplico il Numeratore col quadrato del Denominatore, e mi viene 180. Dal quale cauandone la radice cuba più prossima mi dà $5\frac{11}{18}$. Finalmente partendo questi $5\frac{11}{18}$ per il Denominatore 6, il Quotiente $\frac{101}{108}$ sarà il cercato. Adunque la radice cuba più prossima di $\frac{5}{8}$ sarà $\frac{101}{108}$. Ma se da $\frac{5}{8}$ volessi cauare la radice cuba di cuba; moltiplicarei il Numeratore per il quadrato, & quadrato del Denominatore, e poi s'opera come sopra. *Et sic de singulis.*

Sani, e rotti.

IN qual si voglia spetie di radici se col rotto saranno sani, che ridotti alla natura del rotto, tanto il Nu-

me-

meratore; quanto il Denominatore resti numero razionale, ò discreto; basta a partire la radice del Numeratore per la radice del Denominatore, perche il Quotiente sarà la radice di tal sano, e rotto. Ma dopo l'hauere ridotto li sani in rotti, se il Numeratore, ò Denominatore, ouero l'vno, e l'altro fossero numeri irrationali, ò sordi; si caua la radice come s'è detto delli rotti soli irrationali. Ma per esser cosa tanto chiara, e facile non vengo all'esempio.

REGOLE VNIVERSALI.

CAP. IV.

PEr non difondermi in molte parole, e per non hauere a far tante repliche, (come fanno alcuni Autori, che fanno spendere vn Mese di studio in quello, che si potria capire in vn sol giorno) hò giudicato bene di toccare in questo luogo alcuni auuisi, ò Regole vniuersali; mediante le quali, e con l'aiuto del triangolo, che poco dopo descriuerò, ogni mediocre ingegno saprà dà sè medesimo cauare ogni sorte di radici, da qual si voglia numero, e sono le seguenti.

1. In qual si voglia spetie di radici il proposto numero si distingue in membri con punti. Nelle radici quadre si puntano le figure vna sì, & vna nò. Nelle cube vna sì, e due nò. Nelle quadr. di quadrate vna sì, e trè nò. Nelle relate vna sì, e quattro nò, e così successiuamente se ne lascia sempre vna di più: auuertendo, che sempre si punta la prima figura verso man dritta: e che di tante figure sarà la radice, quanti saranno li punti, notati nel proposto numero. L'vltimo membro, cioè il primo verso man manca, *vt plurimum*, resta imperfetto quãto al numero delle douute figure: ma nõ importa,

2. Per Regola vniuersale ne' numeri minori di qual si voglia spetie di radici, la radice non può mai essere più d'vna sol figura, la qual si caua con l'aiuto della propria tauolina, che poco dopo si notaranno fino al terzo relato inclusiuè, & il numero dal quale si caua tal radice (come anco di ciascun membro ne' numeri maggiori) sarà al più nelle quadri di due figure: nelle Cubi di trè; nelle quadrate di quadrate di 4. &c.

Nelli numeri maggiori di qualsiuoglia spetie di radici, il primo numero radicale facilissimamente si troua cosi. Balta a cauare la radice dal primo membro verso man manca, ò perfetto, ò imperfetto, che sia: sottrando il sopra più; & al residuo aggiongendoui la prossima prima figura dell'altro membro. Per trouar mò il secondo numero radicale, si fanno tante operationi prima di perfettionare l'opera, quante sono le figure d'vn membro in ciascuna spetie di radici: ciascuna delle quali operationi, ò Prodotti si caua dal residuo dell'altra, e per ciascuna sempre si tira giù vna figura successiuamente, come si costuma ne'partiri a danda: meglio mi dichiararò col triangolo.

4. Nelle sudette operationi bisogna auuertire: che quando qualche Prodotto non si potesse cauare dal residuo dell'altra operatione; bisognaria calare, ò diminuire il secondo numero radicale. Occorre anco alle volte, che in dette operationi auanza più del Diuisore; ma non pregiudica.

5. Quando il proposto numero hauesse più di due punti; s'opera per hauere il terzo numero radicale, come s'operò per hauer il secondo; ma però come se le due prime figure fossero vna sol figura; e per hauere il quarto, s'opera, come se le trè prime fossero vna sola figura, &c.

6. In qualsiuoglia spetie di radici, tanto ne' numeri

minori, quanto ne' maggiori, se il proposto numero sarà sordo, ò irrationale, cauata la più prossima radice, che sia in esso: per regola vniuersale l'auanzo si mette per Numeratore sopra la virgola. Il modo di formare il Denominatore l'insegnarò col triangolo.

7. Nelle radici quadre, e cube sordi si può approssimare sempre più alla verità; ma nell' altre spetie maggiori non occorre: perche 10, 20, 30, 40, e più Vnità in spetie più alte, è minor sbaglio, che vna sola Vnità nelle radici quadre.

8. In ogni spetie di radici tutti quei numeri, che mancano d'vna sola Vnità ad esser rationali, riescono senza rotto; ma facendone poi la proua naturale, superarà d'vna Vnità il proposto numero (errore però insensibile nella radice.)

9. L'auanzo non può esser mai più del Denominatore: e se fosse; bisognaria crescere la seconda figura radicale.

10. La proua naturale, si fà quadrando, cubando, &c. la radice trouata. Se fosse sorda vi s' aggionge l'auanzo: e se l'operatione sarà fatta bene, tornarà il proposto numero, e se nò facesti errore. La proua del 9 si caua cosi. Prima d' ogni cosa si caua il 9. dalla radice trouata: e l'auanzo si conuerte in tutte le spetie di radici, cominciando dalla prima, fino a quella, che attualmente si maneggia: cauando la proua di spetie in spetie: & il residuo di ciascuna moltiplicandolo sempre col residuo, primario della radice. Il che fatto, si caua la proua dall' auanzo la quale s' vnisce con l' altra, già trouata. Finalmente cauando la proua dal proposto numero, se l'operatione sarà fatta bene, restarà l' istessa proua: e se nò: errasti. Poco dopo in pratica mi dichiararò, e meglio si capirà a car. 241.

Ta-

Tauoline per li numeri minori fino al terzo relato.

Per le R. Quad.	Rad. Cube.	Quad. Quad.	Primo relato.
1 via 1 fà 1	1	1	1
2 via 2 fà 4	2	2	2
3 via 3 fà 9	3	3	3
4 via 4 fà 16	4	4	4
5 via 5 fà 25	5	5	5
6 via 6 fà 36	6	6	6
7 via 7 fà 49	7	7	7
8 via 8 fà 64	8	8	8
9 via 9 fà 81	9	9	9

Quad. Cub.		Secondo Relato.		Quad. Quad Quad.	
1	1	1	1	1	1
2	64	2	128	2	256
3	729	3	2187	3	6561
4	4096	4	16384	4	65536
5	15625	5	78125	5	390625
6	46656	6	279936	6	1679616
7	117649	7	823543	7	5764801
8	262144	8	2097152	8	16777216
9	531441	9	4782969	9	43046721

Cubo, Cubo.		Quad. primo relato.		Terzo Relato.	
1	1	1	1	1	1
2	512	2	1024	2	2048
3	19683	3	59049	3	177147
4	262144	4	1048576	4	4194304
5	1953125	5	9765625	5	48828125
6	10077696	6	60466176	6	362797056
7	40353607	7	282475249	7	977326743
8	134217728	8	1073741824	8	8589934592
9	387420489	9	3486784401	9	31381059609

3 c 2
a b

Quad. 2 Quad.

Cubo 3 3 Cubo

Quad. Qu. 4 6 4 Quad. Qu.

P. Relato 5 10 10 5 P. Relato

Quad.Cu 6 15 20 15 6 Quad.Cu.

Sec.Relato 7 21 35 35 21 7 Sec.Relato

Qu.Qu.Qu. 8 28 56 70 56 28 8 Qu.Qu.Qu.

Cub.Cub. 9 36 84 126 126 84 36 9 Cub.Cub.

Q.p.R. 10 45 120 210 252 210 120 45 10 Q.p.R.

3 R. 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 3 R.

C.q.q. 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 c.q.q.

DICHIARATIONE DEL SOPRALINEATO TRIANGOLO.

CAP. V.

LA linea a, b, diuisa in due parti nel punto c, rappresenta li due numeri radicali ne numeri maggiori. La parte a, c significa il primo numero, ò figura, e la parte c, b rappresenta la seconda.

Li nomi, che sono fuori del triangolo verso man mã. ca, significano le dignità della prima parte della linea, ouero della prima figura radicale; e quei, che sono fuori verso man dritta, rappresentano le dignità della seconda parte, ouero della secõda figura radicale. Le quali dignità sono fondate nella Progressione Geometrica doppia.

Tutti quei numeri, che dalla sõmità del triãgolo, cioè dal numero 2, discendono dietro li due lati d'esso triangolo, sono fõdati nella Progression Aritmetica naturale. Tutti gli altri numeri sparsi ordinatamente dẽtro queste due file, ò Progressioni si formano, vnẽdo insieme li due numeri, che nel spatio precedente li stanno sopra. Per esempio, il 6 del terzo spatio è composto con li due 3, che li sono sopra nel secondo spatio; e così con gli altri.

Chi volesse cauar radici di più alta dignità: basta slongar il triangolo, e si slonghino anco le Progressioni Geometriche delle dignità, e quelle Aritmetiche naturali, e poi si troui gli altri numeri, come di sopra hò insegnato.

Vso, ò pratica del Triangolo.

MA per venire all'vso pratico di questo triangolo, io dico, che il cauar qual si voglia radice da vn proposto numero, si fà con tante operationi, ò Prodotti: quanti sono i luoghi caratterizati con numeri nel spatio della radice, che si vuole cauare, & vno di più per regola vniuersale, cominciando sempre dal pri. num. verso man manca. Il primo, & vltimo Prodotto è sempre operatione semplice, che si fà con la sola propria figura radicale: ma tutti gli altri sono Prodotti doppij: perche per ciascun di loro si maneggia la prima, e la seconda figura radicale. Mà come vadino maneggiate dette figure, si comprende chiaramente da quelle due linee interrote, che partendosi da ciascun numero di doppia attione, vna incontra quella dignità à man manca, che col primo numero si deue maneggiare; e l'altra incontra quella

quella della seconda figura. Il primo Prodotto dà sempre il Diuisore, per trouare la seconda figura radicale. L'vltimo Prodotto, (che, come hò detto è semplice, e fuori del triangolo) si forma col ridurre la seconda figura radicale alla sua dignità e tal Prodotto cauandolo dall'vltimo residuo, resta finita l'operatione.

Quando col Diuisore si parte il primo, o l'altro residuo dell'operatione, bisogna auuertire, che il Quotiente non può mai esser più di 9. anzi parerà, che vi possi entrare assai, e v'entrarà poco; perche bisogna, che auanzi tanto, che tirando giù vna figura per ciascuna operatione, vi si possino poi anco cauare tutti gli altri Prodotti: e però si costuma di farne esperienza appartatamente cõ la metà di quello, che pare poterui entrare; perche trouandosi esser di proposito per il terzo, ò quarto Prodotto; gli altri poi ci verranno: posciache sempre diminuiscono; che cosi facendo, in due, ò trè esperienze s'imbrocarà il Quotiente, ò seconda figura radicale di proposito. O veniamo alla pratica.

Habbiasi da cauare la radice prima relata da questo numero 33554772. La prima figura radicale è 3, la quale si caua con l'aiuto della tauolina dal primo membro 335; e auanza 92, che con il 5, che si tira giù, dice 925. Il resto dell' operatione si fà con cinque Prodotti, quattro de quali si contengono nel spatio del primo relato, & il quinto è quello, toccato di sopra, e sono questi.

1 Per hauere il Diuisore 405 si moltiplica per 5 il Quad. di Quad. della prima figura radicale 3. col qual Diuisore si parte il 925, e di Quotiente ne viene 2; per la seconda figura radicale.

2 Si moltiplica per 10. il cubo della prima figura radicale, & il Prodotto si moltiplica per il quadrato della seconda, e farà 1080; da sottrarsi da 1154. e resta 74.

3 Si moltiplica per 10 il cubo della seconda figura, &

Il Prodotto si moltiplica per il quadrato della prima, e farà 720, da cauarsi dal 747. e resta 27.

4 Si moltiplica per 5 il Quad. di Quad. della seconda, & il Prodotto si moltiplica per la semplice prima figura radicale 3, e fara 240; da sottrarsi dal 277. e resta 37.

5 Vltimamente cauando dall'vltimo residuo il relato della seconda figura (cioè 32) restarà 340 per Numeratore del rotto, con che sarà finita l'operatione, come in figura si vede.

		340	o
Numero. 33554772	R. prima Relata. 32	——	Proua —
243		5580.960	o
Diu. 405. — 925			
810	Radice prima Rel. 32		
		Prou. 5.	
Pr. resid. 1154		25 Quad.	
1080 Second. Prod.		Prou. 7	
		35 Cub.	
Sec. Resid. 747		Prou. 8	
720 Terzo Prod.		40 Qu. Qu.	
		Prou. 4	
Terz. resid. 277		20 Pr. Rel.	
240 Quart. Prod.		Prou. 2	
Quart. resid. 372			
32 Quin. Prod.			
Fine dell'operatione. 340			

La proua prima relata della radice è 2. quale vnita con la proua dell'vltimo residuo fà o, e perche la proua del proposto numero è ancor essa o, però l'operatione è ben fatta.

La proua naturale si fà relatando la radice prima rel.

32,

32, e à tal relato aggiongerui l'auanzo 340, poiche la sõma darà il numero, dal qual fù cauata la R prima relata.

Modo di trouare il Denominatore.

IL modo di trouar il Denominatore in qual si voglia spetie di radici, si fà cõ tanti Prodotti, tutti vniti insieme, quãti sono i luoghi caratterizati dẽtro il spatio della radice, che si caua; moltiplicando detti numeri con le dignità à man mãca di tutta la radice trouata, e secõdo che insegnano le linee interrotte, che si portano da essi numeri. Siche il Denominatore del medemo proposto numero si forma cõ questi quattro Prodotti vniti insieme.

1 Si moltiplica per 5 il Quad. di qu. del 32 (nu. radicale) 1

e fà ——————————— 5.242.880

2 Si moltiplica per 10 il suo cubo, qual sarà ---- 327 680

3 Si moltiplica per 10 il suo Quad. qual sarà - 10.240

4 Si moltip. per 5 la medesima radice 32, che sarà 1.160

Tutti insieme fanno 5.580.960

Adunque la radice prima relata più prossima di 33 554 772. sarà ——————————— $32\frac{340}{5.580.960}$.

Modo di far la proua.

NEl decimo auiso, ò regola vniuersale toccai in generale il modo di prouare l'operatione per la regola del 9 Adesso mò in pratica dico cosi.

La proua della radice 32 è 5. Questo 5 si quadra, e fà 25; la cui proua è 7. Questo 7. si moltiplica per la prima proua 5, e fà 35, per il cubo; la cui proua è 8. Questo 8 di nuouo si moltiplica per il 5, e fà 40, per il quadrato di quadrato, la cui proua è 4. Vltimamente questo 4 si moltiplica pur anco per il 5, e farà 20, per il primo relato; la cui proua è 2. Fatto questo, si caua la proua dal 340, che restò, e s'vnisce con l'vltima proua della radice, che fù 2. Il che fatto, si troua, che restarà proua 0. Hora

mò

mò. Io dico; che se l'operatione sara fatta bene; cauando la proua dal proposto numero deue restar 0; ma perche vi resta 0; diremo, che l'operatione è ben fatta.

Vn altro esempio.

HAbbiasi ancora da cauare la nona spetie di radici, detta quad. primo relato da questo numero, che riceue pur solamente due punti, 16 679.880 978 200. La prima figura radicale è 2, la quale si troua con l'aiuto della tauolina del quadrato primo relato, & auanza 643, che col 9 tirato giù, dice 6439. Il resto dell'operatione si doueria fare contro Prodotti. Come si caua dal spatio della dignità quadrata prima relata nel triangolo.

16679880978200	6.439.880.978.200.	8
1024.	20	— 1 —
	6.439.880.978.200. Pr. 8	

8 20 16439880978200

Primo. Per hauer il Diuisore 5120 si moltiplica per 10 il cub. di cub della prima figura radicale. Questo Diuisore pare, che possi entrar nel primo residuo vna volta; mà per le circostanze toccate di sopra, non ci entra alcuna volta, mancandoli vna sola Vnità, per poterui riuscire tutti gli altri Prodotti, e però si mette vno appresso la prima figura radicale, che dirà 20 Mà perche tutti gli altri Prodotti, che si doueriano fare, si riducono in nulla per rispetto di quello nell'vltimo luogo del Quotiente, resta per ciò finita l'operatione. Basta aggiongere al residuo della prima operatione tutti gli altri numeri, che ad vno, ad vno si doueuano tirar giù. Il che fatto; sarà il Numeratore; e questo serui per auuiso in casi simili.

Il denominatore si troua con 9. Prodotti, come insegna il spatio del Quadrato primo relato nel triangolo, e sono questi.

1 Si moltiplica per 10 il cub.cub. 2 1
della radice, che farà —— —— 5.120.000.000.000
2 Si moltiplica per 45 il Qua.quad. 2 1
quad. d'essa radice —— —— 1.152.000.000.000
3 Si moltiplica per 120 il suo se- 1
condo Relato, che sarà —— —— 153.600.000.000
4 Si moltiplica per 210 il suo 1
Quad.cubo, che sarà —— —— 13.440.000.000
5 Si moltiplica per 252 il suo pri- 1
mo Relato, che sarà —— —— 806.400.000
6 Si moltiplica per 210 il suo Quad. 1
che sarà —— —— 33.600.000

7 Si moltiplica per 120 il suo cubo, che sarà — 960.000

8 Si moltiplica per 45 il suo Quad. che sarà —— 18.000

9 Si moltiplica per 10 la semplice radice, che sarà — 200

2 1
Denominatore. 6.439.880.978.200

In questo caso il Numeratore è in quantità eguale al Denominatore: perche il proposto numero manca d'vna sola Vnità ad esser numero rationale, ò discreto, cioè ad esser numero quadrato primo relato.

La proua della radice è 2
4 Quad.
Proua. 4
8 Cub.
Proua. 8
16 Qu. Qu.
Proua. 7
14 Primo Rel.
Proua. 5
10 Qu. Cub.
Proua. 1
2 Secondo Rel.
Proua. 2
4 Q. Q. Q.
Proua. 4
8 Cu. Cu.
Proua. 8
16 Qu. Primo Rel.
Proua. 7

La proua Qu. prima relata della radice è 7 Quella del residuo è 1. quale vnito col 7 fa 8: e perche la proua del proposto numero è 8. l'operatione stà bene.

Vi restaria da prouare, che questo modo d'estraere le radici, e di trouare il Denominatore, è fondato nella vera Geometria, e demonstrabile per quella linea diuisa in due parti, e posta sopra il triangolo. Ma perche tal demostratione ricerca fondamento di Geometria, e longhezza di discorso per volerla far capire; perciò (con buona gratia) rimetto il studioso Lettore alla Seconda Parte del non mai à bastanza lodato Nicolò Tartaglia; nella quale copiosamente ne discorre, per ciascuna spetie di radici fino al terzo relato. E tanto basti in materia d'estrattione di radici.

PRO-

PROGRESSIONE DELLE DIGNITÀ,

Sino à 30. termini, e della loro origine.

CAP. VI.

1. Vnità — 1
2. Radice generale — 2
3. Quadrato — 4
4. Cubo — 8
5. Quad. Quad. — 16
6. Primo Relato — 32
7. Quad. Cubo — 64
8. Secondo Relato — 128
9. Quad. Quad. Quad. — 256
10. Cubo. Cubo — 512
11. Quad. prim. Relato — 1024
12. Terzo Relato — 2.048
13. Cub. Quad. Quad. — 4.096
14. Quarto Relato — 8.192
15. Quad secon. rel. — 16.384
16. Cubo prim. relato — 32.768
17. Qu. Qu. Qu. Qu. — 65.536
18. Quinto relato — 131.072
19. Quad. Cub. Cub. — 262.144
20. Sesto relato — 524.288
21. Quad. Qu. prim. rel. — 1.048.576
22. Quad. terz. rel. — 2.097.152
23. Quad. terz. rel. — 4.194.304
24. Settimo relato — 8.388.608
25. Cub. Qu. Qu. Qu. — 16.777.216
26. Ottauo relato — 33.554.432
27. Quad. quart. rel. — 67.108.864
28. Cu. Cu. Cu. — 134.217.728
29. Quad. Qu. sec. rel. — 268.435.456
30. Nono relato — 536.870.912

LA natural origine di tutte le sudette dignità si trouano mediante l'ammaestramento d'Eucl. lib. 9. prop 8. qual dice così. Se saranno più numeri, (e quanti si vogliono) dall' Vnità continuamente proportionali, il terzo dall' Vnità sarà numero quadrato; e per l'auuenire ogni secondo. Si che tutti li termini dispari saranno quadri, come il quinto, il settimo, &c. Il quarto dall'Vnità sarà Cubo, e per l' auuenire ogni terzo, come il settimo termine, il 10, 13, &c. Il quinto sarà quadr. per quadr. e per l'auuenire ogni quarto: come il 9. termine, il 13. 17. &c. Il sesto sarà primo relato, e per l'auuenire ogni quinto: come l'11, 16, e 21 termine, &c. E così con quest'ordine si procede in infinito. Anzi per maggior intelligenza hò posto a canto delle dignità la Progressione Aritmetica naturale: acciò con prestezza si troui il tutto. Se li nomi delle dignità non cadessero con l'istesso ordine, che sono scritti, non importa: basta, che siano gl'istessi nomi. Per esempio. La 25. dignità dice cub. qu. qu. qu. Se dicesse mò qu. cu. qu. ouero qu. qu. cub. saria l'istesso.

COME SI MANEGGINO LE RADICI.

CAP. VII.

QValsiuoglia spetie di radici si maneggia per tutti gli atti dell'Algorismo: come si maneggiano li numeri sani semplici, e rotti: Vero è, che l'ordine è differente da quello; perche nel maneggiare le radici si tiene quest'ordine, cioè Numerare, ouero rappresentare, Moltiplicare, Partire, Sommare; e Sottrare. Ma ciò per commodità, non per necessità,

Del

Del rappresentar delle Radici.

SE la radice è rationale, ò discreta si numera, e rapresenta semplicemente come si costuma ne' numeri sani, ouero sani rotti. Per esempio, la radice quadra di 4 si rappresenta per numero 2: la radice cuba di 8 si rappresenta parimente per num. 2.: per esser l'vna, e l'altra radice rationale: e così cõ altre spetie di radici. Ma perche le radici sorde non si possono assegnare precisamente nè per num. sano, nè per sano e rotto: però tali radici si rappresentano sordamente così. Per esempio. Douendo rappresentare, e maneggiare la radice quadra di 2: la rappresentarò in questo modo Rx 2. E la radice cuba di 3 la rappresentarò così. Rx cu. 3. &c. La conclusione sia, che si descriue il numero, dal quale si douerìa cauare la radice; ponendoui il conueniente carattere secondo la spetie della radice. Bisogna anco auuertire, che douendo maneggiare dette radici sorde: non si deue cauare da principio la prossima radice, per moltiplicarla, diuiderla, &c. perche quel piccol errore, che contiene ogni radice sorda in sè; moltiplicato, diuiso, &c. nel fine dell'operatione si faria errorazzo grande.

Del moltiplicare delle Radici.

PEr bene intendere quello, che s'hà da dire, bisogna sapere: che tanto fà a moltiplicare vn numero con vn altro: quanto che a moltiplicare qualsiuoglia spetie di dignità dell' vno con la medesima spetie di dignità dell'altro; e poi dal Prodotto cauarne la radice di quella tal spetie di dignità. Per esempio: tanto fà a moltiplicare 2 per 3: quanto fà a moltiplicare il quadrato di 2 con il quadrato di 3, (che saria 36.) e poi cauarne la radice quadra; che pure è 6: come per l'altro modo. Così con qualsiuoglia spetie di radici,

In

In trè modi può occorrere il moltiplicare delle radici (e sempre intendo di radici sorde) Il primo modo è moltiplicare vna radice secondo la sua spetie: cioè, s'ella è radice quadra, quadrarla. S'ella è cuba, cubarla, &c il che non è altro, che ridurre tal radice alla sua dignità. Quando adunque si vorrà moltiplicare vna radice secondo la sua spetie, basta a scancellare, o depennare quel carattere, che tal radice tiene appresso di sè per propria denominatione. Vero è che quello, che prima era lineale, si fà superficiale, &c. e numero rationale. Per esempio. A quadrare ℞ 2, fà ℞ 4: ma perche quel ℞ 4 è superficie, e la sua radice è 2 per numero, però (come hò detto) basta a depennare il carattere &c.

Moltiplicare di Radici secondo la sua spetie.

A quadrar	℞	2	fà	2
A Cubare	℞ Cub.	2	fà	2
A recar a Qu. Qu.	℞ Qu Qu.Qu.	2	fà	2
A relatare	℞ relata	2	fà	2
A Quad.Cub.	℞ Qu. Cub.	2	fà	2
A lecond. rel.	℞ lec.rel.	2	fà	2
A Qu.Qu Qu.	℞ Qu.Qu.Qu.	2	fà	2
A Cub. Cub.	℞ Cub. Cub.	2	fà	2
A Quad. rel.	℞ Quad rel.	2	fà	2
A terzo rel.	℞ terz. rel.	2	fà	2

Moltiplicare di Radici quadre in sè.

℞	2	via	℞	2	fà	2
℞	3		℞	3		3
℞	5		℞	5		5
℞	6		℞	6		6
℞	7		℞	7		7
℞	8		℞	8		8
℞	9		℞	9		9
℞	10		℞	10		10
℞	11		℞	11		11

Et sic de singulis.

Il

Il secondo modo è moltiplicare vna radice con vn altra radice da lei diuersa, ma della medesima spetie. In tal caso si moltiplica l' vna con l'altra, come si fà con numeri, & il Prodotto sarà quello, che si cerca. Vero è, che quando il Prodotto sara rationale; si caua la radice rationale: come in esempio si vede qui sotto.

A moltiplicare.

R. —	2 via	R. —	3 fà	R.	6
R. cu.	2 —	R. cu.	3 —	R. cub.	6
R. R.	2 —	R. R.	3 —	R. R.	6
R. rel.	2 —	R. rel.	3 —	R. rel.	6

A moltiplicare.

R. 3	via	R. 5	fà	R. 15.	
R. 2	—	R. 8	—	R. 16.	cioè 4 per nù.
R. 3	—	R. 12	—	R. 36.	cioè 6. per nu.
R. 6	—	R. 24	—	R. 144.	cioè 12. per nu.

Il terzo modo è moltiplicar vna radice per numero, ò numero per radice. In tal caso si riduce il numero alla natura, ò spetie della radice, con la quale s'hà da moltiplicare: e poi s'opera, come s'è detto di sopra del secondo modo.

Per esempio. Voglio moltiplicare 5 con R. 20. (Notate bene.) Non voglio già inferire, che s' habbia da moltiplicare 5 con 20: ma deuo moltiplicare 5 con la radice, che contiene in sè il 20, e perche la radice di 20 non si può dichiarare per numero: il 20 viene ad essere la quadratura d'essa radice, che stà occulta in esso 20, e però bisogna quadrar quel 5, e R. 25, e poi moltiplicare 20 con 25. Si che a moltiplicar 5. con R. 20 fà R. 500.

A moltiplicare.

℞	2	via	3	fà	℞	——	18
℞ cub.	2	——	3	——	℞ cub.	——	54
℞ ℞	2	——	3	——	℞ ℞	——	162
℞ rel.	2	——	3	——	℞ rel.	——	486
℞ qu. cu.	2	——	3	——	℞ qu. cub.	——	1458

A Moltiplicare.

R 3	via	2	fà	R	12
R 6	——	5	——	R	150
R 20	——	4	——	R	320
2 via R	12	fà	R	48
5 —— R	5	——	R	125

L'istesso ordine si tiene con le altre spetie di radici, non solo ne' numeri sani; ma anco nelli rotti, e sani, e rotti.

Del partire delle Radici.

IL partire è vn atto totalmente contrario al moltiplicare; e però tal atto può occorrere in vno de' trè modi, e con l'istesse cautelle, ò circonstanze dette del moltiplicare delle radici. Quando occorre di partire vn numero per radice, ò radice per numero si conuerte il numero nella natura della radice. Nel resto, s'habbia mò da partire vna radice per vn altra radice a lei simile, ò dissimile in quantita (mà sempre della medesima spetie) sempre si parte l'vna per l'altra, come si costuma ne' numeri: & il Quotiente sarà quello, che si cerca. Vero è, che quando il Quotiente sarà numero rationale, si caua la sua radice rationale: come appare dalli seguenti esempij.

A par-

A partire:

R —— 2 per R —— 2 ne vien 1
R cu. — 2 — R cub. 2 —·— 1
R. R —. 2 — R. R 2 —·— 1
R rel. — 2 — R rel. 2 —·— 1

R — 24 per R — 3 ne viē R 8
R — 10 — R — 5 — R 4 cioè 2. per nu.
R — 80 — R — 5 — R 16 cioè 4. per nu.
R — 23 — R — 7 — R 3 $\frac{2}{7}$

A partire.

R — 12 per 2 ne vien R 3
R cu. 12 — 2 —— R cu. 1
R. R. 12 — 2 —— R. R
R rel. 12 — 2 —— R rel.

R — 63 per 3 ne vien R 7
R — $4\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{7}$ —— R $10\frac{1}{7}$
4 per R 5 ne vien R $3\frac{1}{6}$
6 — R 12 —·—— R 3

In qualsiuoglia spetie di radici quando il Quotiente sarà rationale, tali due radici sono communicanti, ouero commensurabili in longhezza.

La proua del moltiplicare, e del partire le radici si fà secondo l'ordine di tutti li moltiplicari, e li partiri de' numeri: cioè con l'atto contrario.

Del sommare delle radici.

PEr bene intendere questa materia del sommare delle radici, bisogna sapere, che in ogni spetie di radici ve ne sono alcune, che si chiamano frà loro communicanti, ouero commensurabili, & altre nò. Per co-

noſcere in qualſiuoglia ſpetie di radici quali ſiano frà loro communicanti, e quali nò: baſta a partire vna per l'altra: perche, ſe il Quot. ſarà rationale, tali radici ſaranno parimente frà loro communicanti: e ſe nò, ſaranno incommenſurabili. Per eſempio. La R. 5. è communicante con la R. 80: perche partendo 80 per 5 ne vengono 16. (num. rationale) la cui radice è 4 per numero.

Per vn altro modo ſi conoſce, ſe due radici ſono frà loro cõmunicanti, in qual modo ſi và diuerſificando di ſpetie in ſpetie. Circa le quadrate. Due radici ſaranno commenſurabili: quando, che moltiplicate l'vna con l'altra, producono numero rationale. Due radici cube ſaranno frà loro communicanti: ſe moltiplicando il quadrato d'vna con l'altra ſemplice, produce numero rationale; e così ſucceſſiuamente. Cioè, ſempre per regola ferma ſi moltiplica la propinqua dignità inferiore dell'vna per l'altra ſemplice.

Come ſi ſommano due radici eguali.

VOlendo ſommare due radici eguali, baſta a raddoppiare vna di quelle; il che ſi fà moltiplicãdola per la dignità di 2 ſecõdo la ſpetie di tal radice; come appare in eſempio. Se le radici eguali da ſommarſi foſſero trè, ſi moltiplica vna di eſſe per la dignità di 3. *Et ſic de ſingulis.*

A ſommare.	
R — 3 con R- fà R	—12
R cu. 3	— R cu.3 - R cub.24
R.R.3	— R. R.3 - R.R. - 48
R.rel.3	— R.rel.3 - R rel.- 96

Come ſi ſommano le radici communicanti.

VOlendo ſommare due radici communicanti ſi parte la maggiore per la minore. Dipoi, cauãdo la

douu-

douuta radice dal Quotiente, (che sempre farà rationale) tal radice manifesta quante volte la maggiore contenghi la minore. Fatto questo : alla trouata radice (per regola ferma in ogni spetie di radici) s'aggionge l'Vnità, qual Vnità contiene la quantità della radice minore. Vltimamente riducendo questa somma alla sua dignità, e moltiplicandola con la radice minore; il Prodotto sarà la somma delle proposte due radici. Per esẽpio. Volendo sõmare la R di 5 con la R di 80, si parte l'80 per 5; e ne viene R. 16, la cui radice per num. è 4. Hora mò dico, che questo 4 dichiara, che la R. di 80 contiene quattro volte la R di 5. Aggiongendo adunque l'Vnità al 4, fà 5; quale, quadrato che sia, fà 25, e questa quadratura moltiplicandola subito per la R minore 5, s'haurà di Prodotto 125. Adunque la somma di R 5. con la R di 80, è la R. di 125 (quantità irrationale.)

A Sommare.

La R. di 5 con la R. di 80 fà la R. di 125

La R. -- 8 con la R. -- 98 fà la R. -- 162

La R.cub.2 con la R.cub.54 fà la R.cub.128

La R.R. 3 con la R.R.-48 fà la R.R.--243

La R.rel. 4 con la R.rel.128 fà la R.rel.--972

Come si sommano le radici non communicanti, & R con numero.

Bisogna esser auuertito, che il numero è sempre incommensurabile con qualsiuoglia spetie di radici irrationali, ò sorde; Volendo adunque sommare insieme due radici non communicanti : ouero radice con numero : perche è impossibile il poterle mescolare insieme, e proferirle con vn sol nome; bisogna di necessità proferirle, e rappresentarle distintamente con due

nomi per mezo di questo termine. Più. Per esempio. Volendo sommare la R. di 5 con la R. di 3, diremo, che tal somma sarà la R. di 5, più la R. di 3. e questo si chiama semplicemente Binomio. Nell'altre spetie vi si aggionge la qualità del Binomio: come di Binomio, Cubo, Relato, &c.

A som. R. -- 6 con R. 4 fà R. -- 6 più R -- 4
R. cu. 7 -- R. cu. 5 - R. cu. 7 -- R. cu. -5
R. R. -8 -- R. R. 6 - R. R. 8 -- R. R. -6
R. rel. 12 -- R. rel. 10 - R. rel. 12 -- R. rel. 10

A som. R. --- 20 con 3 fà R. 20 —— più -- 3
R. cu. 5 con 4 fà -- 4 —— R. cu. 5
R. R. -- 7 con 6 fà -- 6 —— R. R. 7
R. rel. --10 con 8 fà -- 8 —— R. rel. 10

Del sottrar delle Radici.

IL Sottrar delle radici è vn atto contrario al sommare di esse: e perciò può occorrer in tutti quei modi, che occorre il sommare di quelle. A sottrar vna radice di qual si voglia spetie da vn altra à lei eguale, (mà della medesima spetie,) sempre resta 0.

A sottrare vna radice minore da vna maggiore, à lei communicante; s'opera in tutto, e per tutto come s'è fatto nel sommare di esse: eccetto, che doue nel sommare s'aggionge l'Vnità, nel sottrare si lieua. Per esempio. Volendo sottrare R. 5. da R 125, si parte la maggiore per la minore, e di Quotiente ne viene R. 25, cioè 5 per numero. In vece mò d'aggiongere l'Vnità à questo 5, si lieua, e resta 4, il quale quadrandolo fà 16; col quale moltiplicando la R. 5, fa R. 80; e così diremo, che à sottrar R. 5 da R. 125, resta R. 80.

Quando s'hauesse da sottrare vna radice da vn altra non communicante, ouero da qualche numero: biso-

gna

gna rappresentarli con due nomi per mezo di questo termine, Men. Per esempio. Volendo sottrar R. 3. da R. 5. si dirà, che resta R. 5, men. R. 3, e questo si chiama semplicemente Residuo; se si trattasse di radice cuba, si chiamaria Residuo cubo, *& sic de singulis*. Il men abbreuiato si nota così. m̃.

Modo di maneggiare le radici in diuerse spetie.

QVando s'haueßero da maneggiare radici di diuerse spetie; si conuertono ad vna medesima natura, ò spetie, moltiplicando vicendeuolmente la dignità d'vna con la dignità dell'altra; e poi si moltiplicano, si diuidono, si sommano, e si sottrano secondo l'ordine date nelle precedenti regole. Per esempio. Volendo moltiplicare R. 2. con R. cub. 3, per ridurle ad vna medesima spetie si quadra la R. cuba 3, e farà R. cub. quad 9. di poi si cuba la R. quadra 2, e farà R. quad. cub. 8. Fatto questo, si moltiplica R. quad cub. 8. con R. cub. quad. 9; e farà R. cub. quad. ò quad. cub. 72. (che tutto è vno.) Così quando s'haueße da partire, sommare, ò sottrare, &c.

Questo modo di sommare, e sottrare con il termine del più, e meno, si costuma anco da naturali nelle quantità rationali di natura diuerse. Laonde si dice, che vno (per esempio) deue dare ogn' Anno al suo Padrone 50. Scudi, e più 4 para di Caponi, e più 100. Voua, men 5, cioè 95.

E tanto basti all'ingegnoso in questa materia.

TRATTATO DEL PIV', E DEL MENO.

CAP. VNICO.

PErche le somme, e li resti di quelle radici non communicanti, dichiarate col termine di più, e di meno, si maneggiano frà loro, e con altre quantità per li quattro atti dell'Algorismo (come si praticarà nel trattato de Binomij) in questo luogo parmi necessario l'insegnare, come si maneggino questi due termini del più, e del meno; e con falsi Binomij di quantità rationale esemplificar il tutto, acciò meglio s'intendino poi gli veri Binomij. Per abbreuiar scrittura, il termine di più si rappresentarà così, p, & il termine di men in quest'altro modo m̄. In oltre tutte le quantità solamente, che auanti di se haueranno il segno di men, saranno men: e quelle quantità, che haueranno il segno di più, ò non haueranno segno alcuno, saranno più. E queste Regole del più, e del meno bisogna hauerle marzie nella testa. Ò veniamo alla pratica.

Sommare del più, e del meno.

ASommar più con più: la somma fà sempre più.
A sommar men con men: la somma fà sempre men.
A sommar più con men, ò men con più: si caua la minor quantità, & il resto sarà della denominatione della maggiore; come in esempij si vede.

A ſommar 10 p.4	A sómar 12 m̃ 5	A ſommar 9 p. 3
con 8 p.3	con 13 m̃ 2	con 8 m̃ 4
Fara 18 p.7	Farà 25 m̃ 7	Farà 17 m̃ 8
cioè 25.	çioè 18	cioè 16

E che ciò ſia la verità. Dicaſi 9 p. 3 fa 12; & 8, men 4, reſta 4; ſommando 12 con 4; farà parimente 16. (E rieſce con tutti)

A sómar 15 m̃ 6	A ſommar 16 p.5	A ſommar 13 p.e
con 13 p. 3	con 14 m̃ 5	con 9 m̃ 5
Farà 28 m̃ 3	Farà 30 — 0	Farà 22 m̃ 9
cioè 25		cioè 17

Sottrar del più, e del meno.

A Sottrare più minore da più maggiore reſta ſempre più.

A ſottrar più maggiore da più inferiore; s'abbatte l'inferiore, e reſta men.

A ſottrar più da men, ſi ſomma ſemplicemente, e reſta men.

Circa il men s'oſſerua l'iſteſſa cautella, cioè.

A ſottrar men minore da men maggiore, ſempre reſta men.

A ſottrar men maggiore da men inferiore, s'abbatte l'inferiore, e reſta più.

A ſottrar men da più, ſi ſomma ſemplicemente, e reſta più.

Esempij del più.

A sottr. da 20 p 5	Da 17 p 5	Da 18 p 2
7 p 2	9 p 5	12 p 6
Resta 13 p 3	Rest. 8 p o	Resta 6 m̃ 4
Proua 20 p 5	Proua 17 p 5	Proua 18 p 2

Da 25 m̃ 3	Da 26 m̃ 3
7 p 5	12 p 3
Resta 18 m̃ 8	Resta 14 m̃ 6
Proua 25 m̃ 3	Proua 26 m̃ 3

Esempij del meno.

A sott. da 19 m̃ 5	Da 15 men 3	Da 25 men 4
14 m̃ 3	10 men 3	18 men 7
Resta 5 m̃ 2	Resta 5 men o	Resta 7 più 3
Proua 19 m̃ 5	Proua 15 men 3	Proua 25 men 4
A sott. da 26 più 2	Da 18 più 4	Da 20 più o
17 m̃ 5	13 men 4	12 men 5
Resta 9 più 7	Resta 5 più 8	Resta 8 più 5
Proua 26 più 2	Proua 18 più 4	Proua 20 più o

La proua si fà con l'atto contrario: cioè col sommare.

Mol-

Moltiplicare del più, e del meno.

A Moltiplicar più con più, ò men con men, fà sempre più.

A Moltiplicar più con men, ò men con più, fà sempre men.

Questi moltiplicari si possono far per Crosetta, ò per Scacchiero: ma più lodo quest'vltimo: perche serue molto bene non solo per li Binomij, mà per li trinomij, e moltinomij ancora. Bisogna ancora auuertire, che in questi moltiplicari non si portano via le decine: mà ogni Prodotto si descriue intiero con il carattere di più, ò di meno, secondo le Regole date di sopra. Alla pratica &c.

A moltiplicare Per Crosetta. Per Scacchiero.

8 più 4	15 men 3	9 men 2	9 più 4
per —— 6	per —— 7	8 men 3	5 men 3
Fà 48 più 24	Fà 105 men 21		
che saria 72	che saria 84	Fà 72 m 43 p. 6	men 27 m 18
		che saria 35	45 p. 20
			Fà 45 m 7 m 18
			che saria 26

Partire del più, e del meno.

IL partire del più, e del meno hà l'istesse cautelle, che hà il moltiplicare, cioè:

A partire più per più, ò men per men fà sempre più.
A partire più per men, ò men per più, fà sempre men.

TRAT-

TRATTATO
DE BINOMII.

PEr bene intendere il ſommare, ſottrare, moltiplicare, & il partire qual ſi voglia ſpetie di Binomio: biſogna hauer bene a memoria il ſommare, ſottrare, moltiplicare, e il partire delle radici, e parimente del più, e del meno: il che ſapendo è poi facile il maneggiare li Binomij per tutte le ſpetie dell'Algoriſmo.

Non mi curo di diffinire in queſto luogo, che coſa ſia Binomio, e quante ſiano le di lui ſpetie; sì perche s'aſpetta alla quantità continua, e per eſſer ben inteſo, ci vorria buon fondamento in Geometria: sì anco perche à pieno ſodisfaccio in vn Memoriale Geometrico; che (à Dio piacendo) ſarà eſpoſto al publico; ma quì pretendo ſolamente d'inſegnare il modo di maneggiare qual ſi voglia Binomio, ò Reſiduo per tutte le ſpetie dell'Algoriſmo, &c.

DEL SOMMARE
Li Binomij, e Reſidui.
CAP. I.

QVanto al Sommare. Può occorrere d'hauer à ſommare vn Binomio ò Reſiduo cõ vna quantità di vn ſol nome, come di numero ſolo, ò di R ſola, ò pure con vn altro Binomio, ò Reſiduo; la qual quantità, Binomio, ò Reſiduo può eſſere communicante in parte, ò in tutto con l'altro Binomio, ò Reſiduo: (il che biſogna sẽpre auuertire molto bene;) e poco importa, che ſiano com-

cõmunicanti, ò per Crocetta, ò quel di sotto con quel di sopra. Dal che si caua, che sommando vn Binomio, ò Residuo, con vn altro Binomio, ò Residuo, restarà alle volte solamente vn Binomio, ò Residuo, alle volte restarà vn trinomio; e quando non fossero communicanti in parte alcuna, si formaria vn quadrinomio, e parimente sommando vna quantità di vn sol nome, con vn Binomio, ò Residuo non communicanti, si formaria vn trinomio; come in esempij si vede.

Quì rinfresco alla memoria, che il numero non è mai communicante, ò commensurabile con qual si voglia spetie di radici; ma numero, con numero è sempre commensurabile, e si sommano semplicemente. In qual si voglia proposto esempio le radici, che tengono appresso di sè questo segno * sono fra loro communicanti; però si sommano, come hò insegnato a cart. 252. e come ricerca la regola del più, e men.

A sommare con R. 20. p. 3 questo 4	A sõmar cõ R 20 men 3 questo 4
Farà R. 20. p. 7.	Farà R 20 p. 1.
A sommar con 10. p. R. 3 * questa R 27 *	A sõmar con 10 mẽ R 3 * questa R 27 *
Farà 10. p. R 48	Farà 10 p. R 12

A sommare con R. 20 * p. 3
questa R. 5 *

Farà R. 45. p 3
A sommar con 6 p R 5
questa R 7

Farà 6. p. R. 5. p. R. 7

A som-

A sõmare con 6 men R. 5 questa R. 7

Farà 6 men R. 5 .p. R. 7

A sõmare cõ 7 più R. 27* questo 5 più R. 3*

Farà 12 più R. 48

A sõmare cõ 7 più R. 27* questo 5 men R. 3*

Farà 12 più R. 12

A sõ. cõ R. 20 ✕* men. 3* questo. 3 ✕* p. R. 5*

Farà R. 45 appunto.

A sommare cõ R. 32. men R. 5 questa R. 5.

Farà R. 32 appunto.

A sommare con 7 men R. 27* questo 5 men R. 3*

Farà R. 12 men R. 48

A sõmare cõ 9* ✕ più R. 20* questo R. 80* ✕ men 3*

Farà R. 180. men 6

A som. con R 20* ✕ men 3* questo 3 * ✕ m. R. 5.*

Farà R 5 appunto.

Questi trè vltimi esempij sono communicanti per crocetta.

A sommare con 6. più R. 2* questo R. 18* più R. 10

Farà 6 più R. 32 più R. 10

A sommare con 7 più R. 3 questo 19. più R. 5

Farà 7 più R. 3 più R. 19 più R. 5

A sõmare cõ 6 men R. 13 questo R. 13 più R. 7

Farà 6 più R 7

Nel sommare due Residui, ouero vn Binomio con vn Residuo, si suol tirar vna lineetta curua nel rappresentar tal somma frà l'vno, e l'altro Residuo: perche non facendo così, alle volte tal somma si potria intendere in due modi. E per maggior intelligenza ne pongo quì di sotto trè esempij.

A som-

A sommare con R. 20 men R 6.
questo R 13 men R. 2

Farà R. 20. men. R. 6. (p. R. 13. men R. 2.

A sommar con R 12 più R. 5.
questo R. 3 men R. 2.

Farà R. 12. p. R. 5 (p 3. men R. 2

A sommare con R. 24. men R. 7.
questo R 12 più R. 5.

Farà R. 24. men R. 7 (p. R. 12 p. R. 5.

DEL SOTTRARE.

De' Binomij, e Residui.

CAP. II.

IL sottrare de' Binomij, e Residui è vn atto contrario al sommare di essi, e può occorrere nel modo medesimo; nè vi è altra differenza; se non che doue nel sommare si sommano li nomi communicanti, nel sottrare si sottrano; hauendo però sempre risguardo al sottrar delle radici, e del più, e del meno. E perche il sottrare, è la proua del sommare, esemplificarò alcuni di quei esempij, posti nel sommare; con l'aggionta di quei auuisi, che hanno qualche essentialità.

A sot-

A sottrare da R. 20 più 7	A sottrare da ℞ 20 più 1
questo 4	questo 4
resta R 20 più 3	resta ℞ 20 men 3
A sottrare da ℞ 45 * più 3	A sottr. da ℞ 50 più ℞ 10
questa ℞ 5 *	questo 6
resta ℞ 20 più 3	resta ℞ 50 più ℞ 10 men 6
A sottrar da ℞ 19 men ℞ 3	A sottrar da ℞ 19
questa ℞ 2	questa ℞ 3 più ℞ 2
resta ℞ 19 mé ℞ 5 mé ℞ 2	resta ℞ 19 mé ℞ 3 più ℞ 2

Quando la quantità di vn sol nome non sarà communicante con alcuno de nomi Binomij, ò residui; tal resto bisognarà rappresentarlo con vn residuo trinomiale; come si vede ne tre vltimi esempij: e se bene nell' vltimo v'è vn più, questo significa ancor lui meno. Voglio dire, che da 19 s'hà da cauare 3, e di più ancora 2, che restariano 14, come nel penultimo esempio appare. Siche l'vltimo, e penultimo esempio sono l'istesso. (Hò esemplificato, come se fosse quantità rationale.)

A sottrare da 12 più ℞ 48 *	A sottrare da 12 mé ℞ 48*
questo 5 più ℞ 3 *	questo 5 mé ℞ 3*
resta 7 più ℞ 27	resta 7 mé ℞ 27
A sottrare da 12 più ℞ 12 *	A sottrare da 20 più ℞ 7
questo 5 mé ℞ 3 *	questo 8 più ℞ 5
resta 7 più ℞ 27	resta 12 più ℞ 7 men ℞ 5

A sot-

A ſottrare da 20 men Rx. 7.
questo 8 men Rx. 5

reſta 12 men (Rx. 7. più Rx. 5.)
A ſottrare da 20 men Rx. 7.
questo 8 più Rx. 5.

reſta 12 men (Rx. 7. men Rx. 5.
A ſottrare da R. 24 più R. 14
queſta R. 7. più 2.

reſta R. 24. più R. 14. men (R. 7. più 2.)

A ſottrare da R. 24. men R. 14.
queſta R. 7. più 2.

reſta R. 24 men R. 14. men (R. 7. più 2.

A ſottrare da 20 più R. 7.
questo 8 men R. 5.

reſta 12 più R. 7. più R. 5.

A ſottrare da R. 15. più R. 6.
queſta R. 10. più R. 6.

reſta R. 15. più R. 10.

A ſottrare da R. 24. men R. 14.
queſta R. 7. men R 2.

reſta R. 24. men R. 14. men (R. 7. men. 2.

A ſottrare da R. 24. più R. 14.
queſta R. 7. men R. 2.

reſt. R. 24 più R. 14. men (R. 7. men 2.)
ouero R. 24. più R. 14. più R. 2. men R. 7.

S'osserui bene li sopra scritti esempij; perche alcuni restano di due, altri di trè, & altri di quattro nomi, secondo, che li Binomij, e Residui fra loro sono più, ò meno communicanti. Con l'istesso ordine precedente si sommano, e sottrano li Binomij, con li Trinomij, Quadrinomij, &c. non solo nelle radici quadre; ma nelle Cube, quadrate di quadrate, &c. hauendo sempre l'occhio al sommare, e sottrare delle radici communicanti, e del più, e meno.

DEL MOLTIPLICARE De' Binomij, e Residui.

CAP. III.

IL moltiplicare de' Binomij, e Residui, e Multinomij può occorrere in varij, e diuersi modi, come in esempij qui di sotto si vede. Si può procedere per via di Crosetta; ò per Scacchiero. Ne Multinomij è meglio il Scacchiero, ma ne Binomij, e residui di due nomi, è più sbrigato la Crosetta. Habbiasi bene l'occhio al moltiplicar delle radici con numero, e del più, e del meno. Fatta la moltiplicatione, se nel Prodotto vi fossero radici communicanti, ò numeri semplici: si sommano, ò sottrano secondo, che vuol la regola; accio il Prodotto resti di minor nomi, e per ciò più intelligibile. Li numeri semplici sono sempre frà loro communicanti. In esempio pongo solamente le radici quadre, e le cube, mà con l'istesso ordine, e regole si moltiplicano ancora le spetie di radici più alte.

A mol-

A moltiplicar R 20 più 2
per 9

Farà R. 1620 più 18

A moltiplicar 10 più R. 5. men R. 3
per 4

Farà 40 più R 80. men R. 48.

A moltiplicar 40 più R. 10
per R. 5

Farà R. 8000. più R. 50.

A moltiplicar R. 20. men 2
per 9

Farà R. 1620. men 18.

A moltiplicar R. cub. 128 più 3
per 2

Farà R. cub. 1024 più 6.
A moltiplicar 6 più R. cub. 2
per R. cub. 3

Farà R. cu. 648 più R. cub. 6.

Il modo di quadrar qualsiuoglia spetie di Binomio è l'istesso, che moltiplicar vn Binomio con vn altro Binomio simile: e si fà così, (per il modo più leggiadro) S' vniscono insieme li quadrati delli due nomi di tal Binomio cõ il doppio della moltiplicatione d'vn nome

nell' altro: perche tal sõma sarà la ricercata quadratura. Ma se fossero residui, il doppio del Prodotto d'vn nome nell'altro si sottra dalla somma de' quadrati: & il resto sarà quello si cerca. Si può procedere ancora per via di Crosetta, ò per Scacchiero. Habbiasi l'occhio al sómare due radici eguali. Qui pongo trè esẽpij Eucl. l. 2. prop 4.

A moltiplicar 5 più Rx 3 | A moltiplicar 10. men Rx 5.
per 5 più Rx 3. | per 10 men Rx 5.

Farà 28 più Rx 300 | Farà 105 men Rx 2000

A moltiplicar Rx. cu. 4. m. Rx cu. 2.
per Rx cub. 4. m. Rx. cu. 2.

Farà Rx cu. 16. men 44 p. Rx cu. 4.

Esempij di Binomio con Binomio, e di Residuo con residuo.

A moltiplicar 5 più Rx 2
per 4 più Rx. 3

Farà 20. più Rx. 32. più Rx 75. più Rx 6.

A moltiplicar 5 men Rx 2
per 4 men Rx 3

Farà 20. men Rx 32. men Rx. 75 più Rx 6

A moltiplicar Rx 24 men 3
per Rx 6 men 2

Farà 12 men Rx. 54. men Rx 96. più 6.
cioè 18. men Rx 54. men Rx 96.
cioè 18. men Rx. 299.

A moltiplicar Rx. cu. 7. più Rx. cub. 3
per Rx. cu. 5. più Rx. cub. 2.

Farà Rx. cu. 35. p. Rx. cu. 15. p. Rx. cu. 14. p. Rx. cu. 6.

In questo esempio vi sono Rx, e numeri cõmunicanti.

Esem-

Esempij di Binomio con Residuo, & è contra.

IL modo di moltiplicare vn Binomio con vn residuo, o residuo con Binomio è l'istesso, vsato di sopra ne Binomij con Binomio, &c. Basta hauer ben l'occhio al moltiplicare del più, e del meno.

Quando s'haueſſe da moltiplicare vn Binomio con vn Residuo eguale, il Prodotto sarà sempre rationale: per esser ciascun nome communicante col suo relatiuo nella medesima proportione. L'istesso accade dalla moltiplicatione d'vn residuo con vn Binomio (qual si sia) pur ch'habbia la medesima qualità Eucl. lib. 10. prop. 113, & 114. Mà per conoscere se vi sia questa qualità, basta a moltiplicarla in croce; perche, se produrranno quantità eguale (ancorche vna sia più, e l'altra meno) il Binomio col Residuo saranno communicanti, & haueranno la sudetta qualità.

Il più breue modo di moltiplicare questa sorte di Binomij con residui è questo. Si caua il quadrato, ò la moltiplicatione de nomi minori dalla moltiplicatione de nomi maggiori: & il restante sarà la ricercata moltiplicatione. Come in esempio qui sotto si vede.

A moltiplicar 6 più R 2	A moltiplicar R 18 più 3
per 6 mẽ R 2	per R 18 men 3
Farà 34	Farà 9

A moltiplicar R 32 men R 10
per R 32 più R 10

Farà 22

A moltiplicar 15 men R 72 per 10 più 32 — Farà 102

A moltiplic. R 27 più R 18 per R 12 men R 8 — Farà 6

A moltiplicar R 20 più R 12 per R 5 men R 3 — Farà 4

Questa Regola hà luogo solamente nelle radici quadre. Ma chi volesse trouare vna quantità, che moltiplicata per vn detto Binomio, ò Residuo, producesse quantità rationale in qualsiuoglia spetie di radici, si fà così. Si trouano tãti termini proportionali in cõtinua proportionalità, secondo la proportione del proposto Binomio ò residuo. Trouati che siano li douuti termini; questi saranno quella cercata quantità, che moltiplicata per il detto Binomio, ò residuo, produrrà numero semplice, cioè quantità rationale. Nelle radici cube si trouano trè termini: nelle radici di radici se ne trouano quattro; nelle relate cinque: e così successiuamente, &c.

Quando li trouati termini s'hanno da moltiplicare per vn Binomio, si notano vicendeuolmente col termine di più, e di meno, cominciando sempre col più: ma con residuo si notano sempre tutti col termine di più. Il modo di trouare questi termini si dirà nel seguente trattato delle proportioni. Alla pratica.

Ricerco, che mi sia trouata vna quantità, che moltiplicata per questo Binomio R cub. 6. p. R cub. 4 il Prodotto sia numero rationale. Qual sarà tal quantità?

La proportione del proposto Binomio, cioè di R cub. 6. à R. cub. 4. è la proportione sesquialtera. Hora mò, perche il Binomio è di radice cuba, si deuono trouar tre termini continui proportionali in proportione sesquialtera: quai termini sono questi 36. 24. 16. Adunque de-

descriuendo questi trè termini, come hò insegnato di sopra, staranno così R cu. 36, men R. cu. 24, più R cu. 16, e questa è quella quantità, che moltiplicata col proposto Binomio R cu. 6. più R cu. 4, darà nel Prodotto numero rationale. Quì sotto pongo alcuni esempij, per filosofarui sopra.

A moltip. R cub. 36 men R cu. 24 più R cu. 16
per questo Binom. R cu. 6 R più cu. 4

fa 10 appunto.

A moltip. R cub. 36 più R cu. 24 più R cu. 16
per questo residuo R cu. 6 mē R cu. 4

fa 2 appunto.

A moltip. R R 64. men R R 48 più R R 36 men R R 27.
per questo Binomio R R 4 più R R 3.

fa precisamente 1

A moltip. R R 64 più R R 48 più R R 36. più R R 27.
per questo residuo R R 4. mē R R 3.

fa precisamente 1.

Il modo breuissimo, e facilissimo di moltiplicare, ò di trouare il Prodotto di questi, e simili quesiti è questo. Per regola ferma sempre si riducono li due nomi del Binomio, ò residuo alla loro dignità, e per ciò fare, basta il scanzelare, ò immaginarsi scanzelati quei caratteri R. cub. (ò altri che siano) perche le figure medesime diueranno numero rarionale, e saranno la pretesa dignità. Fatto questo, se li termini da moltiplicarsi col proposto Binomio, ò residuo saranno pari, tanto ne Binomij, quanto ne residui; Si caua semplicemente la di-

gnità minore del Binomio, ò Residuo dalla dignità maggiore di essi, & il resto sarà la ricercata moltiplicatione, ò Prodotto. Mà se li termini saranno dispari per li Binomij si sommano, e per li residui si sottrano le sudette dignità, e quel che ne risulta sarà il preteso Prodotto. Siche nel proposto quesito sommando 6 con 4. fà 10. e però si conclude, che a moltiplicare R cub 36 men R cu. 24. più R cu. 16. per questo Binomio R cu. 6 più R cu. 4 fà precisamente 10. per numero rationale. L'istesso verria operando alla longa: mà per rispetto del più, e del meno tutte le operationi intermedie si consumano frà loro, e restano o. Hor vedasi l'ordine ammirabile, che frà di loro hanno le varie spetie de Binomij, e residui. (Di che per sempre ne sia lodato il sommo Iddio fonte d'ogni sapienza, &c.)

Esempio di Trinomio con Binomio, e Trinomio.

A moltiplicare 10 più R 6 più R 2
per 5 più R 3

più R 300 più R 18 più R 6
50 più R 150 più R 50

Farà 50 più R 300 più R 150 più R 128 più R 6

La R 50 è commmunicante con la R 18, però sommandole, fanno R 128.

A moltiplicare R 10 più R 7 men R 5
per R 8 più R 3 men R 2

men R 20 men R 14 più R 10
più R 30 più R 21 men R 15
R 80 più R 56 mẽ R 40

Farà R 80 più R 56 men R 40 più R 30 più R 21 men R 20 men R 15 men R 14 più R 10
ouero R 80 più R 56 più R 30 più R 21 più R 10 men (R 40 più R 20 più R 15 più R 14)

DEL PARTIRE DE BINOMII, E RESIDVI.

CAP. IV.

IL partire è atto contrario al moltiplicare de Binomij, e Residui: anzi vno è la proua dell'atto contrario: e per esser negotio facilissimo nel partire per vna quantità sola; qui sottopongo alcuni pochi esempij di quantità rationale, & irrationale; corrispondenti a quei del moltiplicare.

A partire per 9
R 1620 più 18
ne vien R 20 più 2

A partire per 2
R cub. 1024 più 6
ne vien R cub. 128 p. 3

A partire per 4
40 più R 80 men R 48
ne vien 10 più R 5 mẽ R 3

A partire per 9
R 1620 men 18
ne vien R 20 men 2

A partire per R 5
R 8000 più R 50
ne vien 40 più R 10

A partire per R cub. 3
R cub. 648 più R cub. 6
ne vien 6 più R cub. 2

Modo

Modo di partire ogni quantità per qualsiuoglia spetie di Binomio, ò Residuo.

PEr ben intendere questa specialissima Regola, bisogna sapere, che tanto fà a partire vn numero per vn altro, quanto che a moltiplicar detti due numeri per qualsiuoglia altro numero à capriccio, e poi partire vn Prodotto per l'altro. Per esempio. A partire per 5 questo 30. di Quotiente ne vien 6. Hora mò, moltiplicasi à capriccio quel 5. e quel 30 per 8, che farà 40, e 240. Diuidendo poi 240 per 40, ne viene parimente 6, come prima.

Perche adunque non si può partire vn num. per qual si voglia spetie di Binomio, ò di Residuo se prima non si riduchino ad vna medesima natura; perciò bisogna sempre trouare (per la regola insegnata di sopra) vna quantità, che moltiplicata col proposto Binomio, ò residuo, (Diuisore) produchi quanti à rationale. Trouata tal quantità: per essa si moltiplica il Diuisore, & il numero da partirsi. Finalmente partendo vn Prodotto per l'altro; il Quotiente sarà la diuisione cercata. Alla pratica.

Habbiasi da partire 10 per questo Binomio R 15 più R 3. Primieramente bisogna moltiplicare il 10, & il Binomio, per il suo residuo, cioè per R 15, men R 3. Moltiplicandolo col Binomio, s'hauerà 6 per Diuisore rationale, e moltiplicandolo col 10 s'hauera R 1500, men 30, da partirsi per 6. Fatta la diuisione di Quotiente ne verrà R 41 $\frac{2}{3}$ men 5. Come in figura si vede.

A partire per R 15 più 3 questo 10 ne vien R 41 $\frac{2}{3}$ mẽ 5

Residuo R 15 mẽ 3 R 15 men 3

Diuisore 6 Num. da par. R 1500 men 30

Quotiente R 41 $\frac{2}{3}$ men 5

Ma ricordateui, che per diuidere la R 1500, bisogna quadrar il 6, cioè si deue partire per 36. ma il 30. per

esser

esser numero rationale, si parte semplicemente per 6.

Se s'haueſſe da partire per R 15 men 3 queſto 10, si pigliaria il suo Binomio R 15 più 3, operando come sopra.

Quando s'haueſſe da partire vna quantità per vn Binomio, ò per vn Reſiduo, li nomi de quali ſoffero di ſpetie diuerſa, (come per eſempio R cub 9 più R 5) in tal caſo ſi riducono li nomi del Binomio, ò Reſiduo ad vna medeſima natura (come à cart. 254. s'inſegnò) e poi s'opera come ſopra. Voglio dire, biſogna quadrare la R cub. 9 e cubare la R. 5. e haueremo poi queſto Binomio R cub. quad. 81. più R. quad. cub. 125.

Moltiplicando adunque tal quantità col Binomio, s'haverà 10 per Diuiſore, e moltiplicandola col 10. da partire, s'haverà R. cu. 36000. men R cu. 24000 più R cu. 16000. Fatta la diuiſione; ne torna di Quotiente R. cu. 36 men R. cu. 24, più R. cu. 16; ma ciò accade accidentalmente. Se il numero da partirſi foſſe più di 10, non ſaria così. Con l'iſteſſo ordine s'opera nelle altre ſpetie di Binomij, ò Reſidui: non ſolo quando s'haueſſe da partire vna ſola quantità rationale, ma irrationale ancora: ouero vn Binomio, Trinomio, Multinomio, ò Reſiduo. Tutto il punto ſtà in trouare quella quantità, che moltiplicata col Binomio, ò Reſiduo (che ſempre ſuppo-niamo per Diuiſore) dia quantità rationale.

Quando occorreſſe di partire vna quantità per vn Trinomio, ò Moltinomio, in tal caſo ſi forma vn rotto; ponendo la quantità da partire ſopra la virgola, & il Diuiſore ſotto di eſſa; come in figura quì ſotto ſi vede.

A partire 50 per 16 p R cub. 5. p. R cu 3 ne viene $\frac{50}{16 \text{ p. } R \text{ cu. } 5 \text{ p. } R \text{ cu. } 3.}$

A part. R cu. 25 per R. cu. 15. men R. cu. 12 p. 30. Ne viene $\frac{R \text{ cu. } 25}{R \text{ cu. } 15. \text{ men. } R \text{ cu. } 12 \text{ p. } 30.}$

Vero

Vero è, che douendo partire per vn Trinomio quadro, tal Diuisore si può ridurre in due colpi à quantità rationale. Per esempio. A partire 10. per R 6 più R 3. più R 2. primieramente *ad libitum*, si conuerte vn più bel Trinomio in men, (e sia l'vltimo) che poi dirà R 6 più R 3 men R 2. Fatto questo, si moltiplica il 10, & anco il proposto Trinomio per questo R 6 più R 3 men R 2, e per Diuisore verrà questo Binomio R 72 più 7, e per numero da partire verrà questo Trinomio R 600, più R 300. men R 200. Adesso mò si moltiplica il Binomio R 72, più 7 per il suo Residuo R 72, men 7, e per Diuisore rationale s'hauerà 23. Si moltiplica anco per detto Residuo la R 600, più R 300, men R 200, e poi al solito si parte vn Prodotto per l'altro.

Quando li nómi del Binomio, ò Residuo, per li quali si deue partire vna data quantità non fossero d'vna medesima natura, bisogna ridurueli, come di sopra s'è detto à carte 254.

DELLE RADICI VNIVERSALI.

CAP. V.

QVi parmi luogo di proposito per discorrere delle radici vniuersali. Le radici adunque vniuersali sogliono accadere, quando nel fine di qualche operatione ne bisogni rappresentare la radice di qualche quantità di due, ò più nomi. Per esempio. Volendo rappresentare la radice di questo Trinomio 12, più R 15, più R 11, si rappresentarà così; R V (12 più R 15, più R 11. poiche fin hora non s'è trouato modo di cauare realmente la radice da tali quantità: mà solo s'è trouata Regola per farle capire all'intelletto hu-

humano, e per maneggiarle fino al fine di qualche operatione per tutti gli atti dell'Algorismo. L'istesso può accadere nelle quantità cubi, e d'altre spetie, &c.

Ma perche il senso di tal operatione porta qualche ambiguità; però con Binomio, e Trinomio di quantità rationale chiarificarò la mente anco de' men speculatiui. Per esempio. Habbiasi da cauare la radice quad. da questo Trinomio R. V (52. più R. 49 più R. 25. questo non vuol dir altro, che 8. Attenti alla ragione. La R di 49 è 7; e la R di 25 è 5. Hora mò. Non voglio miga dire, che alla R di 52, s'habbia d'aggiongere la R di 49. e di 25. Signori nò; ma voglio inferire, e m'intendo, che al 52 s'aggionghi la R di 49, e di 25, cioè 7, e 5, che poi haueremo 64 per il num. da cauarsi la R. quadra, qual è 8, per radice cercata del proposto Trinomio.

Di più. Habbiasi da cauare la radice da questo Binomio 22493. più R 49. Questo vuol dire, che la radice di 49 s'hà d'aggiongere alla radice di 22493; ma all' istesso 22493; che poi haueremo 22.500. la cui radice è precisamente 150. e tale è la R del proposto Binomio. Ma perche i veri Binomij, Trinomij, &c. di quantità irrationale non hanno radice precisa, si caua la radice più prossima, con la quale s'opera, come sopra. Se vi fossero delli men R &c. si sottrano &c. Qui sotto pongo alcuni esempij rationali per filosofarui sopra.

Primo esempio. La R V (R 36 più R 25, men 2 saria precisamente 3. Ogni volta, che il primo termine dopo la R V sia radice di qualsiuoglia spetie, la radice de gli altri termini s'aggionge alla radice d'esso primo termine, e dalla somma si cauà poi la radice. La R di 36 è 6, quella di 25 è 5, che gionti insieme fanno 11, e men 2, resta 9. La cui R è 3. E notisi bene.

Secondo esempio. La R. V (R. cub. 125. più R. cub. 64. saria precisamente 3.

Ter-

Terzo esempio. La R. V. cub. (R. 400, più R 49, è precisamente 3; perche la radice di 400 è 20, e quella di 49 è 7, che vnite insieme fanno 27, la cui radice cub. è 3.

Quarto esempio. La R. V cub. (R. 400. men R 49 saria R cub. 13. poi. he leuato la radice di 49 dalla radice di 400, resta 13. la cui R. cu. si cerca.

Quinto esempio. La R. V. cub. (R. cub. 216. più R cu. 8 saria 2 &c. La conclusione è questa. Dalle proposte radici si caua singolarmente il conueniente numero preciso, ò più prossimo, quali vniti tutti insieme dalla somma si caua poi la radice, denominata dalla descrittione R. V. cub. ò qual si sia altra spetie. Or veniamo più al particolare.

Come si maneggino le Radici Vniuersali.

VOlendo quadrare, cubare, &c. qualsiuoglia spetie di radici vniuersali, basta à leuarli quel carattere R. V: perche il resto lasciandolo come prima, sarà il quad. il cubo, &c. diesse.

Volendo moltiplicare vna radice vniuersale quadra per qualche numero, ò radice si quadra l'vna, e l'altra, e poi s'opera, come ne' Binomij, perche la R. V. del Prodotto sarà la cercata moltiplicatione.

L'istesso ordine si tiene nel partire. Si quadra l' vna, e l'altra proposta quantità; e fatta la diuisione, la R. V. del Quotiente sarà quello si cerca.

Questo medesimo stile si tiene volendo moltiplicare, ouero partire vna R. V. con vn altra R. V. Se fossero R. V. cub. ò d'altra spetie, si moltiplica il cubo d' vna, col cubo dell'altra, &c. e la R V. cub. &c. del Prodotto, ò del Quotiente sara quel, che si cerca. Habbiasi l'occhio a quello, ch' altroue s'è detto circa il partire qual si voglia quantità per vn Binomio, ò Residuo car. 273. Il sommare d'vna R V con qualsiuoglia quantità

si fà

si fà col termine del più: & il sottrare si fà col termine del men. Or veniamo a qualche particolarità.

A Moltiplicare.

R V (12 più R 5	La R V quadrata,	Fà 12 più R 5	
per 3	Il 3 quadrato.	Fà 9	
Fà R V (108. più R 405		R V (108. più R 405	

Quadrata, che sia la radice vniuersale, & il numero resta con ciò vn Binomio, da moltiplicare per numero, cioè con 9. Vedete, che chiarezza?

A moltiplicare.

R V (12 più R 5	La R V quadrata, lascia questo Bino-		
mio		12 più R 5	
per R 3	La R 3 quadrata dà per num	3	
Fà R V (36. più R 45		R V (36 più R 45	

A partire.

R V (108 più R 405	R V quadrata	108 più R 405	
per 3	Diuisore quadrato	9	
ne vien R V (12 più R 5		R V (12. più R 5	

Ma quì notate: che il 108 si patte semplicemente per 9. essendo l'vno, e l'altro numero: ma la R. 405. si deue partire per 81. quadrato del 9.

A partire.

R V (36. più R 45	R V quadrata	36. più R 45	
per R 3	Diuisore quad.	3	
ne vien R V(12. più R 5		R V(12. più R 5	

Mi

Mi son seruito nel partire del Prodotto de' moltiplicari, acciochè l'operatione d'vno serui per proua dell'altro,

Se s'hauessero da moltiplicare insieme due R.V: quadrate che siano (col scancellare il carattere R. V.) restano due Binomij da moltiplicarsi insieme secondo la regola insegnata al suo luogo, car. 269.

Quanto al partire vna R. V. per vn altra radice vniuersale, se tutte due sono eguali il Quotiente sarà sempre l'Vnità, cioè 1. ma se saranno ineguali, si parte il quadrato d'vna per il quad. dell'altra: ma perche tali quad. saranno Binomij, bisogna ricorrere per ammaestramento a car. 273. E tanto basti.

TRATTATO

DELLE PROPORTIONI.

CHE COSA SIA PARTE, MOLTIPLICE, E PROPORTIONE.

CAP. VI.

PEr Parte s'intende la quantità minore della quantità maggiore; quando che la minore misuri la maggiore. Largo modo qualsiuoglia quãtità minor del suo tutto è detta Parte; ma realmente, e propriamente parlando, quella è Parte, che misura il suo tutto; come 3. 4. 6. che misura (per esempio) il 12 per $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ Eucl. lib. 5. diff. 1. Moltiplice è la quantità maggiore, misurata dalla minore, 12 è Moltiplice del 6 4 3; cioè, il doppio, treppio, e quadruplo.

Pro-

Proportione è la conuenienza di due quantità d'vna medesima spetie, ò genere dell'vna all'altra. Per istesso genere s'intende, che tutte due siano due linee; ò due superficie, ò due corpi, ò due numeri, ò due suoni, &c.

Conuenienza mò, è questa; che vna di dette quantità necessariamente è maggiore, ò minore, ouero eguali all'altra: e questo è proprio della quantità. Dal che si conclude, che trè sono le proportioni in genere: cioè proportione d'egualità: proportione della maggior inegualità: e proportione della minore inegualità: e possono essere si rationali, come irrationali.

Proport. d'egual.	*Maggior inegual.*	*Minor inegual.*
Come da 1 a 1	Come da 2 a 1	Come da 1 a R 2
da 2 a 2	da 3 a 2	da 2 a 3
da 3 a 3	da 4 a 3 &c.	da 3 a 4 &c.
da 4 a 4	da R 10 a R 7	da R 7 a 10
da 5 a 5	da 6 a R 3	da R 3 a 6
da 6 a 6 &c.	da R 12 a R 5 &c.	da R 5 a R 12 &c.

La maggior inegualità è quando si fà comparatione dal maggior termine al minore: ma la minor inegualità è tutta al contrario; cioè quando si fà comparatione dal minor termine al maggiore; come in esempio s'è veduto.

Spetie della maggiore, e minore inegualità rationale.

CInque sono le spetie della maggiore, e della minore inegualità: trè semplici, e due compolte: ne frà loro v'è altra differenza, se non che nella minor inegualità vi si aggiõge questa prepositione *sub*, per distinguerla dalla maggiore. E' ben vero, che ciascuna di queste spetie si diuide in infinite particolari proportioni.

La prima ſpetie ſi chiama Moltiplice; perche l'antecedente contiene più volte il conſeguente.

Se due volte; come da 2 a 1 è in proportione doppia.
Se trè volte; come da 3 a 1 è in proportione treppia.
Se 4 volte; come da 4 a 1 è in proportione quadr.
Nella minore ineg. come da 1 a 2 *Sub doppia.*
come da 1 a 3 *Sub treppia.*
come da 1 a 4 *Sub quadrupla, &c.*

La Seconda ſpetie ſi chiama Superparticolare; & è quando l'antecedente contiene il conſequente vn tanto, & vna parte ſola d'vn tanto, come qui è notato.

Se vna volta è $\frac{1}{2}$ come da 3 a 2. ſi chiama Seſquialtera.
Se vna volta, e $\frac{1}{3}$ come da 4 a 3. ſi chiama Seſquitertia.
Se vna volta, e $\frac{1}{4}$ come da 5 a 4 ſi chiama Seſquiq. &c.
Nella minore ineg. come da 2 a 3 ſi dice *Subſeſquialtera*
come da 3 a 4 è detta *Subſeſquitertia.*
come da 4 a 5 è detta *Subſeſquiquarta, &c.*

La terza ſi chiama ſuperpatiente. La prima, e minima è quando l'antecedente contiene il conſequente vna volta, e $\frac{2}{3}$,

come da 5 a 3 Superbipartiens tertias.
vna volta è $\frac{3}{4}$ come da 7 a 4 Supertripartiens quartas.
vna volta è $\frac{4}{5}$ come da 9 a 5 Superquadripartiẽs 5.
Nella minore ineg. come da 3 a 5 *ſubſuperbipartiens 3.*
come da 4 a 7 *ſubſupertripartiens quar.*
come da 5 a 9. *ſubſuperquadripartiens quintas. &c.*

La quarta ſpetie è compoſta della prima, e ſeconda ſemplice; e ſi chiama Moltiplice ſuperparticolare. La minima, e prima delle quali ſi chiama dõppia ſeſquialtera: perche l'antecedente contiene il conſequente due volte, e mezo.

Due

Due volte, e $\frac{1}{2}$ come da 5 a 2 Doppia sesquialtera.
Trè volte, e $\frac{1}{2}$, come da 14 a 4. Treppia sesquialt.
Quat. volte, e $\frac{1}{3}$, come da 13 a 3. Quadrup. sesquit.
Nella min. inegual. come da 2 a 5 *Sub doppia sesquial.*
come da 4 a 14. *Sub treppia sesquialtera.*
come da 3 a 13. *Sub quadrupla sesquiter, &c.*

La quinta specie è composta della prima, e della terza semplice, e si chiama molteplice superpatiente. La prima, e minima è detta doppia superbipartiens tertias, & è quando l'antecedente contiene il consequente.

Due volte, e $\frac{2}{3}$, come da 8 a 3. Doppia superbipartiens tertias.
Trè volte $\frac{3}{4}$ come da 15 a 4. Treppia supertripatiens quartas.
Cinque volte, a $\frac{5}{7}$, come da 38 a 7. Quintupla supertripatiens septimas.
Nella min. inegual. come da 3 a 8. *Sub doppia superbipartiens tertias.*
come da 4 a 15. *Sub treppia supertripatiens quartas.*
come da 38. a 7. *Sub quintupla supertripartiens septimas.*

Ma notisi, che le volte intiere s'appoggiano, ò notificano quel doppia, treppia, quadrupla, &c. & il rotto insegna il modo di pronunciare l'altra parola.

Circa la minore inegualità si diria, *sub* molteplice, *sub* superparticolare, *sub* superpartiente, &c. E così di necessità ogni quantità rationale cade sotto vna di queste cinque, e cinque spetie di proportioni.

Le proportioni si dicono simili, ouero eguali: quando hanno vna medesima denominatione. Maggiori, ò minori, le maggiore, ò minore denominatione haueranno. La denominatione d'vna proportione, è il Quotiente, che ne viene dal partire l'antecedente per il consequente. Quella proportione, che nella maggior ine-

gualità hà maggior denominatione; nella minore n'hà manco.

DELLA PROPORTIONALITA',

E sue spetie, &c.

CAP. II.

PRoportionalità non è altro, che vna similitudine di due, ò più proportioni, ch' hanno l'istessa denominatione. Trè sono le spetie di proportionalità più nominate, & all'vso pratico più communi: cioè proportionalità Geometrica, Aritmetica, & Armonica. La proportionalità Geometrica rationale considera nella maggior inegualità quante volte il termine antecedente contenghi il conseguente: e nella minore inegualità, che parte dell'antecedente sia il conseguente: ma nella proportionalità Aritmetica si considera solamente la differenza frà vn termine, e l'altro. Per esempio 7 a 3 Geometricamente diremo, che sia doppia sesquitertia; ma Aritmeticamente si dirà, che la differenza di detti termini sia 4.

Proportionalità Geometrica. Treppia.	*Proportionalità Aritmetica.*	*Proportionalità armonica.*
12 a 4	7 a 3	6. 4. 3. doppia.
3 a 1	16 a 12	2. a. 1. doppia.
Subsesquialtera.		(pla.
2 a 3	12 a 7	2. 3. 6. Sub trip.
6 a 9	18 a 13	1. a 3. Sub trippl.

Pro-

Proportionalità Armonica è vna similitudine, che hà la proportione delli estremi con la proportione delle due differenze, cioè la differenza dél primo al secondo, e quella del secondo al terzo termine. Per trouar mò detti termini, si fà così; *Ad libitum*, si eleggono trè termini proportionali continui nella Progressione Aritmetica, e siano 3.6.9. Fatto questo, si moltiplica il primo col secondo, dipoi il primo col terzo; vltimamente il secõdo col terzo termine, e s'haueranno poi termini in proportionalità Armonica. Ma notate, che si come la proportione di 18 a 54 è subtrippla, così la differenza di 18 a 27, e di 27 a 54 frà esse sono in proportione trippla secondo il proposto.

18.27.54. per li trè

9 a 27. Sub. trip.

La continua proportionalità, ò termini continui proportionali sono quelli, che il primo termine è solamente antecedente, e l'vltimo è solamente consequente; ma tutti gli altri intermedij seruono per antecedente, e per consequente; come per esempio 32.16.8.4.2. che viene ad essere vna Progressione Geometrica retrograda. L'istesso ne' termini continui Aritmetici; come 3.5.7.9.11.13. cioè Progressione Aritmetica. Questa proportionalità non può esser manco di trè termini.

Le radici delle proportioni sono li minimi numeri, che si possono trouare in quella spetie di proportione. Nella doppia saria 2 a 1. Nella treppia 3 a 1. Nella sesquialtera 3 a 2, e così discorrendo.

Regola per conoscere li numeri primi, e compositi.

IL modo di conoscere, se due numeri siano contra sè primi, ò frà loro compositi, si fà per la Regola del Schisare, cart. 25. Ma se fossero trè numeri, si schisa il primo, ed il secondo. Se questi sono contra se primi; cioè che resti l'vnità, non occorre passar più auuanti; ma se sono

compoſti, ſi ſchiſa il terzo numero col maſſimo numero numerante li due primi, e ſe queſti ſaranno frà loro compoſti, il maſſimo ſchiſatore di eſſi ſarà il numero, che numera tutti trè li propoſti numeri. Fannela proua in queſti trè numeri 32. 24. 20. ne quali l'8 ſchiſa li due primi. Schiſando poi l'8 col 20, ſi troua che 4 li numerarà tutti trè, &c.

Per trouar il minimo numero numerante ogni propoſta quãtità de numeri: ſi fà per la Regola dell'Accat. c. 26.

Qui ſi comproba la Regola Aurea.

EVclide (lib. 7. prop. 20) dice, che ſe ſaranno quattro numeri proportionali, (ſiano mò, ò non ſiano in continua proportionalità) hanno queſta bella qualità: che tanto produce il primo moltiplicato col quarto: quanto fa a moltiplicar il ſecondo col terzo. E di quà s'è cauata la Regola de proportionali, detta del Trè, e per eccellenza Regola Aurea. E che ſia il vero: moltiplichiſi il terzo col ſecondo, & il Prodotto diuidaſi per il primo; che di garbo ne verrà il quarto termine.

In oltre (prop. 21) dice, che ſe ſaranno trè termini in continua proportionalità, il Prodotto delli eſtremi farà eguale al quadrato del numero di mezo. L'iſteſſo con quanti termini ſi vogliono, come nel principio delle Progreſſioni Geometriche ſi diſſe. cart. 210. e moſtrano gli eſempij qui ſottoſcritti.

4 termini nõ cõtinui.	3. termini cõtinui.	5. termini cõtinui.
24	36	256
12 à 4 & 6 à 2	9 6 4	256
24	6	64. 32. 16. 8. 4
	36	16
		256

Per

Per trouare li minimi numeri, ch'habbia la proportione di due proposti numeri, bisogna schisarli. Se sono contra se primi li minimi saranno quei medesimi numeri: ma se saranno composti, il massimo schisatore darà li cercati numeri. Per esempio 25 a 9 resta 25 a 9. per non potersi schisare: ma 77 a 55 restarà 7 à 5, e l'11 è il massimo schisatore, che li numera tutti due.

Modo di trouare quanti termini proportionali si vogliono.

SIa vna data proportione la minima sesquialtera 3 a 2. Volendo mò trouare quanti termini si vogliono in continua proportionalità sesquialtera, si fà così. Per hauerne trè termini, si moltiplica l'antecedente della proposta proportione, ò quantità in sè stessa. (che nel caso nostro è 3) Dipoi si moltiplicano insieme l'antecedente col consequente, & vltimamente si moltiplica in sè stesso il consequente, (cioè il 2.) e s'hauerá 9. 6. 4. per li cercati termini. Per hauerne quattro termini, si moltiplica l'antecedente 3 con tutti trè li termini trouati, e si moltiplica di nuouo il consequente con l'vltimo de trè termini. E così con quest'ordine se ne trouano cinque, sei &c. Siche con li due proposti termini se ne trouano trè, con trè se ne trouano quattro: con quattro cinque &c. come quì si vede.

3 a 2. sesquialtera.	Tutti questi termini in esempio proposti, sono li minimi di tal proportione: perche il 3 a 2 è il minimo numero, ch'habbia la sesquialtera secondo il Matematico, che non diuide l'Vnità
9. 6. 4.	
27. 18. 12. 8.	
81. 54. 36. 24. 16.	
243. 162. 108. 72. 48. 32.	

Mà chi volesse procedere secondo il naturale, che piglia le materie numerate per numero, l'Vnità delle quali sono certi tutti diuisibili in infinito, si diria per la Regola Aurea. Se 9 dà 6. Che dara 6? Darà 4. E poi. Se 9 dà 6. Che darà 4? Darà

già $2\frac{3}{7}$. Se più auanti si volesse procedere si diria. Se 9 dà 6. Che darà $2\frac{3}{7}$? &c. Mà in fatti secondo il Matematico li rotti sono reputati irrationali frà numeri semplici: come le radici sorde nelle quantità continue. Ma quì notate di gratia, che l'vltimo di trè termini continui proportionali minimi in ogni spetie di proportione è numero quadrato. L'vltimo di quattro termini è cubo. L'vltimo di cinque è qu.qu. L'vltimo di sei, è primo relato, &c. Che bella cosa?

Come si manegginino le proportioni per tutti gli atti dell'Algorismo.

CAP. III.

Del Sommare.

SE le proportioni, che s'hanno da sommare saranno due, ò quante si vogliono: si mettono vna sotto all'altra; e poi si moltiplicano insieme tutti gli antecedenti, e tutti li consequenti, e quel che ne prouiene sarà la somma di tutte quelle proportioni. A sommare vna proportione della maggior inegualità con la sua conuersa della minor inegualità, sempre da tal somma ne prouiene l'egualità. Ecco li esempj.

A sommar vna.

Sesquialtera 3 a 2	Subdupla 1 a 2	Dupla 2 a 1
Sesquitertia 4 a 3	Tripla 3 a 1	Subdup. 1 a 2
Fà 1. doppia 12 a 6	Fà 1. sesquial. 3 a 2	Fà egua. 2 a 2

Come si sottrano le proportioni.

SI collocano le proportioni vna sotto l'altra, e poi si moltiplicano in Croce, come si fà per far proua, qual rotto sia maggiore cart. 25. La proua è buona, se bene altera il numero, poiche mantiene la medesima spetie di proportione.

A sottrar da vna tripla	3	a	1	A sottrar da	3	a	2
questa dupla	2	a	1		3	a	2
Resta vna sesquialtera	3	a	2	Resta	6	a	6
Proua Tripla	6	a	2	Proua	18	a	12

Come si moltiplicano le proportioni.

VOlendo duplicar vna data proportione, basta a quadrare l'vno, e l'altro termine di essa; perche la proportione de due quadrati sarà doppia a quella proportione lineale. Volendola triplicare, si cuba. Volendola quadruplicare, si riduce l'vno, e l'altro termine a quadrato di quadrato &c. come in figura si vede.

Sempia	3 a 2
Doppia	9 a 4
Treppia	27 a 8
Quadrup.	81 a 16, &c.

Come si partino le proportioni.

IL partire delle proportioni, per esser vn atto contrario al moltiplicare di esse: s'opera parimente tutto al contrario. E però volendo partire qualsiuoglia proportione, bisogna sempre ridurla prima alli suoi minimi numeri, e poi se si vuole diuiderla in due parti, si caua la radice dall'vno, e l'altro termine; perche la pro-

por-

portione delle due radici sarà la metà della data proportione. Ch volesse diuiderla in trè parti: cioè cauarne la terza parte, si caua la radice cuba. E se la quarta parte, si caua la R di R &c. così procedendo. Per esser materia chiarissima, sparagno gli esempij.

Per vn altro verso si può intendere il partire delle proportioni; cioè, partire vna proportione maggiore per vn altra proportione minore: ma questo non è propriamente partire: ma vn voler sapere quante volte la maggiore contenghi la minore; ò quante volte la minore misuri la maggiore. E se bene da pratici non si fà differenza frà questi due modi di partire, sì ne numeri sani, come nelli rotti: tutta via nelle proportioni bisogna auuertirli. Volendo adunque sapere quante volte vna proportione minore misuri, ouero entri nella maggiore per la Regola del sottrare le proportioni si caua la minore dalla maggiore, e dal restante sempre si torna a cauare fin tanto, ò che resti l'egualità, ò che si faccia passaggio dalla maggiore alla minore inegualità, (& è contra) perche quante sottrattioni si faranno fino al sudetto accidente, tante volte la minore misura la maggiore. Se le proportioni saranno d'vna medesima denominatione al primo colpo resta l'egualità. Di più si conosce, che proportione habbia vna proportione con l'altra; Quì metto alcuni esempij da filosofarui sopra.

3	a	2		15	a	10
3	a	2		3	a	2
Resta	6	a	6	Resta	30	a	30
	egualità				egualità.		

In questi due esemplj la proportione 3 a 2 misura vna sol volta la proportione del primo esempio 3 a 2, e del secondo 15 a 10,

36 a 16
3 a 2

In questo esempio la proportione 3 a 2 misura giusto 2 volte la 36 a 16. Si che questa sarà dupla alla 3 a 2; e la 3 a 2 sarà subdupla alla 36 a 16.

Primo resto 72 a 48
3 a 2

Secõdo resto 144 a 144 egualità.

In questo esempio non occorre passar più auanti: perche si faria passaggio alla minor inegualità.

256 a 2
4 a 1

Adunque la proportion 4 a 1. misura la proportione 256. a 2 tre volte, & auanza 256 a 128, che saria vna dupla, come 2 a 1, trouata per la Regola del Schisare le proportioni, a fine di ridurle a minimi numeri.

Primo resto 256 a 8
4 a 1

Sec. resto 256 a 32
4 a 1

Terzo resto 256 a 128

Volendo moltiplicare vna proportione per vn rotto, s'opera, come si fà a moltiplicare sani con rotti: hauendo però sempre l'occhio al moltiplicare, & al partire delle proportioni. Per esempio. A moltiplicare questa proportione 5 a 4 per $\frac{2}{3}$, s'ingrandisse due volte la 5 a 4 (che così ricerca il 2, Numeratore del rotto) e ne verrà 25 a 16. Questo Prodotto si parte per 3 (Denominatore) ma perche 25 a 16 non si può ridurre a numeri più minimi; ne siegue, che la R cub. 25. a R cub. 16. farà la terza parte di 25. a 16. Però si conclude, che a moltiplicare 5 a 4 per $\frac{2}{3}$ ne viene R. cu 25 a R cu. 16 che saria *supernonnipatiens sextas decimas*, cioè l'antecedente contiene il consequente vna volta, e $\frac{9}{16}$.

Volendo parimente partire vna proportione per vn rotto: s'opera come s'è operato nel moltiplicare, ma tutto all'opposto; per esser atto contrario; cioè si moltiplica

plica il Denominatore del rotto con la proportione, & il Prodotto si parte per il Numeratore: hauendo l'occhio al moltiplicare, & al partire delle proportioni; e quello, che ne viene sarà quello, che si cerca. A partir 2 a 1 per $\frac{1}{2}$ ne viene R cu. 16. a R. cu. 1. Se col rotto vi fossero sani, si fà il sano in rotto (al solito,) e poi s'opera come sopra. La proua si fà al solito coll'atto contrario, &c.

BELLISSIME OSSERVATIONI

Pertinenti alle Proportioni.

CAP. IV.

1 HAuendo nota la prima, & vltima di trè quantità continue proportionali, per hauer la seconda quantità, ò termine, si moltiplica la prima con l'vltima, e la radice di tal Prodotto sarà la cercata quantità. Per esempio. Sia 9 e 4. il primo, & il terzo termine: moltiplicati insieme, fanno 36, la cui radice è 6, e questo sarà il secondo termine: e staranno così 9. 6. 4.

2 Se fossero quattro quantità, per hauer notitia della seconda, si moltiplica il quadrato della prima con la quarta semplice, e la radice cuba del Prodotto sarà il secondo termine.

3 Se fossero cinque, si moltiplica il cubo della prima, con la quarta semplice, e la R R del Prodotto sarà la seconda quantità, ò termine. Per esempio. Sia il primo termine 32, & il quinto 2. Operando come hò detto, il secondo sarà 16. Siche habbiamo 32. 16. 8 4 2 &c.

4 Per hauer mò il terzo, & il quarto termine si potria operar in varij modi; ma il più brigato è trouarli per la Re-

Regola Aurea, dicendo. Se 32. mi dà 16. Quanto mi darà 16? Darà 8, per il termine. Di poi. Se 32. mi dà 16. Quanto mi darà 8? Darà 4, per il quarto termine; e staranno così 32. 16. 8. 4. 2. E così con quest' ordine si procede per trouar il secondo, quando li termini fossero sei, sette, e quanti si vogliono: cioè s'alteta sempre vn grado la dignità nel moltiplicar il primo con l'vltimo termine, per cauarne poi la radice dal Prodotto.

Questa operatione serue di garbo per partire ancor le proportioni, nè vi occorre altro, che supporre li due termini della proportione per il primo, e per l'vltimo termine dell'operatione; e poi operare, come hò insegnato: perche la proportione del primo al secondo termine, ò numero trouato, sempre sarà la diuisione cercata. Per esempio. Habbiasi da partire per 4 (cioè da cauarne la quarta parte) da questa proportione 32 a 2. Suppongo il 32, & il 2 per il primo, & vltimo di cinque termini continui proportionali; di poi operando secondo la Regola, trouo il secondo termine, che sarà 16: e così concludo, che la proportione di 32 a 16 è la quarta parte della proportione di 32 a 2; che saria vna dupla, come da 2 a 1 (ne' minimi numeri. E questo serui per filosofare all' intelletto; che in fatti l' altro modo di partire le proportioni è più breue, e da praticarsi. Vero è che questo mirabilmente serue per risoluere certi quesiti, che per altro saria quasi impossibile il rispondere perfettamẽte, come qui sotto di passaggio si tocca.

Quesito Primo.

Vno piglia Scudi 100. In capo di trè Anni porta al Padrone Scud. 108. trà frutto, e capitale. Domando. Quanto paga per cento all'Anno quel tale, facendo a capo d'Anno?

In questo quesito vi concorrono quattro termini cõtinui

tinui proportionali. Il primo termine consiste in quei Scud. 100. di capitale: & il quarto ne scud. 108, che in capo di 3. Anni portò al Padrone; gli altri due termini sono occulti, e consistono nel capitale, e frutto, che in capo del primo, e del secondo Anno deue dare al Padrone: ma perche dalla cognitione del secondo termine depende la risolutione del quesito, però per trouarlo s'opera come sopra (numero 2.) cosi. Si quadra il primo termine 100. qual fà 10. 000. Questo quadrato si moltiplica per il quarto termine 108, e di Prodotto haueremo 1. 080. 000 Hora mò dico: che la radice cub. di questo 1. 080. 000. è il secondo termine, qual contiene li Scudi, che frà capitale, e frutto doueria rendere al Padrone in capo del primo Anno. Ma se cosi è. Adunque Scud R. cub. 1.080.000, ñ 100. sarà il quanto paga per cento all'Anno a far capo d'Anno. Per farne la proua, si troua il terzo termine dicendo. Se Scud. 100. tornano frà capitale, e frutto Scud. R. cub. 1.080. 000. Quanto mi tornaranno pur Scud. R. cub. 1. 080. 000? Operando tornaranno Scud. R. cub. 1.166 400. e tanto saranno tornati in capo al secondo Anno li Scu. 100. frà capitale, e frutto. Per saper mò quanto saranno tornati in capo al terzo Anno; si troua il quarto termine dicendo. Se 100. trà frutto, e capitale dà Scud. R. cub. 1.080.000. che mi daranno Scud. R. cub. 1.166. 400? Operando daranno Scu. R. cub. 1.259.712. e tanti saranno tornati li Scud. 100. in capo al terzo Anno trà capitale, e frutto; ma perche la R. cub 1.259. 712. è rationale, e la sua R. per numero è precisamente 108, però il quesito fù ben risolto, e la proua è ottima. Cubate 108, e di garbo verrà R. cub. 1. 259. 712.

Questo Secondo.

Vno deue hauere da vn altro Scud. 64. da quì a 3. Anni, Per certo interesse si contenta di pigliarne al presente

sente solamente 27 per intiero pagamento. Domando. A quanto per 100. furono scontati a far capo d'Anno?

Questo quesito contiene pur lui ancora quattro termini continui proportionali cioè 64 -- o -- o -- 27. Di necessità bisogna hauer notitia del secondo, ò terzo termine (l'vno, e l'altro è di proposito.) Per maneggiare men figure, trouo il terzo, operando all' opposto di quello, s' opera per hauere il secondo, cioè moltiplico per 64 il quadrato di 27, e mi viene di Prodotto 46. 656 la cui radice cub. per numero è precisamente 36, da colocarsi per terzo termine; e staranno cosi 64 -- o -- 36 -- 27. Horò mò, Se si trattasse di meritare: Scu. 27. in capo al primo Anno frà frutto, e capitale diueriano Scud. 36. cioè Scud. 9. di frutto. Per saper mò quanto guadagnariano per 100. si dice. Se 27. guadagna 9. Che guadagnarà 100? Guadagnarà $33\frac{1}{3}$ a far capo d'Anno: ma scontando daranno parimente Scu. $33.\frac{1}{3}$ all'Anno a far capo d'Anno. Adunque li Scud. 64. furono scontati a ragion di Scud. $53.\frac{1}{3}$, &c.

TRATTATO DI VARIE COSE.

CAP. 1.

LA proportione, e proportionalità Aritmetica hà molte corrispondenze con la Geometrica (L'Aritmetica però non procede in infinito, se non nella maggior, e minore inegualità simpliciter; battendo il negotio di tali proportioni nella semplice differenza da vn termine all'altro, qual può variare in infinito.)

Hauendo noto il primo, & il terzo di trè numeri continui proportionali Aritmetici, per hauer il secondo, si somma il primo col terzo, e la metà di tal somma sarà il secondo termine. Se fossero quattro, per hauere il secondo termine si somma l' vltimo col doppio del pri-

primo, & il terzo di tal ſomma ſarà il ſecondo termine. Se ſoſſero cinque ſi ſomma l'vltimo col triplicato del primo, & il quarto di tal ſomma ſarà il ſecondo termine. E così con queſt'ordine gradatamente, &c. Da queſto ſi caua, che il ſommare nelle Progreſſioni Aritmetiche corriſponde al moltiplicare nelle Geometriche; & il ſottrare corriſponde al partire. Il pigliare la metà corriſponde al cauare la radice quadra; & il doppiare al quadrare. Il partire per trè corriſponde al cauare la radice cuba; & il triplicare corriſponde al cubare. Il partire per 4 corriſponde al cauare la R. R, & il quadruplicare corriſponde al cecare a R.R. *Et ſic de ſingulis*. Se ne farai comparatione con le Geometriche pagina 292. cap. 4. conoſcerai la verità.

2. Sommando inſieme due quantità in che proportione Geometrica ſi voglia; e partendo tal ſomma per ciaſcuna di loro, li due Quotienti haueranno l'iſteſſa proportione delle due prime quantità; & inoltre hanno queſta notabile qualità, che tanto fanno a ſommarli inſieme, quanto che a moltiplicare l'vno con l'altro. Per eſempio. Siano queſti due numeri in porportione ſeſquialtera 6 a 4. Sommati inſieme fanno 10. Diuidendo mò queſto 10 per 4, ne viene $2\frac{1}{2}$, e diuidendolo per 6, ne viene $1\frac{2}{3}$. Hor dico, che la proportione di $2\frac{1}{2}$ a $1\frac{2}{3}$ è pur ſeſquialtera. Di più ſommando, ouero moltiplicando inſieme queſti due Quotienti, per l'vno, e per l'altro atto faranno $4\frac{1}{6}$. In oltre diuidendo $4\frac{1}{6}$ per $2\frac{1}{2}$ ne viene $1\frac{2}{3}$; e partendolo per $1\frac{2}{3}$ ne viene $2\frac{1}{2}$. Che ordine ammirabile? &c.

3. Moltiplicando inſieme trè termini Geometrici continui proportionali, l'vltimo Prodotto ſarà eguale al cubo del ſecondo. Per contrario diuidendo il quadrato del ſecondo per ciaſcuno de' trè termini, il Quotiente ſarà eguale ad eſſi termini. Per eſempio 2. 6. 18.

Mol-

Moltiplicando inſieme queſti trè termini, il ſecondo Prodotto è 216; e 216 appunto fà il cubo del ſecondo termine. Di più diuidendo il quadrato di queſto 6, per ciaſcun termine di Quotiente ne vorrà pur 2. 6. 18. &c.

4. Siano queſti trè termini continui proportionali 18. 12. 8, & anco queſti due nella medeſima proportione ſeſquialtera 6. a 4. Hor dico, che tanto produce moltiplicando la ſomma de' due primi termini (cioè di 18, e 12) per il 4 (ſecondo termine della ſeconda proportione) quanto che a moltiplicare la ſomma delli due vltimi termini (cioè 12, & 8, per il 6. primo termine della ſeconda proportione) Così con qualſiuoglia altro numero pur che li trè ſiano della medeſima proportione delli due termini.

5. Il quadrato della ſomma di quante quantità, ò numeri ſi vogliono (ſiano, ò non ſiano proportionali) è ſempre eguale alla ſomma delle moltiplicationi, fatte da ciaſcuno in sè ſteſſo, e con tutti gli altri. Serui d'eſempio 3. 4. 6. 5. Quadrando il 3, fà 9, e moltiplicandolo col 4. 6. e 5. fà 12. 18. 15. come nella prima colonna ſi vede. Così s'opera col 4. 6. e 5. Vnendoli poi tutti inſieme, l'vltima ſomma ſarà 324. come ſi propoſe. Eucl. lib. 2. prop. 1, e 2. Altre bagatelline ſi potriano proporre, che per non pregiudicare al termine di riſtretto ſi tralaſciano,

3.	4.	6.	5.
Somma 18			
Quad. 324.			
3.	4.	6.	5.
9	16	36	25
12	24	30	15
18	20	18	20
15	12	24	30
54	72	108	90
Tutti inſieme 324.			

ORIGINE DE' NVMERI QVADRATI.

CAP. II.

1.3.5.7.9.11.13.15.17.19.21.23.25.27.29. 31. &c.

TVtti li numeri dispari, ordinati in Progressione Aritmetica, come di sopra si vede, è l'origine, e vera madre di tutti li numeri quadrati. Se dall' vnità si sommaranno quanti termini si vogliono, la somma sarà sempre numero quadrato.

Volendo sapere quanti numeri dispari concorrino alla formatione di qualsiuoglia quadrato, cauisi la sua radice: che quella darà il numero cercato. Per esempio. La radice di 49 è 7. Adunque sette numeri dispari (cominciando dall'Vnità) concorrono alla formatione del quadrato 49. Volendo sapere la quantità dell'vltimo termine dispato concorrente, basta a raddoppiare la radice, e dal doppiato (per Regola ferma) cauarne l'Vnità; perche il restante sarà il numero cercato. Per esempio. Raddoppiasi la radice 7, fà 14; cauisi l'Vnità, restarà 13, e 13. fù l'vltimo numero concorrente al quadrato 49 Se la radice non fosse discreta, saria segno, che tal numero non è composto di numeri dispari, ordinatamente disposti dall'Vnità.

Trouami due numeri quadrati, che gionti insieme facciano numero quadrato. Simili quesiti si risoluono per l'euidenze dette di sopra. Trouisi vn numero quadrato: (e sia 25) tutti gli altri termini inferiori sommati insieme saranno ancor loro numero quadrato, (cioè 144.) a questo giongasi il 25, farà 169 pur numero quadrato.

Do-

Domando. Quanti numeri dispari concorrono alla formatione di 8100? Caua la radice dal proposto numero; che trouarai esser 90, e così presto risponderai, che 90. sono li numeri dispari, concorrenti all'esser di 8100. Ma quando il numero proposto non fosse quadrato, saria segno che tal numero non è composto di numeri dispari, cominciando dall'Vnità: però bisogna lauorare a tastone, &c.

Proposto vn numero quadrato: con l'aiuto di questa proportione 16 a 9, ouero 9 a 16, si possono trouare altri numeri quadrati, che gionti con quello sarà pur numero quadrato. Per esempio. Trouami vn numero quadrato, che gionto con 100 faccia numero quadrato. Io dico. Se 16 mi dà 9. Che mi darà 100? Darà $56\frac{1}{4}$. Numero quadrato, qual gionto con 100. farà $156\frac{1}{4}$ pur numero quadrato. Se vuoi il terzo dirai. Se 16 mi dà 9. Che mi darà $156\frac{1}{4}$, Darà $87\frac{57}{64}$ numero quadrato; e così in infinito. Si poteua anco dire. Se 9. mi dà 16. Che mi darà 100? &c. Da questa Regola si caua il modo di trouare quanti numeri si vogliono, che li loro quadrati gionti insieme facciano numero quadrato. Le radici de' sopratrouati quadrati sariano li cercati numeri, quali gionti al proposto numero dariano numero quadrato.

DE' NVMERI CONGRVI, E CONGRVENTI.

CAP. III.

NVmero congruo non è altro, che vn numero quadrato: al quale gionto, ò leuato vn istesso numero, per l'vno, e per l'altro verso lascia sempre, ò produce pur numero quadrato: e quel numero così conditionato, che s'aggionge, ò si leua; è chiamato numero congruente del suo quadrato congruo.

Li numeri congrui, e congruenti si creano ordinata-

mente con questo bell'ordine. Il primo vien formato da 1, e da 2. Il secondo da 2, e da 3. Il terzo da 3, e da 4. E così in infinito. Alla pratica.

Quanto alli numeri congrui in due colpi si trouano così. Habbiasi da trouare (Per esempio) il secondo numero congruo, che hà per fondamento 2, e 3. S'vnischino insieme li quadrati di questi due numeri 2, e 3. la cui somma è 13. Di nouo quadrando questo 13 il 169 (suo quadrato) sarà il secondo numero congruo. Così con quest'ordine si trouano tutti.

Per trouar mò il suo numero congruente 3 cioè, che gionto, ò leuato dal 169, faccia numero quadrato, si fà così. S'vniscono insieme li due numeri fondamentali 2, e 3, e tal somma subito si raddoppia: che nel caso nostro fà 10. Di poi moltiplicando di nouo il 2 col 3 per il Prodotto 6 si moltiplica il 10, e fà 60. Vltimamente raddoppiando questo 60, fà 120: e questo è il cercato secondo numero congruente del quadrato congruo 169. Se a 169. aggiongi 120, fà 289, numero quadrato (la cui radice è 17) e se li leuarai, resta 49. pur numero quadrato, (la cui radice è 7.)

Trouami vn numero quadrato, al quale gionto, ò leuato 6 faccia sempre numero quadrato. Bisogna trouare vn numero congruente, che, partito per il proposto numero d'aggiongersi, produchi numero quadrato, che nel caso nostro è il 24 (primo numero congruente,) il quale partito per 6, ne viene 4. Per questo 4 si parte il 25 (primo congruo del 24 congruente) & il Quotiente $6\frac{1}{4}$ sarà quel numero, al quale gionto, ò leuato 6, produrrà per ogni verso numero quadrato, mà quando non si trouasse numero congruente di proposito: bisognarà risoluere il quesito per altra via.

Li numeri quadrati ordinatamente quì sotto situati, hanno questa bella conditione: che ogni numero

qua-

quadrato maggiore auanza il suo immediatamente minore la somma delle radici d'ambedue: la qual somma è sempre numero disparo. Questa euidenza serue per li seguenti, e simili quesiti.

1.4.9.16.25.36.49.64.81.100.121.144, &c.

Trouami vn numero, al quale giontoui 8, e sottrandone 7 faccia per ogni verso numero quadrato? Si fà cosi. Vnendo insieme 8 con 7, fà 15, (differenza delle radici de ricercati quadrati,) e però basta quadrare l'8, & il 7, e s'haueranno 64 e 49; leuato 8 da 64, resta 56, & al 49 giontoui 7, fà pur 56. Adunque 56 è quel numero, che giontoui 8, e leuatone 7, dà numero quadrato. Così con casi simili.

S'hauesse detto, che gionto, e leuato 8 facesse numero quadrato, si quadraria la meta d'8, e faria 16 al quale per regola ferma aggiongendoui l'vnità fà 17, e questo è il cercato numero. Leua, & aggiongi 8, che farà 25, e 9 numeri quadrati. Cosi quando il numero d'aggiongersi, e da leuarsi sono pari, & eguali: & anco se fossero dispari mà eguali come 7, e 7, &c.

S'hauesse detto, che giontoui 7, e leuatone 4. facesse numero quadrato, s'vniscono insieme questi due numeri, e fanno 11 (differenza de due cercati quadrati.) le cui radici fariano la diuisione d'11 in due parti, senza rompere l'Vnità, cioè 6, & 5, Quadrinsi questi due numeri, e s'haueranno 36, & 25 dal 36 cauisi 7, restarà 29 & al 25 giongasi 4, farà pur 29. Adunque 29 è quel numero, che giontoui 7, e leuatone 4 fà sempre numero quadrato.

Qui pongo alcuni numeri congrui, e congruenti.

Numeri congrui		suoi conguenti.
25		24
100		96
169		120
225		216
298		240
400		384
625		336, & 600
676		480
841		840
900		864, &c.

DE NVMERI PERFETTI

CAP. IV.

NVmero perfetto (come altroue s'è detto) è quello, che s'eguaglia à tutte le sue parti, che lo numerano. Per trouare questi numeri perfetti, si fà così. Si mettono in ordinanza quanti numeri si vogliono secondo l'ordine della progressione Geometrica doppia. Dipoi cominciando dall'Vnità, si sommano ad vno ad vno, e tutte quelle somme, che producono numero primo, questi si moltiplicano per l'vltimo numero, che concorse a tal somma, & il Prodotto sarà numero perfetto. Per esempio. Sommando 1 con 2, fà 3. il qual 3 per esser numero primo, si moltiplica per 2 (vltimo della somma) e ne viene 6. E questo è il primo numero perfetto. Parimente sommando 1. 2. 4. fà 7. pur numero primo. Si moltiplica il 7. col 4, (vltimo della somma) e ne viene 28. per il secondo numero perfetto. E' ben vero vero, che per l'auuenire hanno questo bell'ordine, che vn nò, e l'altro sì sarà numero perfetto, e l'altro sarà numero composto, come in margine in parte si vede.

		Somma	Numeri perfetti
1			
2	primo	3	6
4	primo	7	28
8	comp.	15	——
16	primo	31	496
32	comp.	63	——
64	primo	127	8128
128	comp.	255	——

Terzo numero perfetto
496

248 la $\frac{1}{2}$
124 il $\frac{1}{4}$
62 il $\frac{1}{8}$
31 il $\frac{1}{16}$
16 il $\frac{1}{31}$
8 il $\frac{1}{62}$
4 il $\frac{1}{124}$
2 il $\frac{1}{248}$
1 il $\frac{1}{496}$

Per trouar mò tutte le parti d'vn numero perfetto, basta a partirlo per mezo: e la metà si và partendo per mezo, finche s'arriui a numero disparo. Gionto a numero disparo, si parte il numero perfetto per quel numero disparo (il Quotiente del quale è sempre numero paro) e di nouo si torna a partir per mezo, fin che s'arriui all'Vnità. Finalmente sommando insieme tutte quelle parti; la somma sarà eguale al suo numero perfetto; come in esempio si vede.

Li numeri perfetti hanno questa rara qualità, che vno termina col 6, e l'altro con l'8. Di più partendo qualsiuoglia numero perfetto per 9, sempre resta l'Vnità: eccetto il primo, che non arriua a 9.

496

TRATTATO D'ALGEBRA.

CAP. I.

Frà le dilettenoli sciẽze, e certissime dimostrationi matematiche l'Algebra, ouero l'Almucabala (cosi chiamata da gli Arabi) per certo è parte oltramodo speculatiua di esse, e quasi dissi, d'infinita inuẽtione: laõde da gli Antichi meritatamẽte fù chiamata scienza maggiore del numero, e perfetta arte del calcolare. Madre, e Regina delle Regole: poiche per la Regola d'Algebra si risoluono infiniti quesiti sì in Geometria, come in Aritmetica; che per nissuna delle precedenti Regole si potriano risoluere. Questa scienza fù trouata da Maometto Figliuolo di Moisè Arabo.

Per voler bene, e presto apprendere questa scienza Algebratica, è necessario hauer cognitione delle dignità del numero. Saper estraere, e maneggiare le radici. Hauer bene a memoria le Regole del più, e del meno; & in oltre bisogna saper maneggiar li Binomij: altrimente non occorre metter mano in pasta. Tutto ciò s'hà a sufficienza, e compendiosamente ne precedenti trattati.

Ma prima di venire all'esplicatione delle parti particolari dell'Algebra, bisogna insegnare a maneggiare le dignità del numero per tutti gli atti dell'Algorismo. Quanto al rappresentare le dette dignità, si tiene l'ordine posto a carte 245. nè vi è altra differenza, se non che in Algebra in luogo dell'Vnità s'vsa il numero, e in luogo della radice, si serue di questo termine. Cosa, come per maggior chiarezza qui sotto le descriuo.

Di-

Progression naturale Aritmetica.

Dignità Algebratice.

0.numero.	10.Quad.pri.rel.	20.Q.Q.pri.rel.
1.cosa.ouer ℞	11.Terzo rel.	21.Cub.sec.rel.
2.Quadrato.	12.Cub.Qu.Q.	22.Qu. terzo rel.
3.Cubo.	13.Quarto rel.	23.Settimo rel.
4.Quad.quad.	14.Quad sec.rel.	24.Cub.Q.Q.Q.
5.Primo Rel.	15.Cub.pri.rel.	25.Ottauo rel.
6.Quad. Cub.	16.Q Q Qu.Qu.	26.Qu.quart.rel.
7.Second.Rel.	17.Quinto rel.	27.Cub. Cu.Cu.
8.Qu.Qu Qu.	18.Qu.Cu.Cu.	28.Qu.Q.sec.rel.
9.Cub. Cub.	19.Sesto Relato.	29.Nono relato.

Il numero in Algebra s'intende, e semplicemente si piglia per numero, cioè senza dignità alcuna in quella guisa appunto, che l'Vnità frà numeri non è numero. Questo numero alle volte si rappresenta accompagnato con questo segno, nu. & alle volte senza. Per esempio. Volendo rappresentare il numero sei, si rappresentarà alle volte in questo modo 6 nu. & alle volte semplicemente così 6.

La cosa in Algebra si piglia per il lato d'vn quadrato, cioè per la ℞ di quel tal quadrato. Siche radice, e cosa è vna medesima quantità rationale, ouero irrationale, come accade per sorte. Il quadrato si piglia per il quadrato della cosa Il cubo si piglia per il cubo della cosa: e così tutte le altre dignità haueranno relatione alla cosa, cioè alla sua radice; le quali quantità possono essere rationali, ouero irrationali, come portarà l'accidente; E se bene la quantità continua naturalmente non passi più oltre del corpo, cioè in linea superficie, e corpo; nondimeno in Algebra s'estende in infinito: hauendo più risguardo alla moltiplicatione della cosa nelli suoi Prodotti, che alle reali trè spetie della quantità cōtinua.

MA-

MANEGGIO DELLE DIGNITA' ALGEBRATICE.

CAP. II.

DEL SOMMARE.

IL sommare delle dignità Algebratice, quando sono d'vna medesima spetie, non è differente dal sommare de numeri semplici. E però, volendo (per esempio) sommare 7 cos. e 5 cos. e 9 cosa, la somma farà 21 cos. come se fossero semplici numeri. Ma quando fossero dignità di spetie diuerse, si sommano (a guisa di quantità non communicanti) col termine di Più. Per esempio. Volendo sommare 3 cos. con 4 quad. e con 12 nu. diremo, che la somma fà 3 cos. più 4 quad. più 12 nu. ouero che fà 4 quad. più 3 cos. più 12 num. perche non importa a metter prima qualsiuoglia di dette dignità; e queste spetie di somme si possono chiamare Binomij, Trinomij, o Moltinomij di dignità Algebratice.

DEL SOTTRARE LE DIGNITA'.

IL sottrare delle dignità, quando sono d'vna istessa spetie, non è differente dal commun sottrare de numeri. E però a sottrar 5 cos. da 9 cos. resta 4 cos. Parimente a sottrar 3 quad. da 12 quad. resta 9 quad. Ma quando fossero di spetie diuerse, si sottrano col termine di Men; come si costuma nelle Re non communicanti; e così si forma vn residuo di dignità. Per esempio. Volendo sottrare 7 nu. da 5 cos. resta 5. cos. men 7. nu. & a sottrare 10 cos. da 9 quad. resta 9 quad. men 10. cos. *Et sic de singulis.*

DEL

DEL MOLTIPLICARE LE DIGNITÀ.

PEr bene intendere il moltiplicare delle dignità, frà di loro: bisogna prima imparare, e sapere, che cosa rappresenti il Prodotto d'vna dignità moltiplicata con vn altra. Per saperlo adunque, e per presto apprenderlo: bisogna osseruare, che a ciascuna dignità Algebratica corrisponde vn proprio numero di Progressione Aritmetica naturale, (come di sopra si vede.) Al numero, per non esser dignità, si assegna il 0. La cosa, per esser la prima dignità, hà per segno 1. Il quadrato (seconda dignità) ha il 2. Il cubo 3. e così successiuamente. Hora mò: perche al moltiplicare delle proportionalità Geometriche corrisponde il sommare nelle Aritmetiche, ne siegue, che sommando insieme li numeri, corrispondenti alle due dignità, che si vogliono moltiplicare: quella dignità, che sarà all'incontro di tal somma, sarà il Prodotto di tal moltiplicatione. Per esempio. Volendo sapere, che cosa produce a moltiplicare Cubo con terzo Relato, si fà così. All'incontro del Cubo vi è vn 35 & all'incontro del terzo relato vi è 11. Sommati insieme questi due numeri, fanno 14: e perche all'incontro del 14 stà situato il quadrato secondo Relato, si conclude: che a moltiplicare Cubo con terzo Relato, produce quadrato secondo Relato. E così con quest'ordine, ouer Regola si troua il Prodotto di qualsiuogliano due dignità moltiplicate insieme.

Ma perche le trè prime dignità sono le più famigliari, e che frequentemente si maneggiano, quì le distendo, & è bene saperle a mente. Il numero, per non esser dignità, non altera qualsiuoglia dignità, con la quale si moltiplica: come appunto l'vnità non ingrandisce, nè altera il numero per ella Vnità moltiplicato. E però.

A Mol-

A Moltiplicare.

nu. via nu. fà nu.	cos. via co. fà qu.
nu. -- cos. -- cos.	cos. -- qu. -- cu.
nu. -- qu. -- qu.	cos. -- cu. -- q. q.
nu. -- cu. -- cu.	co. -- q.q. -- prim. Rel.

A moltiplicare.

qu. via qu. fà qu.qu.	cu. via cub. fà qu.cu.
qu. -- cu. -- pri.rel.	cu. -- q.q. -- sec.rel.
q. -- q.q. -- q.cu.	cu. -- pri.rel -- q.q.q.
qu. -- pr.Rel. - secon.rel.	q.cu. - q. cu. -- cu.cu.

Ma acciò la continua varietà de' Prodotti delle sudette moltiplicationi non spauenti: osseruisi il loro bell'ordine, che facilitarà l'imparare. Il numero (come s'è detto) non altera, ma sempre produce la dignità, con che si moltiplica. La cosa (prima dignità) moltiplicata con qualsiuoglia altra dignità, produce la dignità immediatamente seguente alla dignità, con la quale si moltiplica. Il quadrato auanza nel suo Prodotto due dignità; la dignità, con la quale si moltiplica. Il cubo l'auanza di trè, &c. Notisi ancora, che hauuto il primo Prodotto; gli altri seguitano successiuamente per ordine. Or veniamo a gli esempij.

A moltpl. 7 nu. per 6 nu.	A moltipl 5. cos. per 4 nu.	A moltipl. 8. cos. per 3 cos.
Fà 42 nu.	Fà 20 cos.	Fà 24 q

A moltipl. 9. Qu. per 8. cos.	A moltip. 4. cub. per 2 cub.	A molt. 15. qu. q. per 3 cub.
Fà 72 cub.	Fà 8. pr. rel.	Fà 45 sec. rel.

Et sic de singulis. DEL

DEL PARTIRE LE DIGNITÀ.

A Cart. 295. dissi, che al partire delle proportionalità Geometriche corrisponde il sottrare nelle Aritmetiche: e perhe le dignità Algebratice sono sõdate in continua proportionalità Geometrica doppia, ne siegue, che volendo partire vna dignità maggiore per vn altra dignità minore, basta sottrar il numero della minore dal numero della maggiore; perche all' incontro del resto starà registrata la dignità del Quotiente di tal proportione. Per esempio. Volendo partire terzo Relato per Cubo, si fà così. All'incontro del Cubo vi è il 3, & all' incontro del terzo Relato vi è 11. sottraggasi adunque 3 da 11, e restarà 8; e perche all'incontro dell'8 vi è il Quad.Qu Qu. si conclude, che a partire terzo Relato per Cubo, ne viene Quad.Qu.Qu. E così con questa Regola si partono qual si vogliono altre due dignità fra di loro. Ma perche le trè prime dignità sono le più familiari, quì per ordine le distendo.

A partire.

nu.	per	nu.	ne viene	nu.
cos.	——	nu.	—— —— —— ——	cos.
quad.	——	nu.	—— —— —— ——	quad.
cub.	——	nu.	—— —— —— ——	cub.
qu.qu.	——	nu.	—— —— —— ——	qu.q.

A partire.

cos.	per	cos.	ne vien nu.
qu.	——	cos.	—— —— —— cos.
cub.	——	cos.	—— —— —— quad.
qu.qu.	——	cos.	—— —— —— cub.
pri. rel.	——	cos.	—— —— —— qu.qu.

A par-

A partire.

quad.	per	qu.	ne viene	nu.
cub.	——	qu.	—— —— ——	cos.
qu.qu.	——	qu.	—— —— —— ——	quad.
pr.rel.	——	qu.	—— —— —— ——	cub.
cu.qu.	——	qu.	—— —— —— ——	qu.qu.

A partire.

cu.	per	cu.	ne vien	nu.
qu.qu.	——	cu.	—— —— —— ——	cos.
pri.rel.	——	cu.	—— —— —— ——	quad.
qu.cu.	——	cu.	—— —— —— ——	cub.

E così discorrendo con le altre dignità.

Quì bisogna auuertire vna Regola contraria al moltiplicare delle dignità. Quanto al partire qualsiuoglia dignità per numero, il Quotiente non muta spetie. Nel resto partendo qualsiuoglia dignità per la cosa, il Quotiente sarà della natura di quella dignità, che immediatamente antecede la dignità partita. Se si parte per quadrato, il Quotiente anticipa due dignità. Il cubo anticipa trè, &c. Notisi ancora, che il Quotiente di due dignità eguali è sempre numero: e poi seguita l'ordine, come di sopra si vede. Or veniamo a gli esempij pratici.

A partir	15	nu.		A partir	18	cos.	
per	3	nu.		per	6	nu.	
ne vien	5	nu.		ne vien	3	cos.	
A partir	12	cos.		A partir	25	quad.	
per	3	cos.		per	5	nu.	
ne vien	4	nu.		ne vien	5	quad.	

A partir	28	qu.	A partir	30	cu.
per	7	qu.	per	6	qu.
ne vien	4	nu.	ne vien	5	cos.
A partir	48	cu.	A partir	36	cub.
per	12	cos.	per	6	cub.
ne vien	4	qu.	ne vien	6	nu.

E così con tutte le altre dignità. Ma quando le dignità da partirsi fossero minori delle dignità partitrici: non potendosi ciò fare: bisogna formare vn rotto, (come anco si fà ne' numeri semplici). Per esempio. Volendo partire 12 nu. per 3. cos. (ancorche il 3. paia entrare 4 volte nel 12, ad ogni modo, per esser il 3. cos. di grado superiore al 12. nu. non si può far tal partitione) ma si rappresentarà così $\frac{12.nu.}{3.cos.}$ cioè 12. nu. esimi di 3. cos. Volendo anco partir 16 cos. per 4. quad. tal Quotiente si rappresentarà così $\frac{16.cos.}{4.qua.}$ E dirà 16 cos. esimi di 4. quad. *Et sic de singulis*.

Come si rappresentino le Rx. delle dignità.

DAlle dignità, (occorrendo il bisogno) si cauano le radici discreta, ò sordamente, come si cauano da numeri. Per esempio. La Rx di 4. quad. a 2 cosa: poiche radice, e cosa è l'istesso; e s'intende per il lato d' vn quadrato. La Rx di 7. quad. sarà Rx 7. quad. La Rx. di 8. cub. sarà 2 cos. *Et sic de singulis*. Il numero, ò quantità delle cose, ò sia numero quadrato, ò non quad. mai può hauere radice discreta: per non trouarsi alcuna dignità, che moltiplicata in sè stessa faccia cosa; e però la Rx di 4 cos. sarà Rx 4 cosa (e tanto meno da numero non quadra-

drato) Ma la ℞ di 4. num. sarà 2 nu.; e la ℞. di 16. nu. sarà 4 nu. e la ℞. di 5 num. sarà ℞. 5 nu. E tanto basti.

COME SI MANEGGINO Li Binomij, e Residui Algebratici.

CAP. III.

QVanto al maneggiare li Binomij, e Residui delle dignità Algebratice per tutti gli atti dell'Algorismo, non ci trouo difficoltà alcuna, ch'habbia necessità di maggior dichiaratione di quella de' Binomij, e Residui ordinarij. Basta hauer bene a memoria le Regole del più, e del meno: & anco hauer l'occhio al Prodotto delle moltiplicationi delle dignità. Si che metterò solamente in figura qualche esempio per ciascun atto dell'Algorismo, da filolosarui sopra.

Sommari de' Binomij.

A sómar 9 p 3 co. con 4 p 2 co.	A sómar 7 q p 5 con 3 q p 2	A sóm. 10 p 12 cu. con 5 m̃ 8 cu.
Fà 13 p 5 cos.	Fà 10 q p 7	Fà 15 p 14 cub.
A sóm. 5 c. p 3. co. con 4 cu. p 6 qu.	A sóm. 3 re. p. 5 q. con 2 cu. p. 3. co.	A sóm. 7 cm̃ 6 co. con 5. cu. p 4 co.
Fà 9 c p 6 q. p 3 co.	Fa 3 r. p 2c. p 5 q. p 3 c.	Fa 12 cu. m̃ 12 c.

Sottrari de' Binomij.

Da 9 cos.p 10	Da 7 q.p 2 co.m̃ 2	Da 17.q cu.m̃ 5 c.
cauar.5 cos.m̃ 3	cau. 2 q m̃ 3 co.p 7	cau.6 cub.p 3 qu.
Rest.4 cos.p 7	Re.5.q.p 5 co.m̃ 9	R. 17.q.c.m̃ 11 c.m̃ 3 q.

Da 10 qu.cu.p 7 quad.	Da 5 qua. cub. p 13. cos.
cauar. 7 cos. p 3	cauare 7 qu cu.m̃ 5 quad.
R.10 q c.p 7 q m̃ (7 co.p 3)	R.5 q 1 p 13.co.m̃ 2.qu.cu.

Moltiplica de' Binomij.

A mol.7 cos.p 5	A mol.9 q.m̃ 3	A m.12.cu.p 3 co.m̃ 5
per 4	per 6	per 6 cos.
Fà 28 co.p 20	Fà 14 q m̃ 18	Fà 72 q q p 18 q.m̃ 30 co.

A mol.13 rel. m̃ 2.quad.	A mol. 10 cub. m̃ 2 quad.
per 5 cos. p 3	per 9 cub. p 1 quad.
Fà 65 q c.m̃ 19 c.p 39 re.m̃ 6 q	p 10 rel.m 2 qu q.
	90 q c.m̃ 18 re.
	Fà 90 q c.m̃ 8.re.m̃ 2.q.q.

Quando occorrerà di quadrare qualsiuoglia Binomio, ò Residuo Algebratico, che non sia denominato da ℞, il Prodotto d' vn nome nell' altro si moltiplica semplicemente per 2, e non per 4.

Par=

Partire de' Binomij.

A Partire vn Binomio, ouero vn Residuo di dignità Algebratica per vn altro Binomio, ò Residuo, il suo Prodotto si nota in forma di rotto. Per esempio.

A part. 2. cos. p. 7, per 3 qu. p 5. cos. ne vien $\frac{2 \text{ cos. p } 7}{3 \text{ qu. p } 5}$

A par. 13 q cu. p 3 m. 2 co. per 5 cu. m. 7 q. ne viē $\frac{13 \text{ q. c. p. } 3 \text{ m. } 2 \text{ cos.}}{5 \text{ cu. m. } 7 \text{ quad.}}$

Vero è, che a partire tali Binomij, Residui, ò moltinomij, per numero, sempre si può realmente partire senza notarlo in forma di rotto. Per esempio. Volendo partire 24 qu. cub. p 12 quad. per 4. numero, basta a partire per 4 ciascuno di detti nomi: il che facendo, ne viene 6 qu. cub. p. 3. quad. E tanto basti, per hauer sufficiente fondamento da poter apprendere le seguenti Regole, e precetti Algebratici.

FONDAMENTO D'ALGEBRA.

CAP. IV.

IL primario Fondamento d'Algebra è la proportione d'egualità delli trè primi termini delle dignità Algebratice: cioe del numero, cosa, e quadrato. Ma perche questa egualità nelli predetti trè termini (necessarijssimi alla pratica d'Algebra) possono relatiuamente accadere in sei modi, ne siegue, che tutto il giro della scienza Algebratica si riduce a sei capitoli, trè de' qua-

si sono semplici, e gli altri tre sono composti, ciascuno de' quali hà la sua Regola particolare. Come siegue.

Primo Capitolo semplice.

IL primo capitolo semplice è quando le cose sono eguali al numero. In tal caso (a guisa della Regola Aurea) si parte il numero per le cose: & il Quotiente sarà la valuta d'vna sol cosa. Per esempio. Se 15. cose fossero eguali a 60. nu. partendo il numero 60 per le 15 cose, vna cosa valeria 4 nu. e se le 15. cos. fossero 15 Brazza di panno, & il 60. nu. fossero Scud. vn Brazzo valeria 4 Scud. Or veniamo alla pratica.

Trouami vn numero, che li $\frac{2}{3}$, e $\frac{3}{4}$ di detto numero gionti insieme facciano 68. Per la Regola delle positioni falsе si potria risoluere il quesito; ma voglio, che lo risoluiamo per Algebra così dicendo. Suppongo, che il numero, che cerchiamo sia 1. cos. pigliādone poi $\frac{2}{3}$ cos. $\frac{3}{4}$ cos. e sommandoli insieme, faranno $\frac{17}{12}$ col. $\frac{1}{1}$ e questi $\frac{17}{12}$ cos. per la suppositione fatta, saranno eguali al numero che vogliamo, che faccia; cioè a 68. Diuidasi adunque 68 per $\frac{17}{12}$ cos. (come comanda la Regola) e ne verrà 48, per valuta d'vna cosa. Adunque 48. è il numero cercato: perche hò supposto, che tal numero sia 1. cos. Piglianſi mò $\frac{2}{3}$, e $\frac{3}{4}$ di 48, e faranno appunto 68: come fù propposto.

Qui, e ne' seguenti capitoli bisogna auuertire; che il partire del num. per le cose, &c. s'intēde secōdo il partire de' numeri semplici, e non secondo il partire delle dignità. Voglio dire, che il Quotiente sarà num. semplice.

Secondo Capitolo semplice.

IL secondo capitolo semplice è quando li quadrati s'c. guagliono al numero. La sua Regola è questa: si parte il numero per li quadrati, & il Quotiente sarà la varietà d'vn sol quadrato: ma perche ordinariamente si cerca la valuta della co:. e la cos. non è altro, che la ra-

radice d'vn quadrato, ne siegue, che la radice del Quotiente sarà la valuta d'vna cosa. Alla pratica.

Trouami vn numero, che moltiplicando per 12 il suo quadrato, faccia 300. Sia tal numero 1 cos. Quadrisi 1 cos. e sarà 1 quadrato, qual moltiplicato per 12, farà 12 quadrati, eguali a 300. Diuidasi secondo la Regola il 300 per li 12 Quadrati, e di Quotiente ne verrà 25, per valuta d'vn sol quadrato la cui radice è 5, e tanto val la cosa. Adunque 5 è il numero cercato. Fanne la proua.

In simili quesiti, ecco vna mia ritrouata, & infallibile Regola. Diuidasi il numero assegnato per quel numero, che si douria moltiplicare col quadrato del cercato numero, perche la radice del Quotiente sarà il numero cercato. Per esempio. Trouami vn num. che moltiplicando per 15 il suo quadrato, faccia 135. Diuido per 15 il 135, e ne viene 9. la cui radice è 3, e questo è il num. cercato.

Terzo Capitolo semplice.

IL terzo capitolo semplice è quando li quadrati sono eguali alle cose. La sua Regola in sostanza è simile a quella del primo capitolo. Si partono le cose per li quadrati, & il Quot. sarà la valuta d'vna cosa. Alla pratica.

Trouami vn numero, che moltiplicato per 8, il Prodotto sia eguale al doppio del suo quadrato Horsù questo numero sia 1 cos. moltiplicato per 8, fà 8 cos. Fatto questo, si quadra 1 cos. e riesce 1 quadrato. Raddoppiandolo faranno 2 quadrati, eguali a 8 cos. Diuidansi mò secondo la Regola 8 cos. per li 2 quadrati, e ne verrà 4. per valuta d'vna cosa. Adunque 4 è quel numero, che moltiplicato per 8 fà 32. E perche il doppio del quadrato d'esso 4 fà parimente 32, l'operatione è buona.

CAPITOLI COMPOSTI.

PErche souente occorre ne' Capitoli compositi nominare Equatione, & estremi d'Equatione; prima di venire alle loro Regole, è bene dichiarare questi due ter-

mini: acciò s'intendi quel, che si legge. O veniamo alle curte, e lasciamo li discorsi da banda. Equatione adunque non è altro, che la proportione d'egualità frà due quantità, ò cose diuersamente denominate. Per esempio. Quando (verb. grati.) vno hà fatto la sua positione al proposto questo, & arriua a dire (come dissi per esẽpio nel terzo capitolo semplice) che 2 quad sono eguali a 8 cose. Io dico, che questi 2 quad. eguali a 8 col. si chiama Equatione. Li 2 quad. sono il primo termine, e le 8 cos. sono il secondo termine d'essa Equatione: qual Equatione si chiama cosi: perche tanto contiene in sè li 2 quad. quanto le 8 cos. Tanto val l'vno, quanto val l'altro termine.

In oltre bisogna auuertire: che, se a quantità eguali sarà aggionto, ò leuato quantità eguale, la somma, ò resto sarà parimente eguale. Di più. Se quantità eguali saranno moltiplicate, ò diuise per vn altra quantità egualmente, il Prodotto, ò Quotiente sarà parimente eguale. Ciò si dice perche spesse volte occorre aggiongere, ò leuare &c. dalli estremi: come in pratica a suo luogo si vedrà. O torniamo al nostro proposito.

Primo Capitolo composto.

IL primo capitolo composto è quando, che li quadrati, e le cose sono eguali al numero. La sua Regola è questa. Se da vna banda, ò dall'altra vi sarà più, ò meno d'vn quadrato: bisogna ridurre tutta l'Equatione ad vn sol quadrato. Il che si fà partendo tutta l'Equatione per la quantità de quadrato. Per esempio. Se 5 quad. più 30 cos. fossero eguali a 80. partendo tutta l'Equatione per 5 (quantità de quadrati) ne verrà 1 quad. più 6 col. & 16. Siche 1. quad. più 6 cos. saranno eguali a 16. Fatto questo, si partono per mezo le cose, che nel caso nostro è 3. Questo 3. si quadra, e fà 9. Al quadrato s'aggionge il numero, cioè 16, e fà 25. E cosi la R. di 25. (cioè 5.) men la metà delle cose (cioè 3.) sarà la valuta

d'vna

d'vna cosa. Valeria 2. Di più. Se $\frac{2}{3}$ quad. più 12 cos. fossero eguali a 40. diuidendo tutta l'Equatione per $\frac{2}{3}$, s'haurà 1 quad. più 18 cos. eguali a 60. Ma qui di passaggio ricordateui, che diuidendo vn rotto per vn altro rotto, eguale ne viene l'Vnità: e per diuidere vn sano per vn rotto moltiplica il sano per il Denominatore, & il Prodotto parte per il Numeratore del rotto (al contrario del moltiplicare.)

Trouami vn numero, che moltiplicato per 8, & al Prodotto giontoui il quadrato di detto numero, faccia 48. Suppongo, che questo numero sia 1 cos. moltiplicato per 8, fa 8 cos. e perche al Prodotto s'hà d'aggiongere il quad. di detto numero quadro 1 cos. e fà 1 quad. qual vnito con quelle 8 cos. farà 1 quad. più 8. cos. e questa somma sarà eguale a 48. E perche l'Equatione e ridotta ad vn sol quadrato: basta nel resto seguitar la Regola data. Il che facendo la cosa val 4. E 4 appunto è il numero cercato. Fanne la proua da te stesso.

Secondo Capitolo composto.

IL secondo capitolo composto è quando, che le cose, & il numero s'eguagliono alli quadrati. La sua Regola è in tutto simile a quella del precedente capitolo, eccetto che doue là nel fine dell'operatione si caua dalla $\frac{1}{2}$ la metà delle cos. qui s'aggionge. Alla pratica.

Trouami vn numero, che al treppio di esso num. giontoui 70, la somma sia eguale al suo quadrato. Questo num. sia 1 cos. Triplicato fa 3 cos. Aggiontoui 70. fa poi 3 cos. più 70, e questa somma sarà eguale (dal supposto) ad 1 quad. cioè al quadrato della cos. in che mi aposi. E perche l'Equatione da sè è ridotta ad 1 sol. quad. basta seguir l'ordine dato. E però partendo le cose per mezo, ne viene $1\frac{1}{2}$ cos. Questo $1\frac{1}{2}$ cos. si quadra, e fa $2\frac{1}{4}$. Aggiongasi il num. (cioè 70) e farà $72\frac{1}{4}$. La cui radice è $1\frac{17}{2}$, cioè $8\frac{1}{2}$, alla qual radice aggiongendoui la

metà della cos. (cioè 1 ½.) farà 10, per valuta d'vna sol cos. E però 10 è quel numero, al tripplicato del quale giontoui 70, fa 100 (eguale al suo quad. che pur fa 100.)

Terzo Capitolo composto.

IL terzo capitolo composto è quando, che li quadrati, & il numero s'eguagliono alle cose. La sua Regola è quella de passati capitoli: eccetto che, doue in quelli s'aggionge il numero dell'Equatione al quadrato della metà delle cose, in questo si sottra, e nel fine dell'operatione, oue nel primo capitolo si sottra, e nel secondo s'aggionge la metà delle cose alla radice, in questo si può aggiongere, ò leuare. Alla pratica.

Trouami vn numero, che moltiplicato per 25. il suo Prodotto sia eguale al doppio del suo quadrato, giontoui 72 di più. Sia questo numero 1 cos. moltiplicato per 25, fà 25 cos. e questo diremo, che sia eguale a 2 quad. più 72. Per trouar mò quanto val la cosa: bisogna ridurre l'Equatione ad vn sol quad. partendola tutta per la quantità de quadrati, cioè per 2. Il che fatto: ne vien 12 ½ cos. eguali ad 1 qu. più 36. Fatto questo: si partono le cos. per mezo, e restaranno 6 ¼ cos., che quadrate fanno 39 1/16. Da questo 39 1/16 non s'aggionge, (come ne' passati capitoli) ma si leua il numero dell'Equatione, (cioè 36,) e restarà 3 1/16. la cui ℞. è ¼. cioè 1 ¾. Hora mò dico, che aggiongendo, ò leuando da questa ℞ 1 ¾ la metà delle cose; la somma, ò resto farà la valuta d'vna cosa. Verò è, che non sempre riesce all'vno, & all'altro modo, ma bensì infallibilmente per l'vno, ò per l'altro modo. Aggiongiamo adunque alla ℞ 1 ¾ la metà delle cos. (cioè 6 ¼,) e farà precisamente 8. per valuta d'vna cosa. E appunto 8 è il cercato num., che moltiplicato per 25 fà 200, eguale al doppio del quad. dell'istesso 7. con 72. di più. Per l'altro modo non è riuscibile, non potendosi cauare la metà delle cos. della ℞ 1 ¾.

AL-

ALTRE SORTI D'EQVATIONI.

CAP. V.

Quadrati di Quadrati eguali al numero.

ALtri capitoli hanno le loro Regole, per trarre in luce li quesiti loro; ma però dependono da vno de sei precedenti. Trouami vn numero, che il quadrato del suo quadrato moltiplicato per 8, faccia 512. Sia 1. cos. la quale ridotta a qu di qu. e moltiplicata per 8, s' haueranno poi 8. qu. di qu. eguali a 512. Diuidasi 512 per 8, e ne verrà 64, per valuta d'vn sol quad. di quadrato. La cui ℞. ℞. sarà la valuta della cosa. Questo capitolo cade sotto il primo capitolo semplice.

Quadrati di quadrati, e quadrati eguali al numero.

QVesto, e gli altri due seguenti capitoli ordinatamente dipendono dalle Regole de tre capitali compositi con queste trè sole auuertenze. Prima se nell'Equatione vi sarà più, ò meno d'vn quadrato di quadrato bisogna ridurla ad vn sol quadrato di quadrato, partendo l'vno, e l'altro estremo per la quantità de qu. de qu. (più, o meno, che sia, d'vn quadrato di qu.) Secondo. Li quadrati dell'Equatione si partono per mezo, e la metà si quadra in vece delle cose. Terzo. L'vltimo euento, che ne capitoli compositi dà la valuta della cosa, in questi dà la valuta d'vn quadrato. Siche bisogna di più cauare la ℞ dal detto vltimo euento: la qual ℞ sarà la valuta della cosa. Alla pratica.

Trouami vn numero, che al quadrato del suo quad. giontoui 10 de suoi quad. faccia 171. Sia 1. cos. che ridotta a quad. di quad., & aggiontoui 10. quad. s'haue-

ranno

ranno poi 1,qu. di qu. p.10.qu. eguali a 171. Operando secondo la Regola del primo capitolo composto, e cautelle sudette la cos. valerà 3. E 3 appunto è il cercato numero.

Quadrati, e numero eguali a quadrati de quadrati.

TRouami vn numero, che il quad. del suo quad. sia eguale a 16 de suoi quadrati giontoui sopra 225. Sia 1 cos. qual ridotta a qu. di qu. s'haverà poi 1 quad. di quad. eguale a 16 quad. p. 225. Operando secondo la Regola del secondo capitolo composto, e cautelle sudette la cosa val 5, per il cercato numero.

Quadrati di quadrati, e numero eguali a quadrati.

TRouami vn numero, che sopra il quadrato del suo quad. giontoui 144, questa somma sia eguale al suo quadrato moltiplicato per 40. Sia 1 cosa, qual ridotta a qu. di qu. s'haverà 1 qu. di qu. p 144, eguali a 40. qu. operando secondo la Regola del terzo capitolo composto, e cautelle sudette la cosa valerà 6 per il cercato numero.

Ricordi.

PEr maggior chiarezza hò fatto riuscire le conclusioni senza rotto: mà in tutti li capitoli, quando che il numero dell'Equatione s'aggionge, ò leua dal quadrato della metà delle cose, ò meta de quadrati se tal somma, ò resto non sarà numero quadrato, ò non haverà R discreta: in tal caso la cosa val la medesima R sorda: cioè tal somma, ò resto, p. ouero men la metà delle cose, ò quad. E per ciò si nota in forma di Binomio, ò residuo.

Ma perche nel terzo capitolo composto, e suoi dependenti il numero del Quotiente si sottra dal quadrato della metà delle cose, o metà de quad. Se tal numero

dell'

dell'Equatione sarà eguale al sudetto quad. della metà delle cose, ò metà de quad. la valuta della cosa, ò d'vn quad. sarà la metà delle cose, ò quad. ma quando il numero dell'Equatione fosse maggiore, tal quesito non saria solubile: perche è impossibile a poter partire vna quantità in due parti tali, che il Prodotto d'vna in l'altra parte, sia più del quadrato della metà d'essa quantità.

Del leuare i superflui, e ristorare li diminuti.

CAP. VI.

SVperflui sono quelle quantità d'vn medesimo genere, che si trouano nell'vno, e nell'altro estremo dell'Equatione col termine di più. Questi si lieueno col sottrare li minori più dalli maggiori: acciò tal spetie di quantità resti solamente in vno de gli estremi, qual si sia diminuti sono quelle quantità, che in qualsiuoglia estremo sono notate col termine del men. Questi diminuti si ristorono con aggiongere all'vno, & all'altro estremo tali quantità; cominciando sempre dalli men maggiori. Alla pratica.

Habbiasi (per esempio) questa Equatione 12 quad. più 25. cos. men. 70, e quali a 100. cos. men 8 quad. men 30. Hor dico, che per ristorar li diminuti, primieramente aggiongo all'vno, & all'altro estremo quei men 70, e per aggiongerli al primo estremo, oue si trouano, basta a leuarli, ò darli di penna: poiche leuati, che siano, quei più 25. cos. che sono imperfette, per rispetto di quei men 70, restaranno poi intieri: e perche nell'vltimo estremo vi sono men 30 a quali douendosi aggiongere li men 70, che si sono aggionti al primo estremo, acciò l'Equatione resti equilibrata, ne siegue: che sommando men 30 con più 70, restarà più 40. Siche s'haueranno mò 12

quad.

quad. più 25 cos. eguali a 100. cos. più 40, men 8 quad. In questo istesso modo si ristorano quei men 8. quad. & haueransi poi 20. quad. più 25 cos. eguali a 100. cos. più 40. Finalmente leuati dall'vno, e l'altro estremo li superflui: (cioè quelle più 25 cos.) s'haueranno poi 20. quad. eguali a 75. cos. più 40. E così leuando li superflui, e ristorando li diminuti, habbiamo ridotta l'Equatione al secondo capitolo composto di cose, e numero eguali alli quad. secondo la di cui Regola nel resto s'operaria; E tanto basti al speculatio, & ingegnoso Studente.

DEL LEVARE LE RADICI da gli estremi delle equationi.

CAP. VII.

IL miglior modo di leuar le radici dall'Equationi è il discompagnarle da qualsiuoglia altra quantità, che sia in sua compagnia; il che si fà leuando dette quantità dall'vno, e l'altro estremo, se non in altra maniera col termine di più, ò di men: (il che si può far sempre) acciò l'Equatione resti sempre eguale, & la Rx resti sola in vno delli estremi. Ciò fatto, si quadra l'vno, e l'altro estremo, con che l'Equatione si mette in stato di ridurla a capitolo ordinario, ristorando li diminuti, e leuando li superflui. Alla pratica.

Habbiasi 8 cos. eguali a 10 più Rx V(40. qu. più 20. cos.) Leuando dall'vno e l'altro estremo li 10, che sono in cõpagnia della Rx V (40 q. più 20 cos. s'haurà poi Rx V (40 q. più 20 cos) egual a 8 cos. mẽ 10. Quadrisi l'vno, e l'altro estremo, se ne verrà 64. q. più 100. mẽ 160 cos. eguali a 40 quad. più 20. cos. Imperoche quella Rx. (quasi legata) si scioglie quadrãdola, e produce precisamẽte quella quãtità della quale lei è suppostà Rx, e perche detta Rx è egual a

8. quad.

8.quad. men 10, non si può dubitare, che li loro quadrati non siano parimente eguali, Ristorando, e leuando li superflui si riduce poi l'Equatione a capitolo ordinario(Che per esser chiaro, tralascio l'esemplificarne.)

Se le radici fossero col termine di men bisogna prima ristorarla; il che fatto: tal radice sarà passaggio al termine di più si separa dall'altre quantità, e poi s'opera, come sopra.

Se in ambidue gli estremi fossero ℞ col termine di più, prima d'ogni cosa si quadra l'vno, e l'altro estremo: il che fatto, la ℞ resta in vn sol estremo; e poi si opera, come sopra.

Ogni volta, che le cos.quad.ò altra dignità s'eguaglia al numero e ℞; ouero a ℞ sola: senza leuar tal ℞ si parte il numero, e radice, ò ℞ sola per le cos. quadrati, &c. E così il Quotiente sarà la valuta della cosa, quadrato, &c Per esempio. Siano 10. cos. eguali a 35 più ℞. 360: Diuidasi 35. più ℞ 360. per 10, e ne verranno 3 $\frac{1}{2}$ più ℞ 3 $\frac{3}{4}$ per valuta d'vna cos.

Finalmente può accadere, che non si possino leuare dette radici: & è quando, che operando, non si può ridurre l'Equatione a capitolo ordinario.

DEL LEVARE LI ROTTI

Dalle Equationi.

CAP. VIII.

1 LI rotti si lasciano vedere nelle Equationi dal partire numero per dignità Algebratica: ouero dal partire vna dignità minore per vn altra dignità maggiore: il che non si può fare, se non in forma di rotto. Ogni volta adunque che il rotto sarà solo in vno delli estremi, per leuarlo, basta a moltiplicare il Denomina-

to-

tore del rotto con tutto l'altro estremo dell' Equatione: perche tal Prodotto sarà eguale al Numeratore di esso rotto. Per esempio. Se $\frac{150}{6\ col.}$ fossero eguali a 15 più 8 cos. Operando, come hò detto, ne verranno 90 cos. più 48. quad. eguali a 150 Numeratore.

2 Se nell'vno, e nell'altro estremo dell' Equatione saranno rotti solamente, si moltiplicano vicendeuolmente in croce: come si costuma, quando si vogliono ridurre rotti ordinarij sotto vna medesima denominatione. Il che fatto, li Prodotti saranno eguali l'vno all' altro. Per esempio. Se $\frac{16.}{2.co.}$ fossero eguali a $\frac{40}{1\ q.\ p.1.co:}$ operando, come hò detto, s' haueria poi 16 qu. più 16 cos. eguali 80 cose.

3 Se in vno degli estremi col rotto saranno de' sani; si leui dall'vno, e dall'altro estremo il sano, che si troua in compagnia del rotto: il che fatto, l' Equatione è ridotta al primo esemplare: secondo la cui Regola operarai. Per esempio. Se 12 più $\frac{15.}{1.qu.}$ fossero eguali a 12 cos. più 8 si leuino dall' vno, e l'altro estremo li 12. che sono col rotto, & haueralli poi $\frac{15.}{1.qu.}$ eguali a 12. cos. men 4. Operando poscia secondo il primo esemplare, s'haueranno poi 12. cub. men 4. quad. eguali a 15. Qui si ristori, e leuino li superflui; che poi l'Equatione sarà ridotta a segno.

4 Finalmente se saranno rotti accompagnati con sani nell'vno, e l'altro estremo, si sottra vn rotto dall' altro, secondo la Regola de' rotti ordinarij: riducendoli ambidue ad vna medesima denominatione, col moltiplicarli in croce (hauendo però l' occhio sempre alli Prodotti delle dignità Algebratice). Fatta tal sottratione, il rotto restarà col sano in vn sol estremo. E

per

per leuarlo, e per ridurre l'Equatione a segno: s'opera, come nel precedente caso. Per esempio, Se 2. quad. più $\frac{10 \text{ cos.}}{3 \text{ qu.}}$ fossero eguali a 10 più $\frac{15.}{4.\text{cos.}}$ Leuando vn rotto dall'altro, come hò insegnato s'haueranno poi 2 quad. eguali a 10 più $\frac{5}{12}\ \frac{\text{qu.}}{\text{cub.}}$ Nel resto s'opera, come nel precedente terzo ammaestramento, si potria ancora ridurre li sani in rotti, e poi operare secondo la Regola del secondo ammaestramento.

DEL DEGRADARE LE EQVATIONI.

CAP. IX.

OGni volta, che nelle Equationi non si troui il numero, bisogna degradare tal Equatione. Il che si fà partendo tutta l'Equatione per vna delle minori dignità, che in quella si troui: imperoche si come a moltiplicare le dignità per l'Vnità d'vn altra, s'ingrandiscono, non nel numero, ma *Virtualiter*, cioè nell'ascendenza di maggior dignità: così diuidendole, calano, e s'abbassano: non di numero, ma di grado. Alla pratica. Habbiasi 12. cub. p. 18. quad. eguali a 50. cos. Io dico, che si deue partire tutta l'Equatione per vna sol cosa: il che facendo, s'haurà poi 12 quad. p. 18. cos. eguali a 50. numero. Parimente. Se 15. qu. qu. p. 11 cub. fossero eguali a 30. quad. partendo tutta l'Equatione per vn sol. quad. ne verrà 15. quad. p 11. cos eguali a 30. numero. *Et sic de singulis*. Ma quando nell'Equatione si troua il numero, tal Equatione non si può degradare. Il numero è sempre necessario nell' Equationi.

Auuisi considerabili.

1 PEr risoluere li quesiti si può far la positione sopra vna, ò più cose. Sopra vno, ò più quadrati: ouero sopra vna, ò più qual si sia altra dignità (accom-

pa-

pagnata da numero, se piace, per maggior com modità) ma pazzia riputarei l'apporsi a dignità alte, ch' altro, che fatica non apportano: potendo hauere l'intento per il sol num. cos. e quad. Fatta adunque la positione sopra vna, ò più cos. bisogna poi maneggiarle secondo il tenore del quesito, finche s'arriui a qualche Equatione: che nel resto s'opera poi come ne' proprij capitoli s'è insegnato.

2 Quì rinfresco alla memoria, che trouata l'Equatione (se fà bisogno) conuiene ridurla a segno leuando li superflui, ristorando, e diuidendo tutta l'Equatione per il numero, ò quantità della maggior dignità, che sia in essa: acciò in vno degli estremi tal dignità resti con la sola Vnità.

3 Ogni volta, che qualsiuoglia dignità sola in vn estremo s'eguaglia al numero, per Regola ferma si parte il num. per tal dignità: e la R. del Quotiente sarà la valuta d'vna sol cosa. Per esempio. Se 5 cu. fossero eguali a 40. si parte il 40. per 5, e ne viene di Quot. 8. La cui R. cu. è 2. per valuta d'vna sol cos. Ma partendo il numero per le cose, il semplice Quotiente è la valuta della cosa.

4 Di più. Ogni volta, che qual si sia dignità s'eguaglia alla dignità immediatamente inferiore a quella, si parte la minore per la maggiore, & il Quotiente sarà la valuta d'vna sol cosa. Per esempio, Se 5. pri. rel. fossero eguali a 30. qua. qua. si parte il 30 per 5, & il Quotiente 6 sarà la valuta della cos. Lo proue così dicendo. Se 5 pr. rel. danno 30. qu qu. Che darà 1 cosa? Moltiplicando 1 col. con 30. qu. qu. fà 30. pr. rel. quali diuisi per 5. pr rel. ne viene 6 di nu. sempl. e per valuta d'vna cosa.

5 Tali quesiti si propongono alle volte, che difficilmente si possono ridurre a capit. ordinario con vna sol positione: laonde conuiene farne due di quantità differenti. Per esempio, Tro-

Trouami due numeri, che tanto faccia l'vno moltiplicato per 4, & al Prodotto giontoui 16. quanto l'altro moltiplicato per 8, e dal Prodotto leuatone 4, e che il Prodotto d'vno in l'altro faccia 2. Il primo numero sia 1 cos. & il secondo sia 1 tanto. Si che operando s'haurà 4 cos. più 16 eguali a 8, quantità, ò tanti; perche, si come a moltiplicar cos per numero, ne vien cos. così a moltiplicar tanti per numero ne verrà tanti. Ristorando l'Equatione, s'haueranno poi 4 cos. p. 20. eguali a 8 tanti. Ma per leuarsi da i piedi li tanti, si partono le 4 cos. p. 20. semplicemente per li 8. tanti, & il Quotiente, cioè $\frac{1}{2}$ sarà la valuta d'vn sol tanto. Adunque il primo numero sarà 1 cos. e l'altro $\frac{1}{2}$ cos. p. 2. $\frac{1}{2}$. Bisogna mò vedere, se il Prodotto d'vno nell'altro sia precisamente 12. Operando, s'haurà $\frac{1}{2}$ quad. p. 2. $\frac{1}{2}$ cos. eguali a 12. Finalmente riducendo l'Equatione ad vn quadrato intiero, s'haurà poi 1. quad. p. 5 cos. eguali a 24. Capitolo primo composto. La cos. val. 3, per il primo numero. E perche il secondo fù trouato esser $\frac{1}{2}$, cos. più 2 $\frac{1}{2}$, però tal numero sarà 4, e che sia il vero. Il primo moltiplicato per 4, & al Prodotto giontoui 16, fà 28. Così parimente il secondo moltiplicato per 8, e dal Prodotto leuando 4, resta 28. e moltiplicando l'vno per l'altro, fà appunto 12. O bello.

6 Finalmente mi occorre auuisare chi legge, che quando li termini dell'Equatione fossero di simil parti, tali eguagliamenti sariano irregolari. Come se 8 quadrati, più 4. cos. fossero eguali a 8 quadrati più 4 cos. *Et sic de singulis*. E per esser meglio inteso. Trouami due numeri, che habbiano la proportione, come di 2 a 3, e che moltiplicato il primo per 6 faccia quanto fà l'altro moltiplicato per 4. Per mantenere la proportione, sia il primo numero 2 cos. e l'altro 3. cos. quali moltiplicati, come s'è proposto; s'haueriano poi 12.

cos. Laonde li ricercati numeri saranno quei medesimi in che si appone: e però è superfluo l'operare. Ma se in vno estremo sarà maggior quantità simile: il quesito saria irrisolubile; come chi dicesse, che 2. cos. e 3 cos. fossero moltiplicate, per 5 le prime, e per 4 le seconde, e che li Prodotti fossero eguali: poiche operando s'haueriano 10 cos. eguali a 12. cos. (il che non può essere.) Schiasi, ò degradisi 10 cos. e 12 cos. e ne verrà 10 eguali a 12 (cosa impossibile.)

PROBLEMI ALGEBRATICI.

CAP. X.

HAuendo esposto, e dichiarato li principali fondamenti d'Algebra (scienza laboriosa, ma soauissima) bisogna mò venire alla pratica: acciò meglio s'imprimi nella mente. Cominciaremo da' Problemi più facili, e poi s'andarà ascendendo gradatim.

Nel risoluere gli Problemi osseruarò quest' ordine. Farò la positione, & operarò sino ad hauer ridotto l'Equatione a capitolo ordinario, (che in questo consiste la difficoltà) che da li impoi è facil cosa l'operare; & in vltimo dichiararò la valuta della cosa: cioè la quantità cercata, e sotto a qual capitolo cadi ciascun problema. Perche saria cosa troppo tediosa il voler tirar a fine ciascun Problema.

Per esser questa scienza l'arte magna del calcolare; è necessario esser molto versato, e pratico nelle quantità si discrete, come continue; altrimente non s' haueria modo di saperssi accommodare li quesiti nelle mani: come a suoi luoghi si motiuarà. *Qui potest capere capiat.*

Problema Primo.

Trouami vn numero, dal quale leuandone la metà, & $\frac{1}{3}$, il resto sia 12

Sup-

Suppongo, che questo numero cercato sia 1. cos. Adunque 1. cos. (dal suo posto) sarà eguale al numero incognito. E si come 1. cos. è la radice d'vna Progressione Geometrica, principiante dall'Vnità: così tutto l'Artificio Algebratico consiste in saper trouare, che sorte di Progressione ne dia il cercato numero, posto vicino all'Vnità, cioè nel secondo luogo: poiche qualsiuoglia numero sano, ò rotto, ouero sano, e rotto può possedere il secondo luogo d'vna Progressione Geometrica. Horsù. Di questo 1. cos. ne pigliò $\frac{1}{2}$ cos. e $\frac{1}{3}$ cos. quali sommati insieme, fanno $\frac{5}{6}$ cos. e questi $\frac{5}{6}$ cos. saranno eguali alla somma d'$\frac{1}{2}$, e $\frac{1}{3}$ del numero cercato. Cauando mò $\frac{5}{6}$ cos. da 1. cos. intiero, mi resta $\frac{1}{6}$ cos. Adunque $\frac{1}{6}$ cos. sono eguali a 12; perche 12 ne restò (dice il quesito) dopo d'hauerne leuato $\frac{1}{2}$, & $\frac{1}{3}$. Trouata l'Equatione, secondo la Regola si parte 12 per $\frac{1}{6}$, e di Quotiente ne viene 72. La cos. val 72. Cap. 1. sempl. Adunque 72 è quel numero, dal quale leuandone la metà, & $\frac{1}{12}$, il resto è 12: e questo 72, posto nel secondo luogo d'vna Progressione Geometrica, cominciante dall'Vnità, starà come siegue.

1.72.5184.373248, &c. L'Ascendente è 72.

Problema Secondo.

Trouami vn numero, che moltiplicato per 7, & al Prodotto giontoui 50, faccia 302.

Sia 1 cos. che moltiplicata per 7, & al Prodotto giontо 50, s'haueranno 8. cos. più 50, eguali a 302. Leuansi dall'vno, e l'altro estremo quei più 50, e restaranno poi 7 cos. eguali a 252. Cap. 1. sempl. La cos. val 36. E 36 appunto è il numero cercato.

Problema Terzo.

Trouisi due numeri, che siano proportionali come

3 a 4; e che moltiplicando il maggiore per 2, & il minore per 5, li Prodotti vniti insieme facciano 46.

Vno di questi numeri sia 3 cos. e l'altro 4. cos. che moltiplicate insieme, e sommati li Prodotti, come s'è proposto, s'haueranno 23 cos. eguali a 46. Cap. 1. semplice. La cosa val. 2. E perche la positione fù fatta sopra 3. cos. e 4 cos. moltiplicasi 3, e 4 cos. per 2: e s'haurà 6, e 8 per li cercati numeri.

Problema Quarto.

Trouisi vn numero, al quale aggiongendo 30, e 90. le due somme siano frà loro in proportione doppia.

Questo numero sia 1 cos. aggiongendoli 30 per vna parte, e 90 per l'altra, s'haurà poi 1 cos. più 30, & 1 cos. più 90. Raddoppiasi 1 cos. più 30 acciò sia in proportione doppia all'altro, e s'haurà poi 2. cos. più 60, eguali a 1 cos. più 90. Leuansi li superflui, e restarà 1. cos. eguali a 30. Capitolo primo semplice. La cosa val 30. E questo è il numero cercato, al quale aggiongendoli 30, e 90 s'haurà 60, e 120 in proportione doppia.

Problema Quinto.

Trouami vn numero, dal quale cauatone 30, e 90 il maggiore de' due residui sia quattro volte il minore.

Sia 1 cos. dal quale cauatone 30, e 90, restarà 1 cos. men 30, & 1 cos. men 90. E perche 1 cos. men 90 determino per la parte minore, bisogna quadruplicarla. Il che facendo, s'haueranno poi 4 cos. men 360, eguali a 1 cos. m. 30. Leuando li superflui, e ristorando li diminuti, s'haueranno poi 3 cos. eguali a 330. La cosa val 110. per il cercato numero. Capit. 1. semplice.

Problema Sesto.

Trouami vn numero, che cauato da 50, e da 200; il maggior residuo sia sei volte il minore.

Questo num. sia 1 cos. il quale cauato da 50, e da 200, resta 50. men 1 cos. e 200 men 1. cos. & acciò il maggiore

sia

fia fei volte il minore, moltiplico per 6 il 50. men 1. cof. e ne viene 300. men 6 cof. eguali a 200. men 1. cof. Leuando li fuperflui, e riftorando &c. s'haueranno poi 5 cof. eguali a 100. La cofa val 20 per il numero cercato. Capitolo primo femplice.

Problema Settimo.

Diuidafi 100. in due parti tali, che il terzo d'vna, & il quinto dell'altra gionti infieme facciano 30.

La prima parte fia 3 cof. di neceffità il fuo terzo farà 1. cof. e per confequenza il quinto dell'altra parte farà 30 men 1 cof. acciò fi verifichi, che $\frac{1}{3}$ d'vna, & $\frac{1}{5}$ dell'altra parte facciano 30. Hora mò, fe 30 men 1 cof. è il quinto della feconda parte, 150 men 5 cof. farà il fuo tutto. Vnifcanfi adunque infieme queſte due parti; cioè 3 cof. & 150 men 5. cof. e s'haverà pòi 150 men 2 cof. eguali à 100. Leuando poicia li fuperflui, e riftorando li diminuti s'haueràno finalmente due cof eguali a 50. La cofa val 25. E perche la prima parte fù fuppoſta 3 cofe. tal parte farà 75, e l'altra il reſto fino a 100, cioè 25. Piglia mò vn terzo di 75, & vn quinto di 25, che appunto faranno 30. Capitolo primo femplice.

Problema Ottauo.

Diuidafi 200. in due parti, ò numeri: E poi di nuouo fi torni a diuidere in due altre parti, ò numeri: talche il maggiore della prima diuifione fia in proportione doppia col minore della feconda diuifione, & il maggiore della feconda diuifione fia in proportione trippla con il minore della prima.

Il minore della feconda diuifione fia 1 cof. il maggiore della prima farà 2 cof. e di ragione il fuo minore farà 200. men 2 cof. è perche il maggiore della feconda diuifione deue eſſer trè volte il minore della prima, perciò tal parte ò numero farà 600 men 6. cof. Reſta, che la fomma delli due numeri, ò parti della feconda diui-

sione siano 200, mà perche sono 600, men 5 cos. ne segue, che 600. men 5. cos. sono eguali a 200. Leuando li superflui l'Equatione resta 5 cos. eguali a 400. Capitolo primo semplice. La cosa val 80. Sicche il numero minore della seconda diuisione sarà 80, & il maggiore della prima sarà 160. gli altri due il residuo fino a 200. e sono questi.

Prima diuisione 160 — 40
Secon. diuisione 120 — 80

Problema Nono.

Trouami vn numero, dal quale cauandone il terzo: e da quel, che resta, cauandone il quarto, e dal secondo resto cauandone il sesto, e l'vltimo resto sia 140.

Questo numero sia 1 cos. cauandone $\frac{1}{3}$, restano $\frac{2}{3}$ cos. da questi $\frac{2}{3}$ cos. cauandone $\frac{1}{4}$, (ch'è $\frac{1}{6}$ cos.) resta $\frac{1}{2}$ cos. E da questo $\frac{1}{2}$ cauandone $\frac{1}{6}$, (ch'è $\frac{1}{12}$ cos.) restano $\frac{5}{12}$ cos. eguali a 140. La cosa val 336, per il numero cercato. Primo capitolo semplice.

Problema Decimo.

Trouinsi due numeri, che il primo pigliandone 30 impresto dal secondo, sia doppio al restante del medemo secondo, & il secondo pigliandone 50 dal primo, sia poi tripplo al restante del primo.

Il secondo di questi due numeri sia 1 cos. più 30, (acciò dandone 30 al primo, egli resti con 1 cos.) Il primo sarà 2. cos. men 30 acciò riceuendo 30 dal secondo, sia poi doppio al residuo d'esso secondo, che restò con 1 cos. Resta mò, che il secondo riceuendo 50 dal primo, sia tripplo al residuo del medesimo primo. Mà se il primo dà 50 al secondo; egli resta con 2 cos. men 80, & il secondo diuiene 1 cos. più 80. Triplichiamo quei 2 cos. men 80, e s'haueranno poi 6. cos. men 240, eguali a 1. cos. più 80. Leuando li superflui, e ristorando li diminuti, l'Equatione restarà 5 cos. eguali a 320. la cos. val 64 Il primo numero sarà 98 il secondo 94. Cap. 1. semplice.

Pro-

Problema Vndecimo.

Trouami due numeri, che vno sia 4 più dell'altro, e che il quad. del maggiore sia 32. più del quad. del minore.

In simili quesiti il minor num. si pone esser vna cosa, manco la metà della differenza frà essi numeri: però il minore sia 1 cos. men 2, & il maggiore sarà 1 cos. più 2. Quadrinsi questi 2. supposti numeri, e si caui l'vno dall' altro, il che fatto, restaranno 8. cos. e perche doueria restare 32 perciò 8 cos. saranno eguali a 32. La cosa val 4 Siche il primo numero sarà 2, & il secondo 6. Capitolo primo semplice.

La Regola di simili quesiti è questa, si parte il determinato numero (cioè nel caso proposto il 32.) per il doppio del 4 (dato numero, cioè per 8,) e dal Quotiente 4 cauando la metà del dato numero, cioè 2 s'haurà il minore de cercati numeri che saria pur 2: & aggiongendo a detto Quotiente essa metà, tal somma sarà il numero maggiore, che parimente saria 6. Mà se dal suddetto Quotiente non si potesse cauar la metà del dato numero, tal quesito non si potria risoluere. E ciò serui d'auuiso.

Problema Duodecimo.

Diuidasi 20 in due parti tali, che l'eccesso de' loro quadrati sia 120

Vna parte sia 10 più 1 cos. che altra sarà 10 mé 1 cos. Quadrando queste due parti, s'haueranno questi due quad. 1 Quad più 20 cos. più 100, & 1 quad men 20. cos. più 100. Cauando l'vno dall'altro, il suo eccesso, ò residuo è 40 cos. eguali à 120. La cosa val. 3. La parte che fù supposta 10 men 1 cos. sarà 7. L'altra 13. Capitolo primo semplice.

Problema Terzodecimo.

Trouami trè numeri, che il primo col secondo faccia 20. Il secondo col terzo faccia 30. Et il terzo col primo faccia 40.

Il primo sia 1.cos. Il secondo sarà 20.men 1 cos. Il terzo sarà 10 più 1 cos. (acciò col secondo faccia 30) & il primo col terzo sarà 2 cos. più 10. Mà perche doueria esser 40 però 2 cos. più 10 sono eguali a 40 Leuando li superflui, 2 cos. restan eguali a 30. La cosa val 15. Il primo numero è 15. Il secondo 5. il zerzo 25. Cap. primo semplice.

Problema Quartodecimo.

Trouami due numeri, che il quadrato d'vno sia 96. più del quadrato dell'altro.

Il lato d'vn quadrato sia 1 cos. & il lato dell'altro sia 1 cos. più 8 (Qui s'aggionge vn numero ad libitum; acciò il suo quadrato sia meno di 96.) Quadrinsi questi due lati, e si caui vn quadrato dall'altro, che restarà 16 cos. più 64, eguali a 96. Leuato il 64 superfluo, restara nno 16 cos. eguali a 32. La cosa val 2 Siche il primo numero sarà 2, l'altro 10. Li quadrati de quali sono 4, & 100, cioè 96 più dell'altro: Capitolo primo semplice.

Problema Quintodecimo.

Vno deue dare ad vn altro Scud. 528 con quest'ordine: che il primo Mese li dia vn sol Sc. il secondo ne dia due: e cosi ogni Mese vadi crescendo vn Scudo. Domando. In quanti Mesi pagarà tutta la somma?

Simili quesiti nō vogliono altro inferire, se non. Trouami vn numero, al quale giontoui sopra l'Vnità, e tal somma moltiplicata per la metà d'esso numero, faccia 528 (e ciò nasce per l'eccidenza della Regola del sōmar le Progressioni Aritmetiche 203.) Hora mò, questo num. sia 1 cos. Giongendoui l'Vnità sarà 1 cos. più 1, qual sōma moltiplicandola per la metà d'esso numero, cioè per $\frac{1}{2}$ cos. s'hauerà poi $\frac{1}{2}$ quad. più $\frac{1}{2}$ cos. eguali a 528, (numero de Scud.) Qui bisogna ridur l'Equatione ad vn quad. partendola tutta per il numero de quadrati, cioè per $\frac{1}{2}$ quad. Il che fatto, s'hauerà poi 1 quad. più 1 cos. eguali a

1056.

1056.(poiche il numero da partirſi per metà, ſi radoppia.) Siche l'Equatione è ridotta al primo capitolo cõpoſto. Operando ſecondo la ſua Regola, la coſa val 32; e coſi in 32 Meſi hauerà pagati li Scudi 528.

Problema Seſtodecimo.

Da Roma a Milano ſiano miglia 360 Due Peregrini ſi partono nell'iſteſſo punto, vno da Roma, per andare a Milano, e l'altro da Milano, per andare a Roma, e fãno ambidue la medeſima ſtrada. Quello, che parte da Roma fà il primo giorno 6 miglia, il ſecondo 12, & il terzo ne fà 18, e coſi ogni giorno creſce 6 miglia. L'altro, che parte da Milano fà il primo giorno 4 miglia, il ſecondo 8, il terzo ne fà 12, e coſi ogni giorno creſce 4 miglia. Domando, in quanti giorni s'incontraráno inſieme queſti due Peregrini? E quando ſi ſaranno incontrati, quante miglia hauerà fatto ciaſcun di loro?

La riſolutione di ſimili queſiti ſtà fondata ſopra l'euidẽza di quella Regola, per trouar la quãtità dell'vltimo termine d'vna Progreſſione Aritmetica; e ſopra di quell'altra del ſommare detta Progreſſione, carte 204. e 207.

Supponiamo, che li due Peregrini s'incontrino in 1 coſ. di giorni. Queſto 1 coſ. di giorni rappreſenta la quãtità de termini d'vna Progreſſiõ in aſtratto; cioè la quãtità di giorni, che ſpenderanno ad incontrarſi. Per ſaper mò il viaggio, che in detto tẽpo hauerà fatto quello che parte da Roma, biſogna prima trouar il viaggio, che farà l'vltimo giorno; cioè quãdo s'incontrarà cõ l'altro Pelegrino. E per ſaperlo, da 1 coſ. leuo l'Vnità (ſecõdo la Regola generale, per trouar la quãtità dell'vltimo termine) e mi reſta 1 coſ. men 1, qual reſto ſi moltiplica per il numero aſcẽdẽte, cioè per 6, e ne viene 6 coſ. men 6. al qual Prodotto aggiongẽdoni il primo termine, cioè il viaggio del primo giorno, s'hauerà poi in tutto 6 coſ. per il viaggio dell'vltimo giorno. Fatto queſto, biſogna mò ſõma-

re

re la Progressione, e però a 6 cos. aggiongo di nuouo il primo termine, cioè 6, & haurò 6 cos. più 6, le quali 6 cos. più 6 moltiplico per ½ cos. cioè per la metà de termini in che in astratto mi apposi, e così haurò 3 quadrati più 3 cos. per tutte le miglia, ch'haurà fatto il sudetto Peregrino, che parte da Roma, quali si seruano da parte.

Il Peregrino, che parte da Milano, (operando come sopra) in 1 col. di giorni haurà fatto 2 quad più 2 cos. che uniti cõ gl'altri, fanno 5 qu. più 5 cos. eguali a 360. Aggiustando mò l'Equatione, secondo la Regola del primo cap composto. La cosa valerà 8. E così concludo, che li due Peregrini s'incontraranno in 8 giorni Per saper mò il viaggio, che ciascuno haurà fatto in detto tẽpo: basta a trouar il viaggio, che l'vno, e l'altro hà fatto l'ottauo giorno, cioè l'vltimo di otto termini della Progressione, rappresentata in quelli 8 giorni. Il che fatto, e sommata la Progressione in risguardo all'vno, & all'altro Peregrino, si trouarà, che quello, che partì da Roma, haurà fatto miglia 216, e l'altro 144, che unite insieme, fanno precisamente 360. E però stà bene.

Ma se le miglia fossero, per esempio 370 s'vnisce insieme il viaggio, che fariano il nono giorno li due Peregrini (che nel caso nostro sono 90 miglia) e poi si dice, Se 90 miglia si fanno in hore 24 in quant'hore si faranno 10 miglia? (cioè il soprà più delle 360, fatte in 8 giorni intieri.) Operando, si fariano in hor. 2 minuti 40. e così in giorni 8, hor. 2 minut. 40. s'incontrariano li due Peregrini, se le miglia fossero 370 (e serui d'auuiso.)

Problema Decimosettimo.

Vno piglia vna Casa a fitto per Scu. 60 all'Anno. Mà prima d'entrar in casa sborsa al Padrone di essa Scu. 200. & egli all'incontro s'obbliga scontarli nel fitto, con vtile di 5 per 100 all'Anno, e di lasciarlo in Casa, fin che li 200. Scu. siano scontati del tutto. Domando, quanto l'affittuario goderà la Casa?

Si

Si fà così. In capo al primo Anno li Scu. 200, col suo frutto diuentano 210, cioè crescono la vintesima parte del capitale: ma pagati li Scu. 60 del fitto restano 150. Questi 150 in capo al secondo Anno, a 5 per 100 saranno 157 $\frac{1}{2}$, de quali pagando il fitto, restano 97 $\frac{1}{2}$. Questi a 5 per 100, nel fine del terzo anno saranno 102 $\frac{3}{8}$: ma scontando il fitto, restano solamente 42 $\frac{3}{8}$. E perche si vede che non può star più in Casa vn Anno intiero; per saper quanto vi deue dimorare, si fà la positione Algebratica così. Suppongo, che v'habbia da stare 1 cos. d'Anno, e poi dico. Se 1 Anno paga di fitto Scu. 60. quanto pagarà 1 cos. d'Anno? Pagarà 60. cos. di Scud. Fatto questo, bisogna vedere quanto meritano quei Scud. 42 $\frac{3}{8}$ in vn Anno. Trouo, che meritano Scud. 2 $\frac{19}{160}$; e poi di nuouo dico. Se nel corso d'vn Anno Scu. 42 $\frac{3}{8}$ meritano Scu. 2 $\frac{19}{160}$ Quanto meritaranno in 1 cos. d'Anno? Meritaranno 2 $\frac{19}{160}$ cos. di Scu. quali vniti col suo capitale saranno in tutto Scu. 42 $\frac{3}{8}$. più 2 $\frac{19}{160}$ cos. trà merito, e capitale. La qual somma s'eguaglia a 60 cos. di Scu. cioè a quello, che ha da pagar di fitto in 1. cos. d'Anno. Leuando mò li superflui, l'Equatione restarà 42 $\frac{3}{8}$ eguali a 57 $\frac{141}{160}$ cos. Capitolo primo semplice. La cosa val $\frac{2260}{1017}$. E tante parti d'vn Anno deue stare in Casa in risguardo a quei Scu. 42 $\frac{3}{8}$, e suo merito: le quali parti, per tirarle in giorni, si fà così. Si moltiplicano 365 giorni d'vn Anno per il Numeratore, & il Prodotto si parte per il Denominatore, e così il Quotiente sarà la quantità de giorni, contenuti in quel rotto (e sono questi) giorni 267, hor 5. min. 13 $\frac{9}{1017}$. Si conclude adunque che il Fittuario deue star in Casa Anni 3, Mesi 8, giorni 27, hor. 5, min. 13 $\frac{9}{1017}$.

Problema Decimottano.

Due fanno Compagnia. Il primo mette vna quantità di danari; & il secondo ne mette quattro tanti del primo.

mo. Guadagnano tanto per cento, quanto è il capitale, e guadagnano Scudi 800. Domando, quanto pose ciascun di loro nella compagnia?

Habbia posto il primo 1 cos. che l'altro haverà messo 4 cos. Siche frà tutti due haueranno 5 cos. di capitale. E perche guadagnano tanto per 100, quanto è il loro capitale. Adunque guadagnano 5 cos. per 100, e però si dice. Se 100 di capitale mi dà 100 più 5 cos. trà capitale, e guadagno. Che mi darà 5 cos. di capitale? Darà 5 cos. più $\frac{1}{4}$ quadrato trà capitale, e guadagno nel fine della compagnia, e queste 5 cos. più $\frac{1}{4}$ quadrati sono eguali a Scu. 800. Aggiustando l'Equatione, s'haueranno 20 cos. più 1 quadrato eguali a 3200. Capitolo primo composto. La cosa val ℞ 3300 men 10. Siche il primo pose nella compagnia Scudi ℞ 3300 men 10. e l'altro quattro tanti, cioè Scud. ℞ 52800 men 40.

Problema Decimonono.

Due fanno compagnia. Vno mette vna Gioia, e l'altro Scu. seicento, e guadagnano Scudi cinquecento. A quello della Gioia toccò trà capitale, e guadagno Scudi ottocento, & all'altro il resto. Domando, quanto valse la Gioia?

Vaglia 1. cos. di Scud. con li 600. del compagno s'haverà 1 cos. più 600. per capitale di tutti due, al quale aggiongendoui li Scud 500. del guadagno, arriuarà alla somma di 1 cos. più 1100. dalla qual somma leuando li Scu. 800, che toccarono a quello della Gioia, restarà 1 cos. più 300, trà capitale, e guadagno per l'altro compagno: e poi dico. Se a quello, che mette Scu. 600 di capitale, tocca 1 cos. più 300. trà capitale, e guadagno. Che toccarà a 1. cos. capitale di quello, che pose la Gioia? Operando li toccarà $\frac{1}{600}$ quad. più $\frac{1}{2}$ cos. trà capitale, e guadagno, eguale alli 800. Scudi, che da principio si dice toccarli. Eguagliando l'Equatione,

s'ha-

s'haverà 1. quad. più 300. cos. eguale a 480. 000. Cap. 1. composto. La cosa val R 502. 500 men 150. E tanto valse la Gioia, cioè Scudi R 502. 500, men 150.

Problema Vigesimo.

Quattro compagni fanno compagnia. Quanto ponesse ciascun di loro nel negotio, non lo sò: nè meno quanto guadagnassero. Sò bene, che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ del capitale de'due primi compagni era eguale ad $\frac{1}{7}$, e $\frac{1}{5}$ degli altri due compagni, e fra tutti quattro arriuarono alla terza parte del guadagno. Di più. Non sò quanto toccasse a ciascuno del guadagno, sò bene, ch' haueuano debiti l'vno con l' altro: e che il primo dando al secondo la terza parte del suo guadagno. Il secondo dando al terzo la quarta parte. Il terzo dando al quarto la quinta parte; & il quarto dando al primo la sesta parte del suo guadagno; dopo l'hauer dato, e riceuuto ciascuno (come sopra) restorno estinti tutti li debiti, e ciascuno si trouò con egual quantità di Scudi. Domando. Quanto guadagnorno frà tutti. Quanto toccò a ciascun di loro. Che debito haueuano frà essi. E quanto posero nella Compagnia li due primi compagni, e quanto gli altri due? (O che quesito capriccioso.)

Horsù. Sbrighiamoci presto. Al primo compagno sia toccato del guadagno 3. cos. Al secondo sia tocco vn numero *ad libitum*, diuisibile per 4 senza rompere l'Vnità (e sia 12) Se mò il secondo dà la quarta parte al terzo compagno, egli resta solamente con 9, e riceuendo dal primo compagno la sua terza parte, haverà poi il secondo compagno 1 cos. più 9 (e tanto douerianno hauere gli altri compagni.) Il primo, che s'è priuato d' $\frac{1}{3}$, è restato solamente con 2 cos Et acciò sia eguale al secondo, bisogna, che riceui dal quarto compagno 9 men 1. cos. (per il sesto, che li deue dare) ma se 9 men 1. cos. è la sesta parte del quarto compagno, tutto il suo guadagno

gno sarà 54 mẽ 6 cos. Per hauer mò dato la 6. par. al primo compagno, egli resta solamente cõ 45 men 5 cos. Si che per hauer 1 cos. più 9 (come hà il secondo cõpagno) bisogna, che riceui dal terzo compagno 6 cos. mẽ 36. (per la quinta parte, che li deue dare). Adunque tutto il guadagno del terzo cõpagno sarà 30 cos. men 180: ma per hauer dato vn quinto al quarto compagno, egli resta con 24 cos. men 144. E riceuendo dal secondo il suo quarto (cioè 3) hauerà poi 24 cos. men 141: ma perche doueria hauere ancor lui 1 cos. più 9 (come gli altri) adũque 24 cos. m 141. sarà eguale a 1 cos. più 9. Leuando li superflui; e ristorando li diminuti, l' Equatione sarà 23 cos. eguali a 150. Cap. 1. semplice. La cos. val $6\frac{12}{23}$.

Se la cos. val $6\frac{12}{23}$. Adunque al primo compagno toccò del guadagno $4\frac{156}{23}$. Al secondo $\frac{276}{23}$. Al terzo $36\frac{8}{23}$, & al quarto $\frac{342}{23}$. Ma per fuggir il rotto nel far l'esperienza, lasciamo da parte il Denominatore, e seruiamoci solamẽte de' Numeratori; perche li sottoscritti numeri indicaranno il guadagno di ciascuno compagno con le particolarità ricercate. E supponiamo, che siano Scudi.

Primo Compagno	450	Secondo Compagno	276
Vn terzo	150	Vn quarto	69
Resto	300	Resto	207
per $\frac{1}{6}$ del quar.	57	per vn $\frac{1}{7}$ del pri.	150
Primo	357	Secondo	357
Terzo Compagno	360	Quarto Compagno	342
Vn quinto	72	Vn sesto	57
Resto	288	Resto	285
per $\frac{1}{4}$ del secon.	69	per $\frac{1}{7}$ del terzo.	72
Terzo	357	Quarto	357

Ecco

Ecco verificato, chè dando, e riceuendo ciaſcuno come ſi propoſe, reſtano eguali. La ſomma di tutto il guadagno fù Scudi 1428 Per $\frac{1}{3}$ n'habbiamo 476, e tanto fù il capitale de' quattro Compagni. Volendo mò ſapere il capitale preciſo de' due primi compagni inſieme, e quello de gli altri due terzo, e quarto, biſogna fare di 476 due parti tali, che $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{2}$ d'vna ſia eguale ad $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{2}$ dell'altra; e tutte due inſieme facciano 476; Biſogna adunque, ò fare vna poſitione Algebratica doppia (come a car. 328. Auuiſo 5) Quero operando (& è meglio) come a car. 187. Queſ. 5. Iò hò fatto il calcolo, e trouo che li due primi compagni poſero nel negotio frà tutti due Scud. 183 $\frac{41}{77}$, e gli altri due Sc. 292 $\frac{36}{77}$. Fate voi la proua, ſe ltia coſi; che Io l'hò fatta, e ltà bene; perche $\frac{1}{3}$, & $\frac{1}{4}$ di 183 $\frac{1}{77}$ è tanto, quanto fà $\frac{1}{7}$, & $\frac{1}{8}$ di 292 $\frac{6}{77}$, e frà tutti due danno 476, &c.

Problema Vigeſimoprimo.

Trè fanno compagnia, Il primo mette Scudi 200, & vn Rubino. Il ſecondo mette Scudi 800, & vn Diamante di tal valore, che moltipliçando la ſua valuta con li Scud. 200 del primo, fà tanto, quanto fà a moltiplicare il Rubino del primo con li Scud. 800 del ſecondo. Et il terzo mette tanto, quanto è il Prodotto della moltiplicatione del Rubino nel Diamante, e guadagnano Scudi 2400; de' quali al primo toccarono Scudi 260. S'addimanda, quanti ne tocca a ciaſcuno de gli altri due compagni, quanto valeſſe il Rubino; e quanto poſe il terzo nella compagnia?

Vaglia il Rubino 1 coſ. di Scudo, qual moltiplicata con li Scud. 800. del ſecondo compagno fà 800. coſ. le quali diuiſe per li Scudi 200 del primo, di Quotiente ne viene 4 coſ. di Scudo, per il valore del Diamante. Moltiplicando mò queſto valore del Diamante col valore del Rubino, ne verrà 4 quadrato per tutto il valore,

che

che pose il terzo compagno nella compagnia. Fatto questo: s'vniscono insieme questi trè capitali, cioè, Scu 200, più 1 cos. del primo. Scudi 800. più 4 cos. del secondo; e Scudi 4. quadrato del terzo, che in tutto fanno Scud. 1000. più 5. cos. più 4. quadrati, e poi si dice Se Scudi 1000, più 5. cos. più 4 quadrati di capitale guadagnano Scud: 2400. Quanti ne toccarono a Scud. 200 più 1 cos. capitale del primo compagno? Operando li toccarà $\frac{480.000.\ \text{più}\ 2400.\text{cos.}}{1000.\text{più}\ 5\ \text{cos.p.}4.\ \text{qu.}}$ eguali a 260 (Scudi, che da principio si dice, che pur toccarono al primo.) Bisogna mò leuare il rotto, moltiplicando il Denominatore per 260 (estremo secondo dell'Equatione) e s'hauerà 480. 000 più 24000 cos. eguali a 260, 000, più 1300 cos. più 1040 quad. Leuando li superflui, e riducendo l'Equatione ad vn sol quadrato, s'hauerà finalmente 211 $\frac{7}{13}$ più 1 $\frac{3}{25}$ cos. Eguali ad 1 quadrato: Capitolo secondo composto. La cos. val ℞ 211 $\frac{5}{10}$. $\frac{833}{816}$ più $\frac{3}{104}$. E tanto valse il Rubino. Il Diamante valse quattro tanto, cioè Scudi ℞ 3384 $\frac{425}{676}$, più $\frac{3}{26}$, & il terzo pose nella compagnia il Prodotto del Rubino nel Diamante; cioè 4 quad. del valor della cos. che saranno Scudi 846 $\frac{217}{1352}$, più ℞ 11 $\frac{415}{1.827}$. $\frac{1}{5}$. $\frac{3}{4}$. Per saper mò quanto tocca di guadagno al secondo, & al terzo compagno: s'vniscono insieme li loro capitali, cioè Scudi 800 $\frac{3}{26}$, più R. 3384 $\frac{425}{676}$ del secondo, e Scudi 846 $\frac{217}{1352}$ più R 11 $\frac{415}{1.827}$. $\frac{137}{906}$ del terzo. La qual som fà Sc. 1646 $\frac{373}{1352}$, più R 3786 $\frac{788}{1.827}$ $\frac{681}{904}$. Di poi cauando dal guadagno li 260 Scudi, che toccarono al primo, ne restaranno 2140 per guadagno del secondo, e terzo compagno. Opera secondo la Regola delle compagnie, ch' hauerai l'intento, accompagnato con fatica grande, che volontieri la lascio a chi ne gusta.

Pro-

Problema Vigesimosecondo.

Trè fanno compagnia. Il primo mette vna quantità di Scudi. Il secondo ne mette 200 più del primo. Et il terzo mette 12 volte la radice di quello, che posero gli altri due insieme, e 60 di più. Guadagnano Scudi 840, de' quali ne toccò al primo 140. Domando. Quanto toccò separatamente a gli altri due compagni; e quanto pose ciascun di loro nella compagnia?

Per fuggir rotti, trà il primo, & il secondo habbiano posto nella compagnia 1. qu. di Scudo per capitale, del quale se ne facciano due parti tali, che vna sia 200 più dell'altra, così. Cauiamo 200 da 1. qu. e resterà 1 qu. men 200. Questo residuo partito per metà, ne viene $\frac{1}{2}$ qu. men 100 per capitale del primo compagno, sopra il quale aggiongendoui li Scud. 200, che pose di più il secondo, s'haurà per suo capitale $\frac{1}{2}$ qu. più 100. E perche la R. d'vn qu. è 1. cos. ne siegue, che il terzo compagno metterà nella compagnia 12 cos. più 60 Fatto questo: s'vniscono insieme li capitali, e poi si dice. Se 1 qu. più 12 cos. più 60. (capitale di tutti trè,) guadagnano Scu. 480. Quanti ne toccano ad 1 qu. men 100, capitale del primo? Operando gli toccano Scudi $\frac{240 \text{ qu. men } 48.000.}{1 \text{ qu. più } 12. \text{cos. più } 60.}$ Eguali a Scudi 140, che nella propositione si dice, che li toccò.

Leuato il rotto, col moltiplicar il suo Denominatore per 140, s' haurà poi 240 qu. men 48. 000, eguali a 140 qu. più 1680. cos. più 8400. Leuando poscia li superflui. Ristorando, e riducendo l'Equatione ad vn sol quadrato, s'haurà finalmente 1. quad. eguale 564, più $16\frac{4}{7}$ cos Capit. 2. composto. La cosa val R. 634 $\frac{14}{28}$ più 8 25. Ma perche la positione fù fatta sopra 1. qu. bisogna quadrare la valuta della cos. e s' haurà 705 $\frac{3}{28}$ più R. 179. 098, $\frac{134}{784}$. Finalmente con questo quadrato

s'opera, come s' operò col quadrato della positione: cioè, si leuano Scud. 200. Il resto si parte per metà, qual metà sarà Scud. 252 $\frac{14}{21}$ più R. 44. 776 $\frac{346}{621}$. E tanto pose nella compagnia il primo compagno. Il secondo cõpagno ne pose 200 di più, cioè 452 $\frac{14}{21}$ più R. 44. 774. $\frac{346}{621}$. E perche il terzo compagno pose nella compagnia 12 volte la radice di quello, che posero gli altri due insieme, e 60 di più; però basta a moltiplicare per 12 la valuta della cosa, & al Prodotto aggiongerui 60. Il che facendo il terzo compagno pose nella compagnia Scud. R. 91. 376. $\frac{16}{21}$ più 160 $\frac{4}{7}$. Per far mò la proua, s'vniscono insieme il capitale di tutti trè: e poi per la Regola delle compagnie operando, si vedrà quanto tocchi a ciascun di loro. Al primo deue toccare Scud. 140, come si disse da principio: a gli altri due 480 men 140 del primo. Notisi, che la somma del capitale de' due primi compagni è il quadrato della cosa che vnito col capitale del terzo, fà in tutto Scud. 865 $\frac{3}{21}$ più R. 526. 329 $\frac{279}{621}$. Il resto non porta se non fatica.

Problema Vigesimoterzo.



Sia il Triangolo a b c, e sopra la base b c longa 14 si riposi vn Circolo, il cui diametro sia 8, & il punto del contatto d, sia lontano da b sei. S'addimanda, la quantità degli altri due lati, e l'aria superficiale d'esso Triangolo. Primie-

mieramente dal centro del Circolo a ciascun punto del contatto d e f se si tira vna linea, quella sarà perpendicolare al suo lato, e lo diuide in due parti: con che restano i lati egualmente diuisi a due, a due. Si che la b e sarà eguale alla b d. La f c sarà eguale alla c d. E la a e sarà parimente eguale alla a f come sensibilmẽte si vede. Ma perche queste due vltime sono incognite a e, & a f. Supponiamo, che ciascuna di loro, per esser eguali, sia 1 cos. Laonde il lato a b sarà 6, più 1. cos. & il lato a c sarà 8, più 1 cos. Fatto questo bisogna trouare sopra la base il punto, oue cade la perpendicolare, così. S'vniscono insieme li quadrati della base, e d'vn lato, qual piace. Dalla sõma si caua il quadrato dell'altro lato & il resto partendolo per il doppio della base, (linealmente intesa,) il Quotiente sarà la distanza del sudetto punto: cominciando a contare da quel lato, che si quadrò, e s'vnì col quad. della base. Io mi seruo del lato a b. Il cui quadr. è 36, più 1 qu. più 12 cos. Il quad. della base è 196, e quello dell'altro lato sarà 64, più 1. qu. più 16. cos. Operando giustamente (come hò detto di sopra,) per la distanza b. ò (parte minore della base) s' hauerà 6 men $\frac{1}{7}$ cos. qual si conserua da banda.

Per hauer l'aria superficiale del Triangolo s' vniscono insieme li 3. lati: e la metà, che sarà 14 più 1. cos. moltiplicata per la metà del diametro del Cerchio, darà 56 più 4 cos. per la cercata quantità. E perche a molt. p. tutta la perpendic. per la metà della base, s'hà parimente la superficie del Triangolo: ne siegue, che partendo 56 più 4 cos. per 7. (metà della base) s'hauerà 8 più $\frac{4}{7}$ cos. per la quantità della perpendicolare. Cauando mò al solito il quad. della perpẽdicolare, che sarà 64 più $\frac{16}{49}$ quad. più 9 $\frac{1}{7}$ cos. dal quad. del lato minore a b: cioè da 36 più 1 qu. più 12 cos. restarà $\frac{33}{49}$ quad. più 2 $\frac{6}{7}$ cos. men 28, per il qu. della parte minore della base: qual residuo sarà eguale al

quad.d'essa parte minore, cioè al qu. di quel 6 mẽ $\frac{1}{7}$ cos. che da parte si serbò. Adunque habbiamo $\frac{33}{49}$ qu. più $2\frac{6}{7}$ cos. mẽ 28 eguali a 36 più $\frac{1}{49}$ quad. men $1\frac{5}{7}$ cos. Leuando li superflui. Ristorãdo, & aggiustata l'Equatione s'haueràn 1 qu. più 7. cos. eguali a 98. Cap. 1. cõp. La cosa val 7.

Si conclude, che il lato a b sarà 13. Il lato a c sarà 15. La parte minore della base sarà 5. La perpendicolare sarà 12: e la superficie sarà 84. Qui notisi, che nel quadrare questi Binomij, il doppio d'vn nome nell'altro non si moltiplica per 4, ma per 2 semplicemente: perche la cos. è il numero della R. ne' Binomij communi: che per esser incognito in quelli, si quadra il 2.

Problema Vigesimoquarto.



Sia ancora il Triãgolo a b c, e sia la base 8. Il contatto f lontano da b solamente 2, & il diametro del Circolo sia R 30 $\frac{6}{11}$. S'addimãda la quãtità de lati incogniti, superfic. &c. Come nella passata.

Disponendo il Circolo, come nella precedente propositione, il lato a b sarà 2 più 1 cos. & il lato a c sarà 6 più 1 cos. Ma perche la metà del diamet. del Cerchio è maggiore della parte minore della base, diuisa dal contatto del Circolo in f, ne siegue: che l'angolo b, sarà ottuso, e la perpendicolare caderà fuori della base. Per trouare il punto di tal cadimento, ò perpendicol. si fà così. Dal quadr. dell'ipotenusa a c che sarà 36 più 1. qu. più 12 cos. cauando la sõma de quad. de gli altri due lati, restaranno 8. cos. mẽ 32; qual residuo diuiso per il doppio della base, cioè per 16. di Quot. ne verrà $\frac{1}{2}$

cos.

cos.mẽ 2. E però tanto lontano dal pũto b, cade la perpendic. e sarà la distanza b.o. Per trouar mò la superficie, la quantità della perpendic. & il resto fino al fine dell'operatione s'opera come nella precedente. La metà della somma de lati è 8 più 1 cos. qual Binomio quadrato, e moltiplicato per Rx. $7\frac{7}{11}$, (metà del diametro del Cerchio,) ne verrà Rx V.($488\frac{8}{11}$ più $7\frac{7}{11}$ quad. più $122\frac{2}{11}$ cos. per la superficie del Triangolo, qual Prodotto diuiso per 4, (metà della base) darà di Quotiente Rx V.($30\frac{6}{11}$ più $\frac{21}{44}$ quad. più $7\frac{7}{11}$ cos. per la quantità della perpendicolare, a. o. Cauando mò il qu. di questa perpendicolare, (che si fà depenando solamente quel Rx V.) del quadrato della a.b. cioè da 4 più 1 quad. più 1 cos. restarà $\frac{23}{44}$ quad. men $3\frac{7}{11}$ cos. men $26\frac{6}{11}$, per il quad. della linea o.b. quale per l'altro modo fù trouata esser $\frac{1}{2}$ cos. men 2. Adunque $\frac{23}{44}$ quad men $3\frac{7}{11}$ cos. men $26\frac{6}{11}$, sarà eguale al qu. di $\frac{1}{2}$ cos. men 2, qual quad. è $\frac{1}{4}$ quad. Più 4, men 2 cos. Aggiustando l'Equatione, s'hauerà finalmente 1 quad. eguale a 112 più 6 cos. Capitolo secondo composto. La cosa val 14. Siche la linea a.b. sarà 16. La a.c. sarà 20, e la parte di esse incognita sarà 14.

Propositione Vigesimaquinta.



Se la metà del diametro del Cerchio sarà eguale ad vna parte della base del Triangolo, tal Triangolo sarà retto: come si vede in figura. Il diametro del Cerchio è 10. Il punto del cõtatto lontano da b, è 5, & il resto della base 15. Siche la linea a. b. è 5, più 1 cos. e la a. c. è 15, più 1 cos. E perche ne' Triangoli retti

l'hipotenusa è potente quanto posſono gli altri due lati insieme: però vnendo insieme li quad. della base, e della perpendicolare, s'haverà 425, più 1 quad. più 10 cos. eguali al quad. dell'hipotenusa a c., cioè à 225, più 1 quad. più 30 cos. Aggiustando l'Equatione, s'haverà 200. eguale a 20. cos Cap. 1. semplice. La cosa val 10. Si che la linea a. b. sarà 15, e la a. c. sarà 25.

Nota.

DA questo quesito se ne cauano queste trè vtilità. La prima è che si posſono trouare quanti Triangoli Ortogonij ne piace, che haverâno tutti trè i lati rationali in longhezza, senza obligarsi alla proportione d'vno, ch'habbia 3.4.e 5. ne'suoi lati. La seconda vtilità è: che sempre si posſono trouare due numeri, che li loro quadrati gionti insieme, facciano numero quadrato. e la terza vtilità è: che sempre si posſono trouare due numeri differenti l'vn dall'altro per quante Vnità piace, che sottratto il quadrato d'vno dal quadrato dell'altro, il restante sarà parimente numero quadrato. Alla pratica.



Voglio trouare due numeri, che l'vno sia differente dall'altro per vna sola Vnità, e che levando il quadrato d'vno dal quadrato dell'altro, il restante sia pur numero quadrato.

Questo numero sia 11, significato per la base b.c. divisa in 5. e 6. in punto e. Il lato a.b. per la precedente sarà 5 p. 1 cos. & il lato a.c. sarà 6 p. 1 cos. La sóma de quad. della a.b.e della b.c. sarà 146. p. 1 quad.

p. 10

p. 10 cos. eguali a 36 più 1 quadrato. più 12 cos. (quadrato della hipotenusa a.c.) Aggiustando l'Equatione La cos. val 55. Si che la a.b. sarà 60. E la a.c. sarà 61. Siche habbiamo trouato due numeri differenti l'vno dall'altro per vna sola Vnità; e leuando il quad. di 60 dal quad. di 61, restarà 121; pur numero quad. la R. del quale è la linea b.c. cioè 11. di più si è formato vn Triangolo retto, di lati rationali in longhezza, e si sono trouati due numeri, che il oro quad. gionti insieme, fanno pur numero quad. e questi sono i lati a. b. & b.e. cioè il 60, e l'11; perche 3600. gionto con 121, fà 3721, numero quad. la cui R. è 71 (lato a.c.) e sempre riuscirà. Vero è, che bisognarà supporre la base b c. alcune volte paro, e altre volte dispari, secondo l'opportunità delle Vnità, che deue esser differente vn numero dall'altro.

Problema Vigesimosesto.



Sia questo Triangolo Orthogonio a b.c. La somma di tutti trè li suoi lati fanno 60. Di più. Moltiplicãdo insieme li due lati a.b. & a.c. concorrenti all'angolo retto a. & il Prodotto moltiplicato di nuouo per la perpendicolare a. d. questo secondo Prodotto si troua esser eguale al quadrato della somma di tutti trè li lati, che per esser 60. il suo quad. sarà 3600. S'addimanda la quantità di ciascun lato separatamente. La quantità della perpendicolare, e della superficie.

La linea retta b. a. c. diuisa in punto a. rappresenta li

due lati del Triandolo a.b.& a.c.vniti insieme, e distesi per il longo. Hora mò, deuesi sapere, che li quadrati di ciascuna parte di questa linea vniti insieme con il doppio d'vna parte nell'altra, è sempre eguale al quadrato di tutta essa linea Eucl lib.2.prop.4. Di più, il Prodotto di quei due lati, che formano l'angolo retto a, è sempre doppio alla superficie di tutto il Triangolo. Adunque il doppio della b.a. nella a.c. sarà quadruplo alla superficie. Et in oltre il quad. di tutta la linea composta b.a.c. sarà eguale al quadrato dell'hipotenusa b.c. & quadrupla alla superficie. *His præmissis*. A noi.

L'hipotenusa b c.sia 1 col. gli altri due lati di necessità saranno 60 men 1 cos. Il quadrato de quali sarà 3600, più 1 qu.men 120 cos eguale al quadrato della base b. c. & a quattro volte la superficie del Triangolo: ouero ad 1 quad. più due volte il Prodotto della b. a nella a. c. Adunque leuando 1 quad. della base da 3600, più 1 quad men 120 cos.restarà 3600 men 120 cos.per il quadruplo della superficie: ouero per il doppio della b. a. nella a.c. Ma perche diuidendo la superficie per la metà della base: ouero la metà della superficie per tutta la base, ne viene la perpendicolare: ne siegue, che diuidēdo 1800 men 60. cos. (metà della superficie) per 1.cos. (Base del Triangolo) ne verrà $\frac{1800 \text{ men } 60 \text{ cos}}{1 \text{ cos}}$ per la quantità della perpēdicolare a.d. Moltiplicādo mò questa perpēdicolare cō 1800 mē 60 cos. (che per esser la metà del quadruplo della superficie, vien parimente ad esser vna sol volta la moltiplicatione della b.a nella a.c.) s'haverà $\frac{3240.000 \text{ p. } 3600 \text{ quad. men } 216\ 000. \text{ cos.}}{1 \text{ cos}}$ Eguale al quadrato di tutti i lati insieme: cioè a 3600. Leuando il rotto, s'haverà 3600 cos.eguali a 3240.000 più 3600 quad. men 216. 000 cos. Finalmente aggiustando l'

Equa-

Equatione; s'haverà 900. più 1 quad. eguali a 61 col. Capitolo terzo composto, La cosa val 25. (La B finale qui si sottra dalla metà del numero delle cos. perche aggiongendola, non fà a proposito) Adunque il lato b.c. farà 25. per esser supposto 1 cos. gli altri due lati insieme saranno 35, cioè 60. men. 1. col. Cauando mò il quadrato di 25 dal quadrato di 35, restarà 600, per il doppio della a.b. nella a c. & 300. farà vn sol Prodotto. Finalmente facciasi di 35 due parti tali, che moltiplicando vna per l'altra, faccia 300, e s'haurà notitia spetiale delli due lati a.b. & a.c. Vno de quali è 15, l'altro 20. Il resto è facile, la superficie è 150, e la perpendicolare è 12.

Notabile.

Ma perche sin qui non s'è insegnato la Regola di diuidere vna quantità in due parti conditionati, adesso la insegno. E per star nel caso nostro, prima si parte per mezo il 35. che sarà 17 $\frac{1}{2}$; questa metà si quadra, il cui quadrato è 306 $\frac{1}{4}$. Da questo quad. si caua il numero, che deue far il Prodotto delle due parti (cioè 300 nel caso nostro,) e restarà 6 $\frac{1}{4}$. Finalmente aggiongendo a 17 $\frac{1}{2}$ la R di 6 $\frac{1}{4}$ (cioè 2 $\frac{1}{2}$) s'haverà 20 per il lato maggior a, c. e leuando pur da 17 $\frac{1}{2}$ l'istessa R s'haurà 15 per l'altro lato. E così di 35 habbiamo fatto due parti, che moltiplicando vna per l'altra, fa 300, e questi sono il 15, & il 20.

Problema Vigesimosettimo.

60

a ——————————— b

Sia la linea a.b. piedi 60. Io ricerco, che di essa mi sia fatto vn Triangolo retto di maggior superficie, che sia possibile. S'addimanda. Quanti piedi sarà ciascun lato di esso?

Prima d'ogni cosa bisogna sapere: che, se vna linea retta sarà diuisa in due parti eguali, & in altre due parti ineguali, la somma de quadrati delle parti ineguali, sa-

rà

rà sempre maggiore, che non è la somma de quad. delle due parti eguali. Ma la superficie d'vna parte nell'altra sarà minore. E tanto più, quanto maggiore sarà l'inegualità. Siche la maggior superficie, che possi hauere vn Triangolo retto, e quando che i lati concorrenti all'angolo retto, sono eguali Eucl. lib. 2. prop. 5. & lib. 10, prop. 41. antecedente 1. *His intellectis*. Il lato opposto all'angolo retto, cioè l'hipotenusa sia 1. cos di necessità gli altri due lati insieme saranno 60, men 1 col. Siche ciascun lato concorrente all'angolo retto, sarà 30, men $\frac{1}{2}$ cos. & i loro quad vniti insieme saranno 1800. più $\frac{1}{3}$ qu. men 60. eguali al qu. dell'hipotenusa cioè ad 1. quad. Aggiustádo l'Equatione, s'haurà 3600, eguali a 1 quad. più 120 cos. Capitolo primo composto. La cos. val Rx 7. 200 men 60 E tanto sarà appunto l'hipotenusa: gli altri due lati insieme, il resto fino a 60, cioè 120 m Rx 7. 200. Ma perche questi due lati sono supposti eguali l'vno all'altro, ciascun di loro sarà 60, men Rx 1800. quali moltiplicati insieme danno 5400. men Rx 25. 920. 000. per il doppio della superficie. Siche la metà sarà la superficie d'vn Triangolo retto, formato della linea proposta, con le condicioni sudette, cioè 2700. men Rx 6. 480. 000 E per la più prossima verità per numero saria piedi $154\frac{743}{1012}$.

Problema Vigesimottauo.



Sia il Triangolo a. b. c. di lati proportionali in proportion sesquialtera. La sua aria superficiale sia 175. Quanto sarà ciascun lato precisamente?

Per suggir rotti, più che sia possibile, il minor

nor lato sia 8. cos. Il medio sia 12 cos. & il maggiore sia 18 cos. Qui s'opera, come si fà per trouare l'aria senza la perpendicolare, così. S'vniscono insieme i lati. La somma si parte per mezo. Dalla metà si caua ciascun lato, e restarà 11 cos. 7 cos. & 1 cos. Dipoi questi residui si moltiplicano per la metà, (come si vede,) hauendo l'occhio all'ascendenza delle dignità nelle moltiplicationi: perche nell'vltimo Prodotto s'hauerà 1463. qu qua. E così la radice di questo numero sarà l'aria superficiale, eguale all'aria del triangolo: come in figura si vede.

Lato min. 8.cos.	Metà delle cos.19	Prodotti
Lato med.12.cos.	Residui 11.cos.	19 cos.
Lato mag.18.cos.	7.cos.	11 cos.
	1.cos.	
26. de lati 38.cos.		209 Q.1. Prod.
Metà delle cos.19		7 cos.
		1463 cub.2.Prod.
		1 cos.

Vltimo Prod. La ℞ di 1463. Quad. Quad.

Siche la ℞ di 1463 qu.qu. sarà eguale a 175 Leuando la radice dall'Equatione, col quadrare l'vno, e l'altro estremo: s'haueranno poi 1463 qu.qu. eguali a 30.625. Capitolo secondo semplice. Partendo il numero per li qu. quad. ne verrà $20\frac{195}{209}$ per la valuta d'vn sol quad. di quad. della qual valuta pigliandone la ℞ di ℞; quella sarà la valuta della cosa. Mà perche quel $20\frac{195}{209}$ non è rationale nella sua ℞ di ℞ ne siegue, che la valuta della cos. (nel caso nostro) sarà la ℞℞ di $20\frac{195}{209}$, quale moltiplicata per 8, per 12, e per 18. s'haueranno li trè lati del Triangolo, come siegue, Lato minore ℞℞ $85.741\frac{131}{209}$. Lato medio ℞℞ $434.066\frac{30}{209}$, Lato maggiore ℞℞ $2.197.464.\frac{24}{209}$

Pro-

Problema Vigesimonono.



Si propone il Triangolo equilatero a.b.c. La sua superficie è eguale al numero, che denomina ciascun lato di esso. S'addimanda la quantità d' essa superficie, e di ciascun lato.

Li due lati a.b. & a.c. per esser eguali sia ciascun di loro 1 cos e ciascuna parte della base, diuisa dalla perpendicolare, sarà $\frac{1}{2}$ cos. Leuando il quad. d' $\frac{1}{2}$ cos. del quad. d'vn lato, restaranno $\frac{3}{4}$ quad. per il quad. della perpendicolare a.d. Sicheessa perpendicolare sarà R $\frac{3}{4}$ quad. Moltiplicando mò $\frac{3}{4}$ quad. della perpendicolare con $\frac{1}{2}$ cos. (prima quadrata, cioè per $\frac{1}{4}$ qu.) ne verrà $\frac{3}{16}$ quad. quad. per la superficie. Adunque la R R $\frac{3}{16}$ quad. quad. dal presupposto sarà eguale ad 1 cos. (Quantità de lati.) Leuando la radice dall'Equatione, col moltiplicare in sè stesso ciascun estremo, s' haurà $\frac{3}{16}$ quad. eguali ad 1 quad. finalmente degradando, ò schifando quest'vltima Equatione, (per non esserui il numero) ne verrà $\frac{3}{16}$ quad. eguali ad 1 per numero. Capitolo secondo semplice. La cosa val R 5 $\frac{1}{3}$. e tanto è la superficie, e ciascun lato del Triangolo.

Problema Trigesimo.



Si propone vn pezzo d'Argine longo Piedi 50. Largo nella sua base 32. Nella sommità largo 20: e perpendicolarmente alto piedi 10 Voglio, che sopra quest' Argine vi si distendino 280 piedi cubi di Terra. Domando. Quanto s'alzarà detto Argine, e quanto restarà largo di sopra: mantenendo gl'istessi angoli, ò scarpa?

Questo quesito non è stato proposto nè dal Tartaglia (come alcuni si pensano) nè da altro Autore, ch'io sappia: ma ben sì da vn mio amico me ne fù proposto vn simile, col darsi a credere, che fosse irregolare, nè si potesse risoluere. Questo quesito lo potrei risoluere per Algebra: mà, per esser inteso anco da mediocri intelligenti, lo voglio soluere in poche parole, come siegue per via di semplici proportioni. Ma notate. Certo è, che quella Terra, aggiustata che sia al suo luogo, da sè sola forma vn corpo simile al proposto Argine: e per conseguenza saranno frà loro proportionali. A noi.

La settione, ò testa dell' Argine forma vn Capo tagliato doppio a b c d, e slongando le due linee pendenti a c, & b d si formaria il Triangolo i c d. Hora mò. La proportione, che hà la base g d alla perpendicolare b g del Triangoletto g b d quella medesima hà la base h d, alla perpendicolare i h del Triangolo h i d. Si che per sapere la quantità d'essa perpendicolare i h dirò. Se 6 di base hà 10 di perpendicolare. Quanto di perpendicolare hauerà 16 di base? (Cioè la h d.) Hauerà piedi 26 $\frac{2}{3}$, da'quali leuati li piedi 10 (altezza dell'Argine) la i o sarà piedi 16 $\frac{2}{3}$.

Fatto questo. Si troua la superficie del Triangolo i a b, moltiplicando la perpendicolare i o, per la metà della base a b cioè per 10, la qual superficie è piedi 166 $\frac{2}{3}$.

Di più. Da questi piedi 166 $\frac{2}{3}$ bisogna cauare la settione, ò testa, che darà la proposta Terra d'aggiongersi: la qual testa è di piedi 5 $\frac{3}{5}$, e si troua col partire la pro-

po-

posta Terra, (cioè 280) per la longhezza del proposto Argine. Siche il Triangolo i p q. restarà di superficie piedi 161 $\frac{1}{17}$, e la sua base p. q. sarà la larghezza superiore dell'Argine, dopo l'hauerui aggionto la proposta Terra. Per saper mò la quantità di questa larghezza superiore. Attenti.

Eucl. lib. 6. prop. 2. dice. Se vna linea retta segarà li due lati d'vn Triangolo, e restara paralella, & equidistante all'altro lato: di necessità li due lati segati restaranno diuisi proportionalmente: e per la 6 pur del sesto li due Triangoli, fatti campeggiare da tal linea, saranno simili. Adunque li due Triangoli i a b, & i p q, sono simili. Di più. La proportione di due figure superficiali simili (quali si siano) è come la proportione del quad. di qualsiuoglia lato d'vna, al quadrato del lato relatiuo dell'altra: e però per trouare la quantità della linea p. q (larghezza superiore dell'Argine) dirò, Se piedi superficiali 166 $\frac{2}{3}$ del Triangolo i a b hanno 400 per quadratura della base a b. Quanta quadratura daranno piedi 161 $\frac{1}{17}$ del Triangolo i p q. per la base p q. Operando, la linea p q sarà longa piedi la R. di 386 $\frac{14}{27}$. Adunque l'Argine restarà largo di sopra piedi R. 386 $\frac{14}{27}$. Per saper mò quanto s'alzarà, è facile, a chi sà maneggiare le quantità sorde. Al solito s'vniscono insieme le due linee a b, & p q, la cui somma fà 20 più R. 386 $\frac{14}{27}$. Di questa somma pigliandone la metà, hauerò 10 più R. 96 $\frac{16}{27}$, e questa metà sarà il lato d'vna superficie rettangola, eguale alla superficie a b p q. Per hauer mò l'altro lato concorrente a detta superficie rettangola, basta a partire la superficie piedi 5 $\frac{1}{3}$ per 10 più R. 96 $\frac{6}{27}$ (lato cognito) perche il Quotiente sarà il cercato lato, & insieme l'altezza cercata. Io hò fatto il calcolo, e trouo, che l'Argine s'alzarà piedi 16 $\frac{2}{3}$ men R. 268 $\frac{4}{27}$, cioè men la i.r. (Qui ricordareui della Regola in-

insegnata a cart. 273, per diuidere vna quantità per Binomio, ò Residuo.) Aggiongendo mò alla trouata altezza l'altezza del proposto Argine: l'Argine con l'aggionta della proposta Terra sarà alto piedi 26 $\frac{2}{3}$ men R. 268 $\frac{4}{9}$. Nella base largo piedi 32, come prima, e di sopra piedi 386 $\frac{14}{25}$.

Il proposto Argine hà piedi cubi 13000. e con li piedi 280 d'aggiongersi 13280. O misuramo il nostro Argine composto: per vedere, se l'operatione sia buona. La somma della base con la sommità è piedi 32 più R. 386 $\frac{14}{25}$ La metà di questa somma è piedi 16 più R 95 $\frac{16}{25}$. Questa metà (al solito) si moltiplica per l'altezza, cioè con piedi 26 $\frac{2}{3}$ men R 268 $\frac{4}{9}$. Da questa moltiplicatione ne vengono questi 4 Prodotti. *Piedi* 426 $\frac{2}{3}$. *Più* R. 68. 721 $\frac{7}{9}$. Men R. 68 721 $\frac{7}{9}$. Men R. 25. 942 $\frac{96}{324}$. Il secondo, & il terzo Prodotto, per esser eguali, e di contraria denominatione si distruggono l'vn l'altro, e resta 0. Il terzo Prodotto è rationale, e la sua radice è 161 $\frac{1}{15}$ per numero da cauarsi dal 426 $\frac{2}{3}$; il che fatto; restano piedi 265 $\frac{3}{5}$ per l'aria superficiale della testa del nostro Argine composto. Finalmente moltiplicando questa superficie 265 $\frac{3}{5}$ per la longhezza (dico per 50) ne verranno piedi cub. 13. 280. Adunque l'operatione è buona: & ottimamente s'è risoluto il quesito.

Ma notate. Dalla moltiplicatione de' due nomi rationali, bastaria l'hauer cauato la superficie del Triangolo i p q, qual è pur piedi 161 $\frac{1}{15}$ con che si sparagna il resto della faticosa operatione. A chi non sà maneggiare le quantità irrationali, sò, che il mio parlare parerà Hebraico. Ma io non ci hò colpa,

Soli Deo, honor, & gloria in secula. Amen.

IL FINE.

AG-

AGGIONTA.

Pag. 26. La proua del Moltiplicare, e del partire de' rotti per la Regola del 9 qui metto più chiara: benche in sostanza quella sia la medesima, che questa.

Ma se la proua sarà di sani, e rotti si conuerte il numero sano nella natura del suo rotto: al quale gionto l'istesso rotto, dalla somma si caua poi la proua, come s'è detto de' rotti soli. Per esempio. Habbiasi da prouare $16\frac{15}{22}$. Operando, come sopra, s'haueranno $\frac{367}{22}$. Cauando mò la proua dal Numeratore, e dal Denominatore ne vengono $\frac{7}{4}$. Si che la proua di $16\frac{15}{22}$ è $\frac{7}{4}$. Si può anco cauar prima la proua da ciascuno de' trè numeri, e poi operare, come sopra. La proua del numero sano è 7. La proua del Numeratore è 6. e quella del Denominatore è 4; le quali proue stariano così $7\frac{6}{4}$. Operando, come sopra haueremo $\frac{7}{4}$, la cui proua è pur $\frac{7}{4}$, come per l'altro modo: ma questo secondo riesce più comodo, e particolarmente quando il numero sano, e rotto fosse d'assai figure.

Più abbasso.

Esempio d'vn partire. A partire per $3\frac{1}{4}$ questo $18\frac{1}{2}$ di Quotiente ne viene $5\frac{9}{13}$ (schisati) La proua del Diuisore $3\frac{1}{4}$ è $\frac{4}{4}$. La proua del Quotiente è $\frac{2}{4}$, cioè $\frac{1}{2}$ le quali proue moltiplicate insieme, producono $\frac{4}{8}$ la cui proua è $\frac{1}{2}$. E perche la proua del numero partito $18\frac{1}{2}$ è pur lei ancora $\frac{1}{2}$ però stà bene. Fà vn altra proua. Moltiplica in croce li $\frac{4}{8}$ con $\frac{1}{2}$, e ne verranno $\frac{8}{16}$, & $\frac{8}{16}$ le cui proue sono $\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{2}$ però &c.

Pag. 37. Perche causa il moltiplicare de'rotti cali, &c.

Oltre a quello, che iui hò detto, aggiongo, che il moltiplicare de' rotti realmente cresce nel Prodotto:

& il partire cala nel Quotiente con quella proportione, & ordine che cresce, ò cala il moltiplicare, & il partire de' numeri sani: non in moltitudine d'Vnità; ma secondo la natura della quantità continua; cioè cresce nella moltitudine delle sue parti. Per esempio. A moltiplicare 3. con 4 produce 12 si che quella quantità discreta, che contiene in sè 3. Vnità, moltiplicata con l'altra quantità, che ne contiene 4, produce vn altra quantità maggiore di ciascuna di esse, che contiene 12. Vnità. Hora mò. Siano diuise due quantità continue; cioè due tutti: vno in tré parti eguali, e l'altro in quattro; dico che moltiplicando $\frac{1}{3}$ d' vno con $\frac{1}{4}$ dell' altro produrrà $\frac{1}{12}$, cioè darà nel Prodotto vn tutto, diuiso in 12 parti. Adunque il moltiplicar de' rotti cresce secondo la sua natura a quel passo, che cresce il moltiplicar de' sani.

Mi direte. Adunque moltiplicando $\frac{1}{3}$ di Scud. con $\frac{1}{4}$ di Scud. produrrà $\frac{1}{12}$ di Scud. Così è. Ma se mi direte $\frac{1}{3}$ di Scud. da Lir. 5. contiene den 400. Vn quarto 300, e $\frac{1}{12}$ solamente 100. come si può dire, che il Prodotto cresce? Rispondo, che sete vscito di strada: dal continuo passate al discreto; poiche quei den. 400. quei 300, e quei 100. sono tanti tutti, ciascun di loro diuisibili in infinito; però l'obiettione non è buona; e sappiate, che mai, mai verrà calo pratico di negotio d'hauer a moltiplicar rotto solamente; ma sempre li seguirà il partire, che risarcisse quanto par, che si perdi nel moltiplicare. Per esempio. $\frac{1}{4}$ di Scud, mi guadagna $\frac{1}{20}$ di Scud. Quanto mi guadagnaranno $\frac{1}{12}$ di Scu.? Moltiplicando $\frac{1}{20}$ con $\frac{1}{12}$ ne viene solamente $\frac{1}{24}$, ma partendosi secondo la Regola $\frac{1}{24}$ per $\frac{1}{4}$ di Quotiente mi viene $\frac{1}{2}$ di Scud. cioè den. 200. per il cercato guadagno degli $\frac{1}{2}$ di Scud. Adesso si mi contento, che ne facciate la proua in quantità discreta, come siegue, $\frac{1}{4}$ di Scud. contiene den. 300. Vn

ven-

ventesimo den. 60, e $\frac{10}{12}$ den. 1000. Dite mò, Se den. 300. ne guadagnano 60. Quanti ne guadagnaranno den. 1000? Operando, ne guadagnaranno 200. che a punto constituiscono $\frac{1}{6}$ di Scudo. Se poi di capriccio si propone il sol moltiplicar d'vn rotto, seriamente si può rispondere, secondo la valuta, ò natura del Prodotto. Questo fondamento è anco proportionato, per difendere, che il Partire de' rotti cala nel Quotiente.

Pag. 102. Addimando a quei, che sono di contraria opinione, &c.

Iui hò detto, che non doueria dar cosa alcuna. Questo è vero secondo il parere di quei, che nel scontare vogliono, che 100. restino il primo Anno 90. Il secondo 80. Il terzo 70, &c. Si come nel meritare 100. diuentano 110. in capo al primo Anno, 120. in capo al secondo, 130. in capo al terzo, &c. mà questo è gran sciocaggine: perche nel meritare il capitale resta sempre intiero, che nel scontare sempre si scema d'Anno in Anno; però non possono scontarsi egualmente ogni Anno 10 Scud.

Altri vogliono, che in capo al primo Anno li Scud. 100. restino 90. Per il secondo dicono, Se 100. resta 90. Che restarà 90? Restarà 81. Per il terzo Anno dicono. Se 100. resta 90. Che restarà 81? Restarà 72 $\frac{9}{10}$, e così con quest'ordine operariano sino al decimo Anno. Il calcolo di questi è buono: ma perche il scontare non hà la medesima proportione, che hà il meritare, in ciò si scorge il suo errore: e si conferma la fedeltà della Regola antica, &c.

Pag. 161. Il Quesito Vndecimo s' habbia come non proposto, e s'intendi, come siegue.

Quesito Vndecimo.

Vno si troua hauere onc. 10. d' Oro da 16 & onc. 6.

da 20. Volendolo abbassare, e ridurlo à finezza da 18. Quanto Argento, ò Rame ci vorrà?

Moltiplica ciascun peso con la sua finezza, & haurai questi due Prodotti, ò forze 160, e 120. quali vniti insieme, fanno 280, e poi dirai. Se carati 18. (finezza, che pretendi) vogliono onc. 1. d'Oro legato. Quanto ne vorrà il compolto 280? Operando, ne vorrà onc. $15\frac{5}{9}$. Ma perche questo Quotiente non arriua a 16 (somma del peso de' due propolti Ori) non occorre aggiongerli cosa alcuna: ma conuerrà leuarli $\frac{4}{9}$ d'Argento, ò di Rame che sia con l'Oro: cioè il compimento fino a 16. Se il Quotiente fosse stato precisamente 16 non occorreria nè leuarli, nè aggiongerli cosa alcuna: mas'hauesse superato il 16. quel sopra più saria l'Argento, ò Rame d'aggiongerui: il che saria accaduto, se la pretesa lega fosse più bassa delle due proposte leghe. Cioè men di 16. La proua, come nel quarto quesito.

AGGIONTA D'ALGEBRA

Il cui luogo faria a pag. 323. per il sesto Capitolo.

Regola vniuersale, & equiualente alli precedenti sei Capitoli.

IL famosissimo, & insigne P. Clauio della Compagnia di Giesù nella sua Algebra insegna vna regola generale, e molto facile per tirare in luce ogni Equatione risolubile per li sei Capitoli precedenti, e suoi dependenti, senza obbligar la memoria alla di loro reminiscenza, la qual Regola è questa, & hà quattro parti essentiali, come siegue.

1 Primieramente bisogna trouare l'Equatione, esaminando la radice, o cosa, che si propone esser eguale al numero incognito, che si cerca.

2 Ritrouata l'Equatione, conuiene ridurla in istato di poter far la diuisione, leuando li superflui: ristorando li diminuti, e riducendo l'Equatione a tal segno, che la maggior dignità sola si ritroui in vno delli estremi: nè tal dignità denominata sia nell'altro estremo.

3 Fatta tal riduttione si parte tutta l'Equatione con suoi caratteri per il numero della maggior dignità, come se fosse di numeri semplici (il che anco s'insegnò nel primo Cap. composto) acciò la maggior dignità resti denominata dalla sola Vnità. Siche quando l'Equatione da sè si porta a tal segno, che la maggior dignità sola si troui in vn estremo, denominata dall'Vnità in tal caso non occorre far diuisione alcuna.

4 Vltimamente dal Quot. di tal diuisione bisogna cauarne il lato, ò la douuta radice, come siegue, & in que-

sto principalmente consiste la forza, e generalità di questa regola; perche quanto alle tre prime parti, nō discordano da gl'insegnamenti, e spressi ne predetti Capitoli.

Del cauar il lato, ò la radice dalle semplici Equationi.

PEr saper mò quando, e che sorte di radice s'habbia da cauar dal Quotiente, egreggiamēte l'insegna col suo carattere il Diuisore medesimo, cioè la maggior dignità dell'Equatione. Siche, se il Diuisore sarà cos. il semplice Quotiente sarà il numero, ò quantità cercata: perche la cos. non hà radice, essendo ella medesima radice, e lato d'vn Quadrato. L'istesso accade ogni volta, che qual si sia dignità s'eguaglia alla dignità immediatamente inferiore ad essa. Per esempio. Se 5 qu.cu. fossero eguali á 40 primo rel. diuidendo il 40 per 5. il Quotiente 8 saria il valore della cos. & il numero, ò quantità cercata; il che si proua per la Regola Aurea dicendo. Se 5 qu.cu. s'eguagliono a 40, primo rel. Vn cos. (in che m'apposi) a che s'eguaglierà? Moltiplicando vn cos. con 40 primo rel. ne vengono 40. qu. cu. quali diuisi per 5. cu. di Quotiente s'hà 8 per numero, e valuta della cosa.

Se poi qualsiuoglia dignità s'eguaglia al numero, si parte il numero per tal dignità, e dal Quotiente si caua la radice quadra, ò cuba, ò qualsisia altra, denominata dalla partitrice dignità.

Ogni volta, che due dignità non collaterali s'eguagliono frà di loro, senza schisarle si parte al solito la minore per la maggiore, e dal Quotiente si caua la radice in questa forma. Se frà le due dignità dell'Equatione vi si fraponghi vna sola dignità si caua la radice quadra. Se due se ne fraponghino, si caua la R cub. se trè, la quadra quadrata: se quattro, la prima rel &c.

S'occorresse d'hauer à cauar la radice, o lato d'vna qual si sia dignità Algebratica, si caua la radice dal numero di tal dignità; come se fosse numero semplice. Per

saper

ſaper mò, da che carattere debba eſſer denominata tal radice, ſi parte il numero eſponẽte la dignità, dalla quale ſi cauò il lato per il numero eſponente la radice cauata: perche il numero eſponente del Quotiente tiene con sè la cercata dignità. Per eſempio. Volendo la radice quadra di 225, qu. cu. piglio la radice di 225, la quale è 15, ma perche il quad. cu. hà 6 di numero eſponente, e la radice quadra n'hà 2 diuidendo il 6 per 2 nẽ viene 3 (eſponente del cubo) Adunque la radice quad. di 225. qu. cu. ſarà 15 cub.

Se poi il numero di tal dignità non hà radice: ouero ſe, diuidendo vn eſponente per l'altro, l'eſponente del Quotiente non ſarà numero intiero; nè meno tal dignità hauerà la deſiderata radice. Numeri eſponenti ſono quei della Progreſſione naturale Aritmetica, poſti al fianco delle dignità Algebratice pag 305. Queſto è quanto all'Equationi ſemplici; nelle quali vna quantità s'eguaglia ad vn altra ſola quantità.

Del cauar il lato, ò radice dall'Equationi compoſte, e diminute.

EQuatione compoſta è quando la maggior dignità s'eguaglia a due altre diuerſe quantità: mà la diminuta è quando eſſa maggior dignità s'eguaglia ad vna quantità deficiente: cioè che li manca vn'altra certa quantità: come più a baſſo ſi vede eſemplificato. E notiſi, che queſto lato, ò radice ne dà ſempre la valuta della coſ. in che ſi appoſe, e la quantità cercata.

Per non errar mò, biſogna ſapere, che da quelle Equationi ſolamente ſi può cauar il lato, ò radice per Regola certa, quando li tre termini d'eſſe hanno i loro Eſponenti proportionali in proportione Aritmetica, e ſono tutte quelle, che la maggior dignità d'eſſe è denominata da quadrato ſolo, ò da quadrato compoſto: come nelle ſeguenti Equationi manifeſtamente ſi vede.

Equationi.			Esponenti.
Composta 1.qu.eguali a	10.co.più 75.		2. 1. 0.
Diminuta 1.qu. a	75.men 10.co.		2. 0. 1.
Diminuta 1.qu. a	18. co.men 72.		2. 1. 0.
Composta 1.qu.qu. a	18.qu.più 648.		4. 2. 0.
Diminuta 1.qu.qu. a	725.men 4 quad.		4. 0. 2.
Diminuta 1.qu.qu. a	433.qu.men 41.617.		4. 2. 0.
Composta 1.qu.cu. a	200 cu.più 3 456.		6. 3. 0.
Diminuta 1.qu.cu. a	5.120 men 16 cub.		6. 0. 3.
Diminuta 1.qu.cu. a	800.cu.men 156.751.		6. 3. 0
Composta 1.q.q.q. a	2.000.q.q.più 185.076.881.		8. 4. 0.
Diminuta 1.q.q.q. a	214.651.701.men 20.qu.qu.		8. 0. 4.
Diminuta 1.q.q.q. a	20.000 q.q.men 78.461.119.		8. 4. 0.
Composta 1.q.pr.rel. a	80.pr.rel.più 32.609		10. 5. 0.
Diminuta 1.q.pr.rel. a	7 424.men 200.pr.rel.		10. 0. 5.
Diminuta 1.q.pr.rel. a	2.000.pr.rel.men 999.424.		10, 5. 0.

Quando gli Esponenti, osseruando la proportione Aritmetica, tutti trè sono più che o. è segno, che nell' Equatione non si troua il numero qual di necessità sempre vi deue essere: però in tal caso bisogna abbreuiarli; il che si fà col sottrar da tutti il minor Esponente. Per esempio. La prima delle trè seguenti Equationi hà d' esponenti 1.1. 7. 9. (che molto bene conseruano la proportione Aritmetica frà di loro) Cauando mò il minor

Espo-

Esponente, cioè 7. da 11. da 7. & da 9 resta 4.0.2. *Et sic de singulis.* Notisi, che questo atto è vn schisare, ò degradare l'Equationi, pag. 327.

Equationi.	*Esponenti.*
Dimin. 1.3.rel. a 725 2.rel.m 4. cu.cu.	11. 7. 9.
Comp. 1.3.rel. a 200.q.q.q.p.3.456.p.rel.	11. 8. 5.
Comp. 1.q.q.q a 200 q. q. p. 14. 336 qu.	10. 6. 2.

Le quali Equationi si riducono a queste trè.

Dimin. 1. q.q. a 725. m 4 cu.cu.	4. 0. 2.
Comp. 1. qu.cu. a 200.cu.p.3.456.	6. 3. 0.
Comp. 1.q.q.q. a 200.q.q p.14 336.	8. 4. 0.

E così con altre infinite Equationi: dal che facilmente si comprende, che sorte di radice s'habbia da cauare da Quotienti.

Dalle trè prime Equationi si caua la radice quadra. Dalle trè seconde la radice quadra quadrata. Dalle trè seguenti la radice quadrata Cuba, *& sic de alijs.* Ma notate bene, che la maggior dignità sempre s'eguaglia a quella dignità, denominata seccondariamente in essa maggior dignità: qual dignità è notata nell'altro estremo dell'Equatione col termine di più, ò di men. insieme col numero. Per esempio. Il qu qu. s'eguaglia al qu. più numero. Il qu.cu.s'eguaglia al cu.e num.Il qu.prim. rel.s'eguaglia al prim.rel. e num. Il qu.qu.qu.s'eguaglia al qu.qu. e num. &c. O veniamo alla pratica: e per confirmatione maggiore di questa Regola risoluiamo li trè quesiti, risolti per li trè Cap. composti, pag 319, e 320. Nel Cap.1.cõp 1.q.p.6.cos.s'eguaglia a 16. La cos.val.2 Nel Cap.2.comp.1.q s'eguaglia a 3.cos p.70. La co.v.10 Nel Cap.3.comp.1.q.p.36 s'eguaglia a 12 $\frac{1}{2}$ co. La co.v.8 ouero 4$\frac{1}{2}$.

Ma perche secondo la nostra Regola la maggior dignità dell'Equatione deue star sola in vno de due estremi di essa; però aggiustate che siano dette trè equationi com-

composte staranno così 1.q.ti eguale a 16.m.6.cos.
1.qu. a 3.cos.p.70.
1.qu. a 12 $\frac{2}{1}$ cos.m.36.

Il modo di trouare il lato, ò radice quadra di queste, e simili Equationi, gli Esponenti delle quali sono 2.1. 0. ouero 2.0 1. è questo.

1. Si quadra la metà delle cose.

2. A questo quadrato s'aggionge, ò da esso si lieua il numero assoluto dall'Equatione, secondo che si troua notato col segno di p. ò di m.

3. Alla radice quadra di questa somma, ò resto s'aggionge, ò si lieua la metà delle cos. secondo che sono notate col segno di p. ò di m.

Questa Regola in tutto, e per tutto s'incontra con quella de trè Capitoli composti; ma l'eccellenza di questa consiste, che senza tenersi a memoria le particolarità di quelle, li caratteri del p. e del m attualmente insegnano il modo di operare, come qui in pratica successiuamente vedrete.

Per la prima Equatione d'1.qu. eguale a 16.m.6.cos. Il quadrato della metà delle cos. è 9. al quale gionto, che sia il num. 16. (perche senza segno significa p.) fà 25. la cui radice è 5. Hor dico, che da questa radice 5. si deue cauar la metà delle cos. perche sono denominate col termine del m, il che fatto, resta 2. per valuta della cosa: come appunto riuscì per la Regola del p. Cap. cómposto.

Per la seconda Equatione d'1.qu. eguale a 3.cos.p.70. Il quadrato della metà delle cos. è 2 $\frac{1}{2}$. al quale s'aggionge il num. assoluto 70 per esser notato col segno di p. e fà 72 $\frac{1}{2}$. la cui radice quadra è 8 $\frac{1}{2}$ hor dico, che a questa radice 8 $\frac{1}{2}$ si deue aggiongere la metà delle cose, per esser notate col segno di p. il che fatto s'haurà 10. per valuta della cosa, come anco riuscì per la Regola del secondo Cap. composto.

Per

Per la terza Equatione d'1.qu.eguale a 12 $\frac{1}{2}$ cos.m.36. Il quad.della metà delle cos. è 39 $\frac{1}{16}$. Da questo quad. si lieua il num.assoluto 36. che cosi ricerca il carattere del m̃, e resta 3 $\frac{1}{16}$, la cui radice quadra è 1 $\frac{3}{4}$. Hor dico, che a questa radice 1 $\frac{3}{4}$ si deue aggiongere la metà delle cos. perche non hauendo segno alcuno, significano più: il che fatto, la cos.val 8 come pur anco riuscì per la Regola del terzo Cap. composto.

Ma notate. Ogni volta, che il numero dell'Equatione, già aggiustata, sia notato col segno del m̃ tal Equatione può hauere due numeri per valuta della cos. vn maggiore, e minore l'altro. Il maggiore è il poco fà trouato 8. nella terza Equatione. Per hauer mò il minore, basta a cauar dalla metà delle cos. la trouata radice; sicche leuando 1 $\frac{3}{4}$ da 6 $\frac{1}{4}$ (metà delle cos.) resta 4 $\frac{1}{2}$, e tanto può anco valer la cos. Adũque la quantità cercata nella terza Equatione sarà 8. ouero 4 $\frac{1}{2}$. Vero è, che la minore alle volte (benche di rado) non sodisfà alla domanda; ma bensì sempre la maggiore infallibilmente.

O prouiamo quest'vltima Equatione, che seruirà per ammaestramẽto di tutte. Vn quadrato s'eguaglia a 12 $\frac{1}{2}$ cose m̃ 36, e la cos.val 8. ouero 4 $\frac{1}{2}$. Se così è, 12 cose, e meza dariano 100 per la maggior valuta, e per la minore 56 $\frac{1}{4}$ da quai numeri leuãdo da ciascuno il m̃ 36, resta 64 & 20 $\frac{1}{4}$. E perche il quad.d'8, & il quad.di 4 $\frac{1}{2}$ fanno 64, il primo, & 20 $\frac{1}{4}$ l'altro, però l'operatione è buona.

Quanto poi al cauar il lato, ò radice da quelle Equationi, nelle quali la maggior dignità vien denominata da doppio carattere: per Regola generale si caua sempre prima la radice quadra, come se l'Equatione fosse di quadrato eguale a cos. e num in vno de trè predetti modi: e poi dall'vltimo euento (rationale, ò irrationale che sia) si caua la radice, indicata dal secondo nome, ò carattere d'essa dignità. Per esempio. Sia 1.qu.qu.egua-

le

le a 171. men 10 qu. La metà de qu. è 5. il quadrato del quale è 25, al qual quadrato aggiongendoui il num. assoluto 171. fà 196. la cui radice quadra è 14. Da questa radice 14 si caua mò la metà de quadrati per esser notati col segno del men, e resta 9. Hor dico, che la radice quadrata di 9 cioè 3. è la valuta della cos.

Di più. Sia 1. qu. cu. eguale a 4. cu. p. 32. Il quadrato della metà de cubi è pur 4 qual gionto col num. dell'Equatione, fà 36 la cui radice quadra è 6 alla quale giongendoui la metà de cub. (per rispetto del p. che rappresentano) s'hauerà 8. Hor dico, che la radice cub. di 8. (cioè 2.) è la valuta della cosa. *Et sic de singulis*. Ne vi paia strano: perche volendo. Per esempio cauar la R. qu. cu. da 64 cauando prima la R. qu. tal radice, ò lato riuscirà vn cub. cioè 8. Siche di necessità conuerrà poi cauare da esso lato quadro la radice, ò lato cubo, ò altro, che sia: ma nel caso nostro tal cubo è 2. Cubisi il quadrato di 2, che di garbo fà 64.

D'vn altro modo per trouar il lato quadro.

1 AL quad. di tutto il num delle cose s'aggionge, ò da esso si lieua il quadruplo del num. assoluto, secondo che sarà notato col segno di più, ò di meno.

2 Alla radice quadra della somma, ò del resto s'aggionge, ò si lieua il numero delle cose, secondo ne insegna il carattere di più, ò di men; il che fatto, la metà della somma, ò del resto sarà la valuta della cosa. Questa Regola è commodissima, quando il num. delle cose è disparo, ò congionto con rotto.

REGOLA SPETIALISSIMA

Per trouar il lato, ò radice, à fine d'eguagliare le quantità.

DOuendosi trouar il lato di quad. col. e num. bisogna, che li quad. siano ridotti ad vn sol quadrato.

La

La sua Regola è questa. Si partono per mezo le cose: che sempre riuscirà num. semplice: perche la cosa rappresenta la radice del quadrato per num. qual num. s'vnisce col lato del qu., & è finita l'operatione. Per esempio, sia 1.qu.p.4.cos.p. 4. Volendo il lato quad. di queste trè quantità, s'opera come sopra. Il lato d'vn quadrato è sempre 1. cos. la meta delle cos. è 2. di semplice num. Si che il cercato lato, ò radice quadra delle trè proposte quantità è 1 cos. p. 2.

1. cos. p. 2.

1.qu.p.4.cos.p.4.

Che ciò sia il vero se quadrar. detto lato, ne ritornaranno precisamente le trè prime quantità, come si vede.

Ma notate. Se la quadratura del lato hà da dare precisamente le trè proposte quantità, bisogna, che il numero sia precisamente eguale al quadrato della metà delle cos. (come è accaduto nel precedente esempio) ma se tal num. sarà più, ò meno, conuerrà leuarli, ouero aggiongerli tanto, che basti. Per esempio. Voglio il lato quadro d'vn qu. p. 8. cos. p. 5. operando, come sopra questo lato sarà 1. cos. p. 4. ma perche il quadrato della metà delle cos fà 16. perciò al num. 5. bisogna aggiongerui 11. Dirò adunque. Se ad 1. q. p. 8, cos. p. 5 s'aggiongerà 11 il suo lato, ò radice sarà 1. cos. p. 4.

Di più. Voglio il lato d'1. qu. p. 6, cos. p. 12. Questo lato è 1. cos. p. 3. ma perche il quadrato della metà delle cos. è solamente 9 però il num è troppo gagliardo. Dirò adunque. Se da 1. qu. p. 6. cos. p. 12. si leuarà 3. restarà 1. qu. p. 6 cos p. 9 il cui lato è 1. cos. p. 3.

L'istesso ordine, e cautella s'osserua circa il meno. Sia 1 qu. m̃ 6 cos. p. 8. Il suo lato sarà 1 cos m̃ 3. La quadratura del lato è 1.q.m.6.cos.p.9. Si si deue aggiõgere 1;

Sia parimente 1. quad. m̃. 6. cos. m̃ 15. Il lato di questa propositione è 1. cos. m̃ 3. Ma perche quadrando

que-

questo lato proposto fà 1. qu. m̃ 6. cos. p. 9. però dà que-
sta quadratura ne cauo il proposto 1. qu. m̃. 6. cos. m̃.
15. e mi resta p. 24 Dirò adunque. Se ad 1. qu m̃. 6. cos.
m̃. 15. s'aggiongerà 24. s'hauerà 1. qu. m̃ 6. cos. p. 9. & il
suo lato sarà 1. cos. m̃. 3.

Lato delle trè proposte quantità 1. cos. m. 3.
1. cos. m̃. 3.

Quadratura del lato, 1. qu. m̃. 6. cos. p. 9.
Quantità proposte 1. qu. m̃. 6 cos m̃. 15. da sottrarsi

Resta p. 24

Chi possiede mò bene questa Regola, e chi l'hà molto famigliare, facilissimamente trouarà il lato; e tirarà in luce qualsiuoglia Equatione composta, ò diminuta; risolubile per li trè Capitoli composta; e per la Regola generale del P. Clauio; con questo solo auuiso: cioè: che anco la maggior dignità dell' Equatione sia denominata dalla sola Vnità; e nell'istesso estremo seco habbia vnite le cos. ò qualsisia altra dignità, che nell' operare vien reputata per cos. Or veniamo alla pratica, e seruiamoci d'esemplare, e per modello delle medesime Equationi, che ci siamo seruiti di sopra, acciò meglio spichi la verità di questo eccellente operare, &c.

Primo Cap. cõposto. 1. q p 6 cos. eguali a 16. La cos. val 2 Lato del pri estremo. 1. cos. p. 3.

1. cos. p. 3.

Suo quadrato. 1. qu. p. 6. cos. p. 9 eguale a 25.
Lati, ò R. 1. cos. p. 3. eguali a 5.

Or pratichiamo questa Equatione. Il lato d'1 qua. p. 6. cos. è 1. cos. p. 3. Quadrando questo lato, ne viene 1. qu. p. 6. cos. p. 9. ma perche doueria esser solamente 1. qu. p. 6. cosa, però al secondo estremo dell'Equatione bisogna aggiongerui 9; il che fatto, il 16. diuenta 25.

Siche

Si che 1. qu. p. 6. col. p. 9. farà eguale 25. Cauando mò il lato, ò radice dall'vno, e l'altro estremo, s'hauerà 1. col. p. 3. eguale a 5. Finalmente leuando da ogni parte il 3. superfluo, s'hauerà 1. col. eguale a 2. Adunque la col. val 2. come per le altre Regole, &c.

Secõdo Cap cõp. 1.q.eguale a 3.col p.70. La col. val 10
Ridotta a segno d'Eq. 1. q.m. 3.col. s'eguaglia a 70.
Lato del primo estremo 1. col men 1. $\frac{1}{2}$
1. col. men 1. $\frac{1}{2}$

Suo quad. 1.qu.men 3.col p.2 $\frac{1}{4}$ eguale a 72 $\frac{1}{4}$
Lati, ò R. delli estremi 1. col. men 1 $\frac{1}{2}$ eguale a 8 $\frac{1}{2}$.
Ristorato quel men 1 $\frac{1}{2}$ s'hauerà 1. col. eguale a 10. Adunque la col val 10. come per l'altre due Regole. Perche la quadratura del lato supera il primo estremo di 2 $\frac{1}{4}$, però 2 $\frac{1}{4}$ s'è gionto al 70. del 2. estremo. (ouero 4 $\frac{1}{2}$
Terzo Cap. cõp. 1.q p.36. eguale a 12. $\frac{1}{3}$ col. La col. val 8.
Aggiustata l'Equat.: q. mẽ 12. $\frac{1}{3}$ col. p. 36. s'eguaglia a 0.
Lato del pri. estremo 1. col. men 6. $\frac{1}{4}$
1. col. men 6 $\frac{1}{8}$

Suo quad. 1.q. men 12. $\frac{1}{2}$ col. p. 39. $\frac{1}{16}$ eguale a 3 $\frac{1}{16}$.
Lati, ò radice degli estremi 1. col. men 6 $\frac{1}{4}$ eguale a 1 $\frac{3}{4}$.
Ristorato quel men 6 $\frac{1}{4}$, s' hauerà 1 col. eguale a 8. Adunque la cosa val 8, come per l'altre due Regole. Perche la quadratura del lato supera il primo estremo, già aggiustato di 3 $\frac{1}{16}$, però 3 $\frac{1}{16}$ s'è posto dalla parte del 0, acciò l'Equatione resti sempre equilibrata.

Ma notate. Ogni volta, che tutti trè li termini vniti in vn istesso estremo s'eguagliano al 0. come è accaduto in questa Equatione, tal Equatione hauerà due numeri, che sodisfano alla domanda: vno maggiore, e minore l'altro. Il maggiore è il poco fà trouato. Per hauer mò il min[illegible]a a sottrare semplicemente